



Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens

<http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/>

<https://www.facebook.com/fszoi>




Tejfog extractiok



Dr. Rendek Luca

Tutor: Dr. Turi Gábor
Osztályvezető Helyettes

Konzulens: Dr. Horváth János
Osztályvezető Főorvos



Esetismertetés

- 17,5 éves lány
- Intézetünkbe fogszabályozás miatt érkezett
- Panasza: „észrevette”, hogy kevesebb foga van, mint ahánynak lennie kellene



Általános anamnézis

- Általános, szisztémás, kezelést befolyásoló betegsége nincs
- Gyógyszert nem szed
- Gyógyszerérzékenység ről nem tud
- Allergia: nincsen
- Egészségére káros szokása nincs

Fogászati anamnézis

- Ritkán jár fogorvoshoz
- Fogszabályzó készüléke korábban nem volt



Fej-, nyak régió vizsgálata, intraorális vizsgálat



- Sztomato-onkológiai szűrés: negatív
- TMI vizsgálat során eltérés nem volt észlelhető
- Szájhygiénia: korábban valószínűleg rosszabb volt, most kielégítő
- Parodontium állapota: ép

Panoráma röntgen




Dentalis status

			X	X	X					X	X	X			
X	7	6	V	IV	III	2	1	1	2	III	IV	V	6	7	X
X	7	6	V	4	3	2	1	1	2	3	4	V	6	7	X
			X?									X			

- 8 db aplasia (13,14,15,23,24,25,35,45) és a bölcsességfog csírák is hiányoznak = oligodontia
- A 45-ös fog csirájának helyén látható radioopaque képlet miatt CBCT felvétel is készült az adott területről, melyet szájsebészeti osztályunk főorvosa (Dr. Kivovics Márton) kiértékelte, és javaslatára nem tártuk fel az adott területet, a képlet a helyén marad mindaddig, amíg nem okoz problémát a páciens számára, illetve a jövőben nem lesz akadálya a fogmozgatásnak, implantálásnak.

Tanulmányi minta



Kiindulási arcfotók



Kiindulási szájfotók



Kezelési terv



- Felső-, alsó beragasztott fogszabályozó készülék, goshgarian
- Felső fogív: tejfogak extractioja, nivellálás, hely teremtése mindkét quadransban egy szemfog és egy praemolaris implantátum számára. Az Angle osztály (AII), és a páciens életkora miatt (17,5 év) nem pótoljuk a felső fogívben mind a 6 aplasiás fogat, mert az ilyen mértékű distalharapás ebben az életkorban, a növekedés befejeződése után már a legtöbb esetben nem korrigálható recidiva nélkül. Ha a páciensnek megvolna minden maradófoga, valószínűleg a terápia abban az esetben is két felső praemolaris extractio volna.
- Alsó fogív: tejfogak extractioja, nivellálás, hely teremtése mindkét quadransban a második praemolaris implantátum számára.
- A harapás emelése (megfelelő mértékben csak az implantátumok segítségével tudjuk elérni a harapás emelését, jelenleg a maradékfogak védelme és a hiányos oldal-zóna miatt a front-régióban történő harapásemelést késleltetjük)
- A fogszabályozó kezelés befejezése után az implantálást a Mária utcai szájsebészeten fogják végezni, a páciens a kezelés megkezdésekor regisztrált a várólistára.
- Retenció

Ínyleválasztás, Extractio



A két felső tejszemfogat esztétikai okokból egyelőre nem extraháltam

A fogszabályozó kezelés 4 hónap elteltével itt tart:

