



Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens

<http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/>

<https://www.facebook.com/fszoi>



Számfeletti kismetsző extractio



Dr. Rendek Luca

Tutor: Dr. Turi Gábor
Osztályvezető Helyettes

Konzulens: Dr. Horváth János
Osztályvezető Főorvos



Esetismertetés

- 16 éves fiú
- Intézetünkbe fogszabályozás miatt érkezett
- Panasza: zavarja réses fogazata, foghiánya és csapfoga
- Jelenleg is fogszabályozó kezelés alatt áll



Általános anamnézis

- Általános, szisztémás, kezelést befolyásoló betegsége nincs
- Gyógyszert nem szed
- Gyógyszerérzékenység ről nem tud
- Allergia: nincsen
- Egészségére káros szokása nincs

Fogászati anamnézis

- Rendszeres iskolai fogászati szűrése részt vesz
- Maradófog extractioja korábban nem volt
- Fogszabályzó készüléke korábban nem volt



Fej-, nyak régió vizsgálata, intraorális vizsgálat



- Sztomato-onkológiai szűrés: negatív
- TMI vizsgálat során eltérés nem volt észlelhető
- Szájhygiénia: kiváló
- Parodontium állapota: ép

Panoráma röntgen



Dentalis status

8					3										8
	7	6	5	4		(2)2	1	1	2	3	4	5	6	7	
	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	
8															8

- Szabályos alakú szám feletti fog a jobb felső quadransban (dens supplementarius)
- Impactált fog: 13
- Csapfog: 22
- Mind a 4 bölcsességfog csírája látható a röntgenen, de valószínűsíthetően gond nélkül elő tudnak majd törni, és nem fogják veszélyeztetni a fogszabályozó kezelés eredményét.

Kiindulási arcfotók



Kiindulási szájfotók



Kezelési terv



- 22-es csapfog felépítése
- Felső-, alsó rögzített fogszabályozó készülék
- Jobb felső quadransban: szám feletti fog extractioja, impactált szemfog sebészi feltárása (ha magától nem indul el kb.3 hónap alatt), fogszabályozó készülékkel helyre vitele, részárás
- Retenció

A jobb felső számfeletti kismetsző extractioja – ínleválasztás és extractio



**A jobb felső számfeletti kismetsző extractioja
–excochleatio és az extrahált fog, valamint az
extractios seb egy nap elteltével**



Palatinálisan tapintható a 13-as fog, melyet már csak a gingiva borít, valószínűsíthető a spontán előtörés.