



Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens
<http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/>
<https://www.facebook.com/fszoi>



Orális medicina részvizsga

Granuloma fissuratum excisio

Rezidens: Dr. Békési Kitti

Tutor: Dr. Kivovics Márton mb osztályvezető főorvos,
egyetemi tanársegéd

Konzulens: Dr. Czinkóczy Béla osztályvezető főorvos



Anamnézis



- 72 éves férfi beteg
- Általános anamnézis:
 - Hypertonia
 - Stroke 2008
- Gyógyszerei:
 - Tensiomin tabl. 25 mg (vérnyomáscsökkentő)
 - ASA Protect Pharmavit 100 mg
 - Clopidogrel Teva 75 mg (kettős thrombocytá aggregáció gátlás)
- Fogászati-, szájsebészeti kezelés kizáró abszolút ok nincs
- Nem dohányzik, alkoholt nem fogyaszt

Klinikai vizsgálat




- Korának megfelelő általános állapot
- Szimmetrikus arc
- Hiányos fogazat, caries dentales
- Szájhygiéne rossz
- Stomato-onkológiai szűrés alapján a bal oldalon a 23, 24, 25, 26-os fogaknak megfelelően egy kb. 25x15 mm-es, intakt nyálkahártyával fedett, fájdalomtalan, fogsor okozta granuloma fissuratumnak imponáló képlet azonosítható
- TMI diszfunkcióra utaló jel nem azonosítható

Panasz

- Az elődomborodó elváltozás miatt kereste a páciens Intézetünket, a felső fogpótlását nem tudja használni
- Elmondása alapján kb. fél éve jelentkezett, egy ideig nőtt, azonban néhány hónapja nem változtatja a méretét
- Fájdalmatlan terime



Orthopantomogram





Sebészi beavatkozás lépései I.



Intraoralis kiindulási kép

Terminális érzéstelenítés buccalisan, valamint a n. incisivus és n. palatinus major et minor vezetékes érzéstelenítése

Sebészi beavatkozás lépései II.




Az elváltozás excíziója:
Babérlevél alakú metszés

Sebészi beavatkozás lépései III.




Az eltávolított szövetszaporulat



Műtési terület az excisiót követően

Sebészi beavatkozás lépései IV.



Sebzárás horizontalis matrac öltésekkel

Szövettani eredmény

Makroszkópos leírás

25x11x7 mm nagyságú szövetrészlet, mely nagyjából babérlevél alakú. A felszínén szürkésfehér színű, helyenként behúzódtabb nyálkahártya-borítás látható. A rezekciós felszínen tusjelölés.

Az apikális rezekciós végek 2 mm vastagságban levágva. A további szövetrész 9 db, 2-3 mm vastagságú szeletekre vágva. Metszéslapokon szürkésfehér színű szövetrészletek láthatók, valamint egy területen, 2x2 mm nagyságban egy sötét, vöröses-barnás színű terület látható.

1. blokk: Az apikális rezekciós végek.

2-6. blokkok: Metszéslapok.

A sötétebb, vöröses-barna területet tartalmazó két metszéslap az 5. blokkban található.

Összesen: 9 db / 6 blokk: NM.

1-4: A vizsgált mintában kissé kiszélesedett, többrétegű hámfelszínnel rendelkező szövetdarab látható. A hám-kötőszövet határa éles, a határzónában kismértékű, részben göccs, részben diffúz idült lobos beszűrődés van. A stromában szintén kismértékű idült lobosodás látható, egy-egy területen szabályos acinusokkal és ductusokkal. Atypia, malignitás nincs.

Diagnózis

1-4. A szöveti kép megfelel granuloma fissuratumnak.

Kódolt diagnózisok

BNO:	K14001	GLOSSITIS
M-SNOMED:	4417.00	Granuloma fissuratum
E-SNOMED:		

-

Varratszedés

