




**Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar**  
**Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet**  
igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens

<http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/>

<https://www.facebook.com/fszoi>

# SZÁMFELETTI FOGAK ELTÁVOLÍTÁSA



dr. Szekér Julianna  
Gyermekfogászat rezidens  
Tutor: dr. Kiss Rita Mónika

# FOGORVOSI VIZSGÁLATRA ÉRKEZÉS INDOKA

- ✘ Páciensnek nem volt panasza
- ✘ Szülő elmondása szerint a gyermek szájpadrólásán kb. 1 éve jelentek meg számfeletti fogak

# ÁLTALÁNOS ANAMNÉZIS

---

- ✘ 7 éves kislány
- ✘ Az egészséges állapottól jellemzően eltérő, és adott esetben más fogászati beavatkozás szempontjából számottevő kórtani anomáliákat nem észleltünk
- ✘ Egészségre káros szokásról nem számolt be



# FOGÁSZATI ANAMNÉZIS

---

- ✗ trauma nem érte
- ✗ orális parafunkciói nincsenek
- ✗ étkezési szokásai megfelelőek/elfogadhatóak

## Fej-nyak régió vizsgálata:

- ✗ sztomato-onkológiai szűrés során rendellenesség nem található
- ✗ TMI vizsgálat során rendellenesség,
- ✗ panasz nincs
- ✗ aszimmetria nincs

# INTRAORÁLIS VIZSGÁLAT

✗ szájhigiéne jó

fogazati státusz: vegyes fogazat, korának megfelelő

occl. caries

occl. caries

6 V IV III 2 1      1 2 III IV V 6

---


6 V IV III 2 1      1 2 III IV V 6

✗ parodontális státusz: ép

✗ Angle diagnosztikai besorolás: Angle I.

# INTRAORÁLIS VIZSGÁLAT

2 soron kívül  
elhelyezkedő  
számfeletti fog







# RÖNTGEN VIZSGÁLAT



# CBCT VIZSGÁLAT





# TERÁPIA

---


- ✘ (az extrakcióhoz a szülő hozzájárult)
- ✘ felületi érzéstelenítés (20% benzocain gél)
- ✘ periinfiltratív érzéstelenítés (2 ml lidocain)
- ✘ lágyrészvédelem, ínleválasztás
- ✘ fogó felhelyezése
- ✘ a fog eltávolítása
- ✘ az üreg óvatos kitisztítása, bevéreztetése
- ✘ a lágyrészek komprimálása
- ✘ sebkontroll

# EXTRAHÁLT FOGAK





# SEBKONTROLL



# TOVÁBBI MŰVELETEK EXTRACTIO UTÁN:

- ✘ 15 perc múlva kontroll – vérzés nincs
- ✘ a páciens felvilágosítása az extrakció utáni tudnivalókról:
  - szívogatni, öblögetni, köpködni tilos, ne rágcsálja a száját az érzéstelenítő hatása alatt
  - megfelelő szájhigiéncia
  - étkezés (nem ajánlott túl forró ételek, magvas dolgok, tejtermékek fogyasztása)