



Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

igazgató: Dr. Kivovics Péter c. egyetemi tanár

<http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/>

<http://facebook.com/fszoi/>



Residualis tasak kezelése




Dr. Nikoli Rebeka
dento-alveoláris sebész rezidens

Tutor: Dr. Varga Lóránt

Sürgősségi Osztály osztályvezető főorvosa
dento-alveoláris sebész

Mentor: Dr. Czinkóczy Béla

Implantológiai Osztály osztályvezető főorvosa
dento-alveoláris sebész



Fogorvosi vizsgálatra érkezés oka



Panasza a bal alsó régióban észlelt ínyvérzés,
valamint az időszakosan jelentkező érzékenység voltak.

Általános anamnézis



- ✧ 35 éves, nő páciens
- ✧ általános anamnézisben fogászati-, szájsebészeti kezelést befolyásoló tényező nem szerepel
- ✧ gyógyszereket nem szed rendszeresen
- ✧ gyógyszerérzékenységről nem tud
- ✧ káros szokása nincs
- ✧ fogorvoshoz rendszeresen jár
- ✧ elmondása szerint korábban komplex parodontológiai kezelése volt

Klinikai vizsgálat



- ✧ szimmetrikus arc
- ✧ megtartott fogazata
- ✧ szájhigiéne kiváló
- ✧ stomato-onkológiai szűrés során eltérés nem tapasztalható
- ✧ TMI vizsgálat alapján diszfunkcióra utaló jel nem azonosítható
- ✧ Harapási forma: Angle I. (normocclusio)
- ✧ Fábián- és Fejérdy-féle protetika osztály: 0. osztály
- ✧ BPE érték:



2	2	2
2	2	2

- A fogak felszínén fogkő látható
- Szondázáskor enyhe ínyvérzés tapasztalható

Orthopantomogram



Kiindulási állapot I.



Kiindulási állapot II.



A 36 fog mesialis részénél mérhető
6 mm-es tasakmélység



An illustration of a person's back and shoulder area. A pencil is pointing to the scapula (shoulder blade) on the right side of the image. The scapula is a triangular bone that connects the humerus to the clavicle. It is located on the upper back, between the neck and the shoulder. The illustration shows the scapula in a light brown color, contrasting with the darker brown of the surrounding muscle and skin. The pencil is positioned vertically, with its tip pointing towards the scapula. The overall style is a simple, clean illustration with a focus on anatomical accuracy.

Z

25	26	27	28
0	0	0	
0 0 0	0 0 0	0 0 0	
2 2 2	2 2 2	3 2 3	



palatinális

marginális gingiv
szondázási mélység

Plaque

Bleeding on Probing


furkáció-érintettség

Not

Diagnózis és terápia:



- ✧ **Dg.:** 36 fog mesialis részénél residualis tasak
- ✧ **Th.:** Oki parodontális kezelés
 - ✓ Supra- és subgingivális depurálás, polírozás
 - ✓ Instruálás és motiválás
 - ✓ Residualis tasak tisztítása –zárt kürett
 - ✓ Kontroll 1 hét múlva
 - ✓ Visszarendelés 1 – 3 - 6 hónap múlva
 - ✓ Újraértékelés



Instruálás és motiválás - Plakkfestés



Oki parodontális kezelés I.



Supra- és subgingivális depurálás, polírozás

✓ Preop. antiszeptikus szájöblítés

0,2% Chlorhexidin-diglükonát

✓ A beavatkozás lokál anesztéziában,
infiltrációs érzéstelenítés

2ml 2%-os Lidocain-Adrenalin old.



Oki parodontális kezelés II.


Residualis tasak tisztítása –zárt kürett

- Gracey 11-12
- Subgingivális kürett közben folyamatos
0,2 % Corsodyles irrigálás
- Közvetlenül a subgingivális tasakkezelés az
interdentális résekbe Curasept zselé helyezése



Újraértékelés – Alsó állcsont

Az íny színe és konzisztenciája megfelelő, dentális plakk nem látható, szondázásra ínyvérzés nem tapasztalható



Kontroll



3 hónap: 3-4 mm tasak

6 hónap: 2 mm tasak

A páciens további folyamatos instruálása, motiválása

Re-call





Köszönöm a figyelmet!