

PROGRAMFÜZET

Oktató Családorvosok
XXIV. Továbbképző Konferenciája

Siófok, 2023. április 21-23.



— EDUKATOR

**55%
NORMATÍV
TÁMOGATÁS**



GLUTAMIN medical WH

a nehezen gyógyuló sebek ellátásában

- lábszárfekély
- felfekvés
- diabéteszes láb

*Komplex készítmény glutaminnal, argininnel,
HMB-vel, valamint hozzáadott cinkkel,
szelénnel és D3-vitaminnal.*

További információért látogasson el a Rubenza standjára!



Krónikus sebek kezelése a kötszereken túl
MEDUKATOR PODCAST

RGWH/OCSPA5/01/2023

Az anyag lezárásának dátuma: 2023. április 5.

A forgalmazó nem vállal felelősséget a közölt információk illetéktelen felhasználásáért!

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREK RÉSZÉRE KÉSZÜLT TÁJÉKOZTATÓ!

www.glutaminmedical.hu

Rubenza Pharma
2045 Torókbálint, Tópark u. 3.

Tisztelt Kolléganők és Kollégák!

Tisztelettel üdvözljük a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszéke és az Oktató Családorvosok Magyarországi Kollégiuma által közösen rendezett, nagy múltra visszatekintő XXIV. Továbbképző Konferencián, melynek látogatottságát hazánkban csak a kötelező szintentartó tanfolyamoké múlja felül. A COVID pandémia sajnos nem tette lehetővé, hogy az elmúlt években személyesen találkozzunk ezen a konferencián, így nagyon készülünk, hogy közösen megvitassuk az alapellátást érintő fontos kérdéseket.

A három nap során áttekintjük a családorvosi gyakorlatban gyakran előforduló krónikus betegségek legújabb kezelési lehetőségeit, kerekasztal beszélgetésen foglalkozunk az új indikátorokkal.

A szakmai továbbképzési programon túl szombat reggel az össz-oktatói értekezletünkön betekintést nyerhetnek a Családorvosi Tanszék oktatói munkájába, megismerkedhetnek az angol és német nyelvű oktatásunkkal, a tavaly szeptembertől megváltozott rezidensi képzéssel. A Tanszékhez most csatlakozó új kollégák oktatói képzésen vehetnek részt, továbbá segítséget nyújtunk az új akkreditációs felületen (RENY.hu) történő regisztrációban is.

Szeretnénk megköszönni a jelenlegi oktatóink áldozatos munkáját, továbbra is számítunk oktatói munkájukra.

Abban az esetben, ha Ön még nem oktatónk, de szeretne oktatni, akkor szívesen látjuk Önt oktatóink sorában, nyugodtan keresse meg a konferencia alatt a Tanszékünk valamelyik kollégáját.

Bízom benne, hogy a szakmailag hasznos továbbképzés mellett lehetőségük nyílik baráti beszélgetésekre és jó hangulatban telik el ez a három továbbképző nap.

Üdvözlettel:

Dr. Torzsa Péter

tanszékvezető egyetemi tanár

JAK-GÁTLÓ TABLETTA

RINVOQ® ▼

upadacitinib

SEGÍTSEN KÖZÉPSÚLYOS ÉS SÚLYOS
ATÓPIÁS DERMATITISZES BETEGEINEK

MEGSZAKÍTANI

A VISZKETÉS ÉS VAKARÓZÁS
ÖRDÖGI KÖRÉT^{1,2}

A MEASURE UP 1 és 2 vizsgálatok
összevont adatainak elemzése alapján:²

• **A bőr gyors tüneti javulása²**

A napi 30 mg RINVOQ® kezelésben részesülő betegek 45,7%-a érte el az EASI 75 választ már a 2. hétre, és 76,3%-a a 16. hétre. Napi 15 mg RINVOQ® dózis mellett a betegek 35,5%-a, és 64,9%-a érte el az EASI 75 választ a 2. és a 16. hétre.²

• **A viszketés gyors enyhülése²**

A napi 30 mg RINVOQ® kezelésben részesülő betegek 17,7%-ánál már az 1. hétre, és 59,8%-ánál a 16. hétre jelentősen, legalább 4 pontszámmal javult a viszketés a Legrosszabb Pruritus Numerikus Skálán (WP-NRS). Napi 15 mg RINVOQ® dózis mellett a betegek 11,2%-ánál és 47,1%-ánál volt ilyen javulás megfigyelhető az 1. és a 16. hétre.²

• **Megalapozott biztonságossági profil²**

Mind a 15 mg, mind a 30 mg RINVOQ® kezelést jól tolerálták a betegek.²

A RINVOQ egy szelektív, reverzibilis Janus-kináz gátló középsúlyos és súlyos atópiás dermatitisz kezelésére olyan felnőtteknél és 12 éves vagy idősebb serdülőknél, akiknél szisztémás kezelés szükséges.¹

Javasolt adagja 15 mg vagy 30 mg naponta egyszer, a beteg állapotától függő egyedi elbírálás alapján.¹

▽ Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakemberek arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.

Irodalom:

1. Rinvoq alkalmazási előírás: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/rinvoq-epar-product-information_hu.pdf
2. Simpson E, Papp K, Blauvelt A, et al. Efficacy and Safety of Upadacitinib in Patients With Atopic Dermatitis: Results Through Week 52 From Replicate, Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Studies: Measure Up 1 and Measure Up 2. Poster at the 2021 Dermatology Education Foundation (DEF) Essential Resource Meeting (DERM2021), August 5-8, 2021, Las Vegas NV, USA.

Rinvoq 15 mg retard tabletta (upadacitinib)

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/rinvoq-epar-product-information_hu.pdf

Forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselője:

AbbVie Kft., 1095 Budapest, Lechner Odon fasor 7.

Telefonszám: +36 1 455 8600. www.abbvie.hu

A közfinanszírozás alapjául elfogadott ár: 267 398 Ft (Tértítési díj: 0 Ft). Forrás: www.neak.gov.hu.

Az aktuális árak megtalálhatók a www.neak.gov.hu oldalon. A Rinvoq 15 mg

2022. január 1-től tételes finanszírozás keretében érhető el a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet alapján.

Finanszírozott indikációs kor: reumatoid arthritis.

HU-RNQ_AD-220013 Lezárás dátuma: 2022. augusztus 22.

abbvie

 **RINVOQ®**
upadacitinib

2023.04.21. Péntek

7:30	Regisztráció
8:45	Megnyitó
08:50-09:20	Dohányzásról leszokás támogatás lehetőségei dr. Toldy-Schedel Emil
	ülésselnök: dr. Torzsa Péter
09:20-9:50	Abbvie szimpózium ülésselnök: dr. Torzsa Péter Új terápiás célok és lehetőségek az ekcéma kezelésében dr. Gerencsér Kinga
9:50-10:10	77 Elektronika szimpózium ülésselnök: dr. Torzsa Péter Új lehetőségek a diabétesz telemedicinális gondozásában dr. Rosta László
10:10-11:00	Indikátor kerekasztal dr. Körösi László, dr. Torzsa Péter dr. Szabó János, Streicher Zsolt
11:00-11:20	Szünet
11:20-12:20	Pfizer szimpózium ülésselnök: dr. Torzsa Péter Bevezető. Fejfájások a háziorvosi gyakorlatban dr. Torzsa Péter A migrén epidemiológiája, tünettana és diagnosztikájának kihívásai dr. Csépany Éva A migrén gyógyszeres kezelésének és megelőzésének hagyományos és új terápiás lehetőségei dr. Párdutz Árpád
12:20-13:20	Pfizer szimpózium ülésselnök: dr. Vajer Péter Légúti infekciók – Az influenzaszезon tanulságai dr. Székely Éva A COVID-19 terápiás megközelítése az omikron érában dr. Lakatos Botond Hazai aktualitások a kullancsok által terjesztett infekciók területén dr. Schneider Ferenc
13:20	Teszt
13:20-14:20	Ebédszünet

AVAXIM® 160E

Inaktivált hepatitis A vakcina

A 0,5 ml-es Avaxim 160 Egység szuszpenziós injekció a **HEPATITIS A** vírushatás megelőzésére szolgáló aktív immunizálásra javallott **16 éves kortól serdülők és felnőttek számára.**

Az Avaxim 160 Egység szuszpenziós injekció alkalmazási előírása a QR kód leolvasásával tekinthető meg:



Forrás: Avaxim 160 Egység szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben (Hepatitis A vakcina, inaktivált, adszorbeált) alkalmazási előírása. (Letöltve: 2023. 03. 07.)

AZ AVAXIM 160E ÉS A TYPHIM Vi VÁLTOZATLANUL ELÉRHETŐ!

TYPHIM Vi®

poliszacharid hastífusz vakcina

HASTÍFUSZ prevenciója **felnőttekben és 2 év feletti gyermekekben**, különösen az endémiás területekre utazók, ilyen területeken hosszabb ideig tartózkodók, továbbá menekültek, az egészségügyi személyzet és a fegyveres erők tagjai számára javasolt.¹

Hastífusz elleni védőoltásban kell részesíteni azon munkavállalókat, akiknek folyamatos, vagy időszakosan végzett munkája során a S.Typhi-vel való fertőződés nem zárható ki.²

A Typhim Vi szuszpenziós injekció alkalmazási előírása a QR kód leolvasásával tekinthető meg:



Referenciák:

1. A Typhim Vi oldatos injekció előretöltött fecskendőben (poliszacharid hastífusz vakcina) alkalmazási előírása. (Letöltve: 2023. 03. 07.)
2. A Nemzeti Népegészségügyi Központ módszertani levele a 2023. évi védőoltásokról

MAT-HU-2300389 Lezárás dátuma: 2023. 04.

Sanofi-Aventis Zrt. 1138 Budapest,
Váci út 133. „E” épület 3. emelet
Sanofi: (+36 1) 505 0050
Gyógyszer- és egyéb termék-
formáció: (+36 1) 505 0055
Web: www.sanofi.hu

sanofi

2023.04.21. Péntek

14:20-15:20

Biotronik szimpózium - Szívelégtelen betegek korszerű gyógyszeres és eszközös terápiája

ülésselnök: **dr. Rurik Imre**

Szívelégtelenség gyógyszeres terápiája

dr. Nyolczas Noémi

Szívelégtelenség eszközös terápiája és a kapcsolódó telemetriás lehetőségek

dr. Földesi Csaba

Kardiológiai telemetria eszközparkja - technológiai bemutató

dr. Jakus László, Sélley Torda

15:20-16:20

Novo Nordisk szimpózium - Orvosi teendők 27 kg/m² BMI-től

ülésselnök: **dr. Torzsa Péter**

Obezitás: Kezeljük?! Mikor kérjünk segítséget az endokrinológustól

dr. Valkusz Zsuzsanna

Nézzünk magunkba, hol tartunk az obezitás (BNO E6690) kezelésében?

dr. Dózsa Katalin

16:20-16:40

Szünet

16:40-19:25

EGIS szimpózium - Párbeszéd a háziorvos és a specialista között

ülésselnök: **dr. Habony Norbert**

Antibiotikumrezisztencia elleni küzdelem a gyakorlatban - a cystitis, recidív cystitis korszerű kezelése

dr. Krauth Barbara, dr. Vajer Péter

Változások a diagnosztika helyét, a terápia felépítését, illetve a hosszú távú gondozást illetően

dr. Ács Tamás

Hogyan csökkenthető a hyperurikaemia érkárosító hatása?

dr. Alföldi Sándor

Gastroprotekció NSAID/TAG/OAC terápia mellett

dr. Hersényi László

Szünet (15 perc)

Korlátok nélkül - hogyan építsem tovább a metformin bázisterápiát?

dr. Körei Anna

Miért fájhat a koszorúér és/vagy diabéteszes beteg lába?

dr. Farkas Katalin

Hogyan tehetjük a diszlipidémiás betegeinket fegyelmezett együttműködővé?

dr. Reiber István

19:25

Teszt



Bilergin[®]
Bilasztin



KIÚT AZ ALLERGIÁBÓL

Sokoldalú megoldás allergiás rhinoconjunctivitis és urticaria hatékony kezelésére



RICHTER GEDEON

Richter Gedeon Nyrt., székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., www.gedeonrichter.com

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

Mellékhatás / Nemkívánatos esemény bejelentése és orvosszakmai kérdés esetén elérhetőség: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu.

A termék alkalmazásával kapcsolatos információkról a termekinformatio@richter.hu címen érdeklődhet.

Document ID: KEDP/DAEQCY, Lezárás dátuma: 2023.04.04.



Bilergin[®] 20 mg tabletta

https://ogyel.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show_details&item=194559

A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2021.05.20.

A Bilergin[®] 20 mg tabletta egészségbiztosítási támogatással nem rendelkező gyógyszer.

2023.04.22. Szombat

08:00-09:30

Oktató továbbképzés
üléelnök: **dr. Torzsa Péter**

09:30-09:40

Szünet

09:40-11:40

Sandoz szimpózium
üléelnök: **dr. Járai Zoltán**
Célok és feladatok a magyarországi hipertónia ellátás javításáért

dr. Járai Zoltán

Amiről nem feledkezhetünk meg - A hypertensio komplex célszervi, kognitív hatásai. Kezelési lehetőségek ARB-vel.

dr. Ábrahám György

Antibiotikus kezelés otthon szerzett pneumóniákban

dr. Hidvégi Edit

Diszkusszió

A 2-es típusú diabetes antihyperglykémias terápiajának speciális szempontjai

dr. Bódis Beáta

Az orvos-beteg partneri viszony kiépítése

dr. Birkás Béla

Diszkusszió

11:40-12:00

Szünet

12:00-13:00

Richter szimpózium
üléelnök: **dr. Hargittay Csenge**
Típusos vagy atípusos? A pneumonia rejtelsei
dr. Tamási Lilla
Hol tart a hormonális fogamzásgátlás a 21. században?
dr. Nagy Gyula Richárd

13:00

Teszt

13:00-14:00

Ebédszünet

AVAXIM® 160E

Inaktivált hepatitis A vakcina

A 0,5 ml-es Avaxim 160 Egység szuszpenziós injekció a **HEPATITIS A** vírusfertőzés megelőzésére szolgáló aktív immunizálásra javallott **16 éves kortól serdülők és felnőttek számára.**

Az Avaxim 160 Egység szuszpenziós injekció alkalmazási előírása a QR kód leolvasásával tekinthető meg:



Forrás: Avaxim 160 Egység szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben (Hepatitis A vakcina, inaktivált, adszorbeált) alkalmazási előírása. (Letöltve: 2023. 03. 07.)

AZ AVAXIM 160E ÉS A TYPHIM Vi VÁLTOZATLANUL ELÉRHETŐ!

TYPHIM Vi®

poliszacharid hastífusz vakcina

HASTÍFUSZ prevenciója **felnőttekben és 2 év feletti gyermekekben**, különösen az endémiás területekre utazók, ilyen területeken hosszabb ideig tartózkodók, továbbá menekültek, az egészségügyi személyzet és a fegyveres erők tagjai számára javasolt.¹

Hastífusz elleni védőoltásban kell részesíteni azon munkavállalókat, akiknek folyamatos, vagy időszakosan végzett munkája során a S.Typhi-vel való fertőződés nem zárható ki.²

A Typhim Vi szuszpenziós injekció alkalmazási előírása a QR kód leolvasásával tekinthető meg:



Referenciák:

1. A Typhim Vi oldatos injekció előretöltött fecskendőben (poliszacharid hastífusz vakcina) alkalmazási előírása. (Letöltve: 2023. 03. 07.)
2. A Nemzeti Népegészségügyi Központ módszertani levele a 2023. évi védőoltásokról

MAT-HU-2300389 Lezárás dátuma: 2023. 04.

Sanofi-Aventis Zrt. 1138 Budapest,
Váci út 133. „E” épület 3. emelet
Sanofi: (+36 1) 505 0050
Gyógyszer- és egyéb termékín-
formáció: (+36 1) 505 0055
Web: www.sanofi.hu

sanofi

2023.04.22. Szombat

14:00-15:30

Wörwag szimpózium

üléelnök: **dr. Márkus Bernadett**

Neuropathia – gyakorlati tudnivalók családorvosok részére

dr. Ádám Ilona

B12 vitamin hiányos állapotok kezelése a családorvosi praxisban – kihívások, megoldások

dr. Vörös Krisztián

A magnézium szerepe, magnéziumhiány nőgyógyászati vonatkozásai a családorvosi praxisban

dr. Joó József Gábor

15:30-16:00

Merz Pharmaceuticals szimpózium

üléelnök: **dr. Márkus Bernadett**

Hepatitis encephalopathia

dr. Szalay Ferenc

16:00-16:20

Szünet

16:20-17:00

Exeltis szimpózium

üléelnök: **dr. Kalabay László**

Hypothyreosis a családorvosi ellátásban

dr. Valkusz Zsuzsanna

Akut, nem komplikált cystitis kezelése a jelen urológiai ajánlások alapján - teendők a háziorvosi gyakorlatban

dr. Balló András

17:00-18:00

Servier szimpózium

üléelnök: **dr. Kalabay László**

Beteg adherencia jelentősége a krónikus vénás betegek ellátásában

dr. Pécsvárad Zsolt

T2DM ellátásának aktualitásai az új irányelvek és a gyakorlat alapján

dr. Dezső Enikő

A krónikus koronária szindróma személyre szabott kezelése

dr. Vorobcsuk András

18:00-18:30

Nutricia szimpózium - A malnutrició rizikószűrése és a táplálásterápia megvalósulása a családorvosi gyakorlatban

üléelnök: **dr. Kalabay László**

Hazai tapasztalatok bemutatása

dr. Vajer Péter

Újdonságok a szűrés és a táplálásterápia területén

dr. Molnár Andrea

18:30

Teszt

SKUDEXA®

Tramadol-hidroklorid + Dextetopropfen
75 mg/25 mg

Multimodális, hatásos analgészia és az akut fájdalom gyors csillapítása egyetlen tablettában^{1,3,4,5}



Mérsékelttől súlyosig terjedő akut fájdalom esetén²

Opioid típusú analgetikum/NSAID²

Orális fix dózisú kombináció²



DAVID

Dextetopropfen Analgesic eVolution with tramadol

VIZSGÁLAT⁵

DAVID vizsgálat: Multicentrikus, randomizált, kettős-vak, fázis IIIb, vizsgálat, melybe 653 egészséges 18 év feletti felnőtt voltak be, akiknél legalább egy teljesen vagy részben impaktált alsó bölcsességfog csontolt és érinthető műtét elvégzését tervezték. Azon résztvevőket, akik a műtét utáni 4 órán belül a fájdalomukat mérsékelttől a súlyosig terjedőnek értékelték [≥4 pont a 11 pontos numerikus skálán (NRS)], az alábbi csoportra randomizálták: **tramadol/dextetopropfen 75 mg/25 mg (n=260)**, **tramadol/paracetamol 75 mg/650 mg (n=262)** vagy placebo (n=131) egyszeri dózis száján át. Az elsődleges hatékonysági végpont a TOTPAR (total pain relief, azaz teljes fájdalomcsillapítás) volt, amelyet egy 40 pontos verbális értékelő skálával mért fájdalomcsillapítási pontszámok súlyozott összege alapján számítottak ki [0 = nincs fájdalomcsillapítás, 4 = teljes fájdalomcsillapítás], az adag bevétele után hat órán keresztül [TOTPAR]³.

Szuperior fájdalomcsillapítás^{5*}

Gyorsabban kialakuló hatás^{5*}

Nagyobb mértékű és tartós fájdalomcsillapítás^{5*}

Kedvező biztonságossági profil^{5*}

* vs. 75 mg tramadol / 650 mg paracetamol kombináció

Terápiás javallatok²

A mérsékelttől súlyosig terjedő akut fájdalom rövidtávú tüneti kezelése olyan felnőtt betegek számára, akiknél a fájdalom a tramadol és dextetopropfen kombináció alkalmazását teszi szükségessé.²

Adagolás²

Felnőttek: A javasolt adag egy tablettát. Szükség szerint további dózisok alkalmazhatók, de az adagolási intervallum nem lehet 8 óránál rövidebb, és a kezelés időtartama nem haladhatja meg az 5 napot.²

Skudexa 75 mg / 25 mg filmtabletták

75 mg tramadol-hidroklorid és 25 mg dextetopropfen filmtablettákban.

Kérjük, olvassa el az alkalmazási előírás teljes szövegét a mellékletekben, ellenjavallatok és az alkalmazási kapcsolatos óvintézkedések teljes listáját.

A hatályos "alkalmazási előírás" teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezéstudományi Intézet (www.ogyek.gov.hu/gyogyszeradatoszaj) honlapon. OGYE honlapon keresztül történő elérés útján: www.ogyek.gov.hu; ADA/BAZSOK, NYILVANTARTÁSOK, Gyógyszer-adatbázis, Gyógyszer neve (gyógyszeradatok) keresés esetén: szabadon választható a termék „bránd név” megadását; a „KÉREKES INDÍTÁSA” az korra vagy **alkalmazási előírás** hiperlinkre történő kattintás. A készítmény nem támogatott. A jelenlét fagyaszorít: Skudexa 75mg/25mg filmtabletták 10x1,307 Ft, Skudexa 75mg/25mg filmtabletták 15x1,750 Ft. Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neek.gov.hu honlapon található információkat. Belső (belső): <http://www.neek.gov.hu>; SZAKMÁNK: GYÓGYSZER/GYÓGYSZERTÁRSI SEGÉDJELEZŐ/GYÓGYSZER/ TÁMOGATÁSOK; Egyszerűsített szövegek: PUBLIKUS GYÓGYSZERTÁRSI VÉGLEGES TÖRZS Katalógus; Kérjük, olvassa el rendeltetéséhez kötött gyójszer IV).

Nemkívánatos hatások, mellékhatások: A Skudexa tablettával végzett klinikai vizsgálatokban leggyakrabban megfigyelt mellékhatások az alábbiak voltak: hányás (a betegek 2,9%-a), hányinger (betegek 2,7%-a) és szédülés (betegek 1,1%-a). A dextetopropfen alkalmazása előírásában szereplő leggyakoribb mellékhatások: Gyakori [≥1/100] <1/10 a betegek 1-10%-a között; Átlagosan fájdalom, diarrhoea, dyspepsia, hányinger, hányás. A tramadol alkalmazása előírásában szereplő leggyakoribb mellékhatások: Nagyon gyakori [≥1/10] a betegek 10%-a között; szédülés, hányinger, Gyakori [≥1/100] <1/10 a betegek 1-10%-a között; fejfájás, szomnolencia, obstruktív alvási apnoe, hányás, hyperhidrosis, fáradtság érzet. **Ellenjavallatok:** Figyelembe kell venni a dextetopropfen és a tramadol monoterápia esetében jelentett ellenjavallatokat. A dextetopropfen nem alkalmazható az alábbi esetekben: dextetopropfen vagy bármely más nem-steroid gyulladáscsökkentő szerrel (NSAID) vagy a készítmény bármely segédanyagával szembeni túlérzékenységgel; ha NSAID szedése után asztma roham, bronchospasmus, akut rhinitis lép fel, orrpolip fejlődik ki, urticaria vagy angioneurotikus oedéma jelentkezik; ketorolán- vagy furoidkezelés kapcsán előforduló, ismert fenyőallergia vagy furoidallergia reakció; ha aktív peptikus gyomorfekély/ gastrointestinális hemorragia áll fenn, illetve ha az anamnézisben gastrointestinális vérzés, fekélyképződés vagy perforáció fordult elő; ha az anamnézisben gastrointestinális vérzés vagy perforáció fordult elő korábbi NSAID kezelés kapcsán; krónikus dyspepsia; más aktív vérzésben vagy vérsírt rendellenesség; Crohn-betegség vagy colitis ulcerosa; súlyos szívlegyógyászat; közepesen súlyos vagy súlyos vesekárosodás [creatinine-clearance <30 ml/perc/1,73 m²]; súlyos májfunctió zavar (Child-Pugh C); haemoglobinopátia vagy más vörösvérsejt-zavar; súlyos dehidratáció. A tramadol nem alkalmazható az alábbi esetekben: tramadol vagy a készítmény bármely segédanyagával szembeni túlérzékenységgel; alkohollal, hipnotikummal, fájdalomcsillapítóval, opioiddal vagy pszichotróp szerrel történő akut interakció; monoamin-oxidáz (MAO) gátló terápia alatt, illetve a kezelés felfüggesztését követő 14 napon belül; kezeléssel nem megfelelően kontrollált epilepsia esetén; súlyos agyszűrés esetén. **Különleges figyelemre méltóak és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések:** Figyelembe kell venni a dextetopropfen és a tramadol monoterápia esetében jelentett különleges figyelemre méltó óvintézkedéseket. Kerülendő a dextetopropfen egyidejű alkalmazása más NSAID-akkal, beleértve a szelektív ciklooxygenáz (COX)-2-gátlókat is. A gastrointestinális vérzés, illetve a perforáció kockázata

növekszik az NSAID-ok adagjának emelésével, illetve olyan betegek esetében, akiknél korábban volt már gyomorfekély, különösen, ha az vérzéssel vagy perforációval súlyosított volt, valamint időskorúknál. Károsodott veseműködés esetén az NSAID-ok alkalmazása a vesefunkció romlását, folyadék-visszatartást és ödéma képződést eredményezhet. Fokozott óvatosságot szükséges ábrakodni kezelésben részesülő, illetve hypovolaemiára hajlamos betegekkel is, mert esetükben fokozott a nephrotikus kockázata. Dextetopropfen alkalmazása vezethet a vesét érintő mellékhatások kialakulásához. Nem megfelelően kontrollált hypertonia, pangásos szívelégtelenség, diagnózistól ischaémás szívelégtelenség, perifériás artériás betegség és/vagy cerebrovasculáris betegség esetén a dextetopropfenrel történő kezelést csak gondos mérlegelés után szabad megkezdni. Hasonló megfontolások szükségesek olyan betegek tartós kezelésének megkezdése előtt, akinek cardiovascularis betegségei hajlamosítják a hipertóniára, hyperlipidomra, diabetes mellitusra, dühmásra, illetve fűzők esetén nagyobb a nem-steroid gyulladáscsökkentővel összefüggő mellékhatások gyakorisága, különösen a gastrointestinális vérzés vagy perforáció, amelyek végettehetnek. A tramadol csak fokozott óvatossággal adható fejfájásra, shock, bizonytalan eredetű csökkent éberségre, járólavatóra, a légzőszervi vagy a légzésfunkció zavarai, kórosan nagy nyomáscsökkenés esetén. Óvatosságot érzékeny betegekkel a tramadol csak óvatossággal alkalmazható, fokozott körültekintés szükséges légzésdepresszió, egyidejűleg alkalmazott központi idegrendszeri depresszánsok esetén. Epilepsia vagy ágyasorokorra hajlamos betegek tramaddal csak kényeztető körülmények fennállása esetén kezelhetők. Tolerancia, pszichés és fizikai függőség alakulhat ki, különösen hosszú távú alkalmazás követően. Gyógyszerabúzsra vagy függőségre hajlamos betegek csak rövid ideig, szigorú orvosi felügyelet mellett kezelhetők tramaddal. Ha egy beteg nem igényel további tramadol-kezelést, az elvonási tünetek megelőzése céljából a dózis fokozatos csökkentése javasolt. A nyugtatók mint például a benzodiazepinek vagy hasonló gyógyszerek és a Skudexa egyidejű alkalmazása szédülést, légzésdepressziót, kómat és halált okozhat. Sedatív gyógyszerekkel egyidejűleg történő előírása esetén, a legáltalánosabb hatásos dózist kell alkalmazni, és a kezelési időtartamának a lehető legrövidebbnek kell lennie. Potenciálisan elviesztévesz szerotonin-szintinhibitorok szedésekor be kell venni a betegek esetén, akik tramaddal kaptak egyidejű szerotonerg gyógyszerekkel kombinálva vagy önmagukban. Tethesség és szoptatás során a Skudexa alkalmazása ellenjavallt.

1. Moore RA, McQuay HJ, Tomaszewski J, Raba G, Tufanaru D, Uetziene N, et al. BMC Anesth. 2016 Jan 22;16:9. 2. SKUDEXA®. Alkalmazási előírás (2022.07.15.). 3. McQuay HJ, Moore RA, Berta A, Gouinardovs O, Fülöp B, Pávanekas N, et al. Br J Anaesth. 2016 Feb;116(2):269-76. 4. Moore RA, Gay-Escoda C, Figueiredo R, Tóth-Bogó I, Dietrich T, Miller S, et al. J Headache Pain. 2015;16(6). 5. Gay-Escoda C, Hanna M, Montero A, Dietrich T, Miller S, Giergel E, et al. BMJ Open. 2019 Feb 19;9(2):e023715. doi: 10.1136/bmjopen-2018-023715.

BERLIN-CHEMIE
MENARINI

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.
1087 Budapest, Hungária kör. 30/A. Tel.: +361 799 7320

HU-SKU-05-2022-v01-printad-#32471
Lezárás dátuma: 2022.08.20.
Érvényesség dátuma: 2024.08.20.

2023.04.23. Vasárnap

08:30-09:30

Viatris szimpózium

üléelnök: **dr. Becze Ádám**

Allergiák manifesztációi a klinikai gyakorlatban:

légúti allergiák, anafilaxia – tanulságos esetek

dr. Kraxner Helga

dr. Krasznai Magdolna

09:30-10:00

Fresenius szimpózium

Innovatív vasterápia – avagy milyen eredményeket

érhetünk el szukroszomiális vaskészítménnyel?

dr. Schafer Eszter

10:00-10:20

Szünet

10:20-11:20

Harc a női szívekért szimpózium

üléelnök: **dr. Masszi Gabriella**

Hogyan menedzseljük a mellkasi fájdalommal jelentkező beteget?

dr. Zámolyi Károly

Sztatin-fibrát kombináció = egy hamis házasság dicstelen vége!

dr. Császár Albert

A kávéfogyasztás hatásai; végül is hasznos, vagy káros?

dr. Masszi Gabriella

11:20-12:20

Berlin Chemie szimpózium - Minek van szezonja?

üléelnök: **dr. Perjés Ábel**

Hipertónia és nefroprotekcio - indikátor rendszer

dr. Torzsa Péter

Kezeljük közösen a vesebeteget!

dr. Répási Péter

Allergiás rhinitis 2023

dr. Rónai Zoltán

12:20-12:30

Szünet

12:30-14:00

KRKA szimpózium

üléelnök: **dr. Zsuffa János**

Hitek és tévhitek a vérnyomáscsökkentő kombinációkról
eset bemutatás

dr. Nagy Viktor

Miért, hogyan és kinek? Kardiovaszkuláris kockázat
csökkentés sztatinnal

dr. Simonyi Gábor

Savfüggő kórképek kezelése és Helicobacter pylori
eradikáció - mindent tudunk, mindent jól csinálunk?

dr. Hersényi László

14:00

Zárszó, teszt

Bővül a Meforal® család!

ÚJ!



Meforal® XR
METFORMIN HYDROCHLORIDE

**Naponta
egyszer**



1. Napi egyszeri adagolás lehetősége!



2. Jobb adherencia a kezelés során?



3. Kevesebb lehetséges gasztrointesztinális mellékhatás az azonnali hatóanyag-leadású tablettához viszonyítva^{3,4}



https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show_details&item=165453
https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show_details&item=165451
https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show_details&item=165449

Meforal XR 1000 mg/750 mg/500 mg alkalmazási előírások (2018.12.10): Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! A hatályos "alkalmazási előírások" teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (<https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/>) honlapján. Elérési útvonal: <https://ogyei.gov.hu>; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve, a „KERESÉS INDÍTÁSA”, a találatok oldalán ikonra kattintás, majd az ikonra kattintás. **Kiadhatóság:** Kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer (V).

Hivatkozások: 1. Alkalmazási előírások: Meforal® XR 1000 mg/750 mg/500 mg retard tabletta (2018.10.27); 2. Donnelly LA, et al. "Adherence in patients transferred from immediate release metformin to a sustained release formulation: a population-based study." *Diabetes Obes Metab.* 2009; 11(4):338-342. 3. Derosa G, D'Angelo A. "Effects of metformin extended release compared to immediate release formula on glycemic control and glycaemic variability in patients with type 2 diabetes." *Drug Design, Development and Therapy.* 2017; 11:1481-1488. 4. Levy J, et al. "Assessment of efficacy and tolerability of once-daily extended release metformin in Patients with type 2 diabetes mellitus." *Diabetology & Metabolic Syndrome.* 2010; 2:16



**BERLIN-CHEMIE
MENARINI**

Berlin-Chemie/A Menarini Kft
1087 Budapest, Hungária krt. 30/A.
Tel.: +361 799 732

Lezárás dátuma: 2022.03.23. Érvényesség dátuma: 2024.03.23.
HU-MEF-02-2022-V01-ad-#30155

Innovációval az életminőség javításáért

A podcast hallgatói 2024-es konferencia belépőt nyerhetnek!



AMIT NEM MERTÉL MEGKÉRDEZNI

podcast sorozat háziorvosoknak
aktuális témák a gyógyító szakma
mindennapjaiból



**OLVASD BE
A QR KÓDOT**

vagy keresd a
www.medukator.eu
oldalon

A Medukator podcast
házigazdái:

Dr. Jancsó Zoltán
Dr. Vajer Péter

OBEZITÁS

Változtassunk rajta időben!



Saxenda®
a testsúly csökkentésére
engedélyezett
egyetlen GLP-1 RA.^{1,2*}

BNO E6690 - Elhízás, k.m.n
„V” - Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

*A Saxenda® a testtömeg csökkentésére kiegészítő kezelésként szolgál a fokozott fizikai aktivitás, valamint felnőtt betegek esetében a csökkentett kilokalória tartalmú étrend, serdülők (≥12 év) esetében pedig az egészséges táplálkozás mellett.¹ A Saxenda® az egyetlen GLP-1 RA, amely elérhető Magyarországon a testsúly csökkentésére.²

További részleteket az alkalmazási előírás 4.1 pontja tartalmaz.

A modellek illusztrációs célt szolgálnak.

Referencia: 1. Saxenda® alkalmazási előírás 2. <http://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis> (Elérés dátuma: 2023.04.05.)

A GYÓGYSZER NEVE: Saxenda® 6 mg/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban

MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: 6 mg liraglutidot* tartalmaz 1 ml oldatban.

18 mg liraglutidot tartalmaz 3 ml-ben, előretöltött injekciós tollanként.

*humán glükagonszerű peptid-1- (GLP-1-) analóg, rekombináns DNS-technológiával *Saccharomyces cerevisiae*-ben előállítva.

GYÓGYSZERFORMA: Oldatos injekció. Tiszta és színtelen vagy csaknem színtelen, izotóniás oldat; pH = 8,15.



A KÉSZÍTMÉNY RENDELÉSE ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL A HATÁLYOS TELJES ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁST!

A hatályos alkalmazási előírás teljes szövege megtalálható az Európai Gyógyszerügynökség honlapján:

<https://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Saxenda#product-information-section>

Megjegyzés: A QR kód a készítmény oldalára mutat. A magyar nyelvű alkalmazási előírás ezen az oldalon a Product information szakasz első lenyíló listájában (Available languages), a Hungarian szóra kattintva érhető el.

FELTÉTELEZETT MELLÉKHATÁSOK BEJELENTÉSE: A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresztül: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Postafiók 450, H-1372 Budapest; honlap: www.ogyei.gov.hu.

TÁMOGATÁSSAL, ÁRRAL VALAMINT RENDELHETŐSÉGGEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ:

A Saxenda® 6 mg/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban osztályozási besorolása: „V” - Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer. Társadalombiztosítás által elfogadott árral és támogatással nem rendelkezik.

A Saxenda® a Novo Nordisk A/S, Dánia védjegye. © 2023 Novo Nordisk A/S