

# Hogyan ismerje fel a kanyarót?

## KLINIKAI TÜNETEK ÉS JELLEMZŐK

Ha felmerül önben a kanyaró megbetegedés gyanúja, azonnal hívja a háziorvosát. A kanyaró tipikusan olyan betegség, amelyet csak egy jól felkészült orvos tud megfelelően diagnosztizálni!

### INKUBÁCIÓS IDŐ

- A fertőzéstől a tünetek megjelenéséig **10-12 nap**
- A fertőzéstől a kiütések megjelenéséig: **14 nap**



### PRODROMA, KORAI TÜNETEK

- Átlagosan **2-4 napig** tart
- 39-40°C-os láz
- Orrfolyás, náthaszerű tünetek, köhögés és kötőhártyagyulladás
- Koplik foltok a szájnyálkahártyán



### KIÜTÉS

- **5-6 napig** tart
- A hajvonalnál kezdődik, majd az arc és a nyak felé terjed, ezt követően lefelé a törzsre, majd kifelé a kezek és lábak felé.
- A súlyosabban érintett területek pikkelyszerűen hámlanak le
- A kiütések a megjelenés sorrendjében tűnnek el.



### SÚLYOS KIMENETEL, SZÖVŐDMÉNYEK

- Hasmenés
- Középfülgyulladás
- Tüdőgyulladás
- Agyvelőgyulladás
- Szubakut szklerotizáló panenkefalitisz
- Halál



[WWW.SEMMELWEIS.HU/ESK](http://WWW.SEMMELWEIS.HU/ESK)

