

Milyen járványügyi intézkedések szükségesek kanyaró gyanúja esetén?

A FERTŐZÉS TERJEDÉSÉNEK A MEGELŐZÉSE

Ha felmerül Önben a kanyaró megbetegedés gyanúja, **azonnal jelentse be** a területileg illetékes kormányhivatalnak. A kanyaró egy olyan fertőző betegség, amely kapcsán a **járványügyi intézkedéseket rendelet (18/1998.(VI.3.) NM rendelet*) írja elő!**

TEENDŐK A BETEGGEL

Bejelentendő a gyanús, a valószínűsített és a megerősített eset

- 1. gyanús eset:** klinikai feltételek (láz + maculopapulosus bőrkiütés ÉS köhögés vagy nátha vagy kötőhártya-gyulladás)
- 2. valószínűsített eset:** klinikai feltételek + epidemiológiai kapcsolat
- 3. megerősített eset:** klinikai feltételek + legalább egy laboratóriumi feltétel (és a mintavétel előtti 1-6 hétben nem kapott oltást)

Elkülönítés: kötelező (klinikai állapot szerint otthon vagy kórházban)

Mikrobiológiai vizsgálat: kötelező (garattörlet VTM-ben, vizeletminta, vérminta-pár)

Fertőtlenítés: folyamatos



TEENDŐK A BETEG KÖRNYEZETÉBEN

A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása: kötelező

Járványügyi célú mikrobiológiai szűrővizsgálat: nem szükséges

Járványügyi megfigyelés: nem szükséges

Postexpoziációs profilaxis: a 12-14 hónapos kisdedeket, a 15 hónaposnál idősebb, oltási/újraoltási dokumentummal nem rendelkező gyermekeket kanyaró ellen oltani kell. Az idősebb gyermekek, ifjak közösségében felbukkant megbetegedés esetén konzultáció az NNGYK**-val

Fertőzőforrás-kutatás: kötelező



*18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

** Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ