

Ápolás és betegellátás szak/Szülésznő szakirány

Záróvizsga tesztkérdések

2021

I. Egyszerű feleletválasztás

1. Válassza ki a kóros OGTT leletet. A számok vércukor értéket jeleznek mmol/l-ben.

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| A. éhomi vércukor: 4,8 | 120 perces vércukor: 6,8 |
| B. éhomi vércukor: 5,0 | 120 perces vércukor: 7,2 |
| C. éhomi vércukor: 5,4 | 120 perces vércukor: 7,6 |
| D. éhomi vércukor: 4,2 | 120 perces vércukor: 8,2 |

Helyes válasz: D

2. Mennyi a normális szisztolés vérnyomás terhességben?

- A. 110-145 Hgmm közötti
- B. 90-150 Hgmm közötti
- C. 140 Hgmm alatti**
- D. 130-150 Hgmm közötti

Helyes válasz: C

3. Melyik vérnyomáscsökkentő alkalmazása kontraindikált a várandósság alatt?

- A. methyldopa (Dopegyt)
- B. metoprolol (Betoloc)
- C. nifedipin (Corinfar)
- D. ACE inhibitor (Tensiomin)**

Helyes válasz: D

4. Mit jelent a HELLP-szindróma rövidítésben a „H” betű?

- A. hipertónia
- B. hemolízis**
- C. hipertermia
- D. hiperurikémia

Helyes válasz: B

5. Melyik laboratóriumi paramétert nem szükséges vizsgálni praeeclampszában?

- A. SGOT (szérum glutaminsav-oxálesetsav transzamináz)
- B. trombocitaszám
- C. haptoglobin
- D. ALP (alkalikus foszfatáz)**

Helyes válasz: D

6. HELLP-szindróma esetén az LDH értéke:

- A. mindig 400 U/L alatti
- B. mindig 100-500 U/L közötti
- C. mindig 600 U/L feletti**
- D. mindig 600 U/L alatti

Helyes válasz: C

7. Melyik vérnyomáscsökkentő szer alkalmazása szükséges akut vérnyomás kiugrás esetén?

- A. methyldopa
- B. metoprolol
- C. nifedipin**
- D. prazosin

Helyes válasz: C

8. Mit jelent a terápiarezisztens hipertónia?

A. Ha a magas vérnyomás 3 vagy több különböző támadáspontú vérnyomáscsökkentővel sem csökkenthető tartósan.

B. Ha a kalciumcsatorna-blokkoló és a bétablokkoló együttes alkalmazása sem tudja a magas vérnyomást tartósan csökkenteni.

C. Ha a magas vérnyomás nem csökkenthető mással, csak iv. adott verapamillal.

D. Ha két különböző hatású vérnyomáscsökkentő mellett még Mg-infúziót is kell adni ahhoz, hogy a magas vérnyomás jelentősen csökkenjen.

Helyes válasz: A

9. Melyik esetben szükséges már az I. trimeszterben OGTT vizsgálatot végezni?

A. Ha a várandós BMI értéke 40 feletti

B. Ha a várandós BMI értéke 20-25 közötti

C. Ha az előző terhességből született magzat születési súlya 3500-4000 g között volt

D. Ha először terhes, először szülő asszonyról van szó

Helyes válasz: A

10. A hüvelyben és a végbélben a béta csoportú streptococcus vizsgálatának időpontja:

A. 28. terhességi hét

B. a 32. terhességi hét

C. a 36. terhességi hét

D. minden trimeszterben egy alkalommal

Helyes válasz: C

11. A húgyúti fertőzést okozó leggyakoribb kórokozó:

A. Béta csoportú streptococcus

B. Klebsiella pneumoniae

C. E. coli

D. Staphylococcus saprophyticus

Helyes válasz: C

12. Húgyúti fertőzés esetén melyik antibiotikum adása ellenjavallt:

- A. penicillin
- B. cephalosporin
- C. nitrofurantoin
- D. tetracyclin**

Helyes válasz: D

13. Milyen arányban alakul át a krónikus hipertónia praeeclamsiává?

- A. 5% alatt
- B. 75%-ban
- C. 25%-ban**
- D. 1-2%-ban

Helyes válasz: C

14. A praeeclampsia megelőzése céljából az aszpirin szedését mikor kell elkezdni?

- A. a 20. hét után
- B. a 16. hét után
- C. a 11-16. hét között**
- D. az 5-6. héten

Helyes válasz: C

15. Melyik válasz igaz?

- A. Praeeclamsiát követően a cardiovascularis betegségek kockázata nő.**
- B. Nincs összefüggés a praeeclampsia és a későbbi cardiovascularis betegségek gyakorisága között.
- C. Praeeclampsia után a pancreatitis gyakrabban fordul elő.
- D. Praeeclamsiát követően a cardiovascularis betegségek előfordulásának kockázata a 15-szeresére emelkedik.

Helyes válasz: A

16. A CTG paramétereit közül melyik nem kóros jel?

- A. beszűkült oszcilláció
- B. DIP-II
- C. tachycardia
- D. akceleráció**

Helyes válasz: D

17. Melyik négy tünet a praeeclampsia szubjektív tünete?

- A. szédülés, nehézlégzés, epigastriális fájdalom, hasi görcs
- B. deréktáji fájdalom, fejfájás, látászavar, epigastriális fájdalom
- C. epigastriális fájdalom, látászavar, fejfájás, nehézlégzés**
- D. epigastriális fájdalom, látászavar, ájulásszerű rosszullét, általános gyengeség

Helyes válasz: C

18. Melyik szűrővizsgálat elvégzése javasolt a 18-20. terhességi héten?

- A. toxoplasma-szűrés
- B. OGTT
- C. II. ultrahang szűrővizsgálat**
- D. HBsAg szűrés

Helyes válasz: C

19. Naegele-számítás szerint mikorra várható a szülés időpontja, ha az utolsó menstruáció első napja 2019. október 22. volt? Az asszonynak 28 napos ciklusai vannak.

- A. 2020. július 27.
- B. 2020. július 15.
- C. 2020. augusztus 29.
- D. 2020. július 29.**

Helyes válasz: D

20. Melyik gyógyszer tartozik a tokolítikumok közé?

- A. methyldopa
- B. dexamethason
- C. nitrofuratoin
- D. nifedipin**

Helyes válasz: D

21. Van-e olyan teszt, mely minden praeclampsziás esetet előre képes jelezni?

- A. van csak nagyon drága
- B. nincs**
- C. van csak nagyon bonyolult a használata
- D. van csak nem terjedt el széles körben

Helyes válasz: B

22. A magnézium intoxicatio jele:

- A. szűk pupilla
- B. rendszeresen görcsölő vádli
- C. patella-reflex kiesése**
- D. ízérzés kiesése

Helyes válasz: C

23. Melyik állítás igaz?

- A. a szteroid-profilaxis csak 48 óra után fejt ki a hatását, korábban egyáltalán nincs hatása
- B. a szteroid-profilaxis nem befolyásolja a szénhidrát-anyagcserét
- C. szteroid adása után csökken az agykamrai vérzés és az IRDS gyakorisága**
- D. a szteroid-profilaxis hetenkénti ismétlésének nincs hatása a magzati fejlődésre

Helyes válasz: C

24. Magyarországon hány százalékban fordul elő koraszülés?

- A. 5% alatt
- B. 15% felett
- C. 5-6%
- D. 8-9% között**

Helyes válasz: D

25. Koraszülés megelőzésére melyik terápiát alkalmazzuk?

- A. prosztaglandin alkalmazása + cerclage
- B. progeszteron + kálium szupplementáció
- C. szteroid + spironolacton alkalmazása
- D. progeszteron alkalmazása + cerclage**

Helyes válasz: D

26. Melyik vizsgáló módszer alkalmas a burokrepedés diagnosztizálására?

- A. color Doppler ultrahangvizsgálat
- B. szérum fibronectin meghatározása
- C. tokográfia
- D. arborizáció**

Helyes válasz: D

27. A koraszülés oka lehet, kivéve:

- A. a méhfal túlfeszülése
- B. gyulladás
- C. a fájástevékenységet kiváltó élettani tényezők idő előtti aktivációja
- D. a szérum prolaktin szint emelkedése**

Helyes válasz: D

28. Válassza ki azt a gyógyszercsoportot, mely nem tokolítikum?

- A. prosztaglandin szintézis gátló
- B. kalciumcsatorna-blokkoló
- C. ACE inhibitor**
- D. oxitocin receptor antagononista

Helyes válasz: C

29. A várandósgondozás protokollja szerint mikor kell elvégezni a HBsAg szűrést?

- A. az I. trimeszterben**
- B. a II. trimeszterben
- C. a III. trimeszterben
- D. a 24-28. terhességi hét között

Helyes válasz: A

30. Mi állhat a macrosomia hátterében?

- A. toxoplasmosis és diabetes mellitus
- B. diabetes mellitus és diabetes insipidus
- C. diabetes mellitus és a szülők alkati tulajdonsága**
- D. diabetes mellitus és asthma bronchiale

Helyes válasz: C

31. Melyik vizsgálatot nem szükséges elvégezni minden alkalommal a terhesgondozói ellenőrzés során?

- A. vérnyomás ellenőrzése
- B. vizelet fehérjetartalmának ellenőrzése
- C. testsúly mérés
- D. méhszáj ellenőrzése**

Helyes válasz: D

32. Melyik állítás nem igaz?

- A. abruptio placentae esetén feto-placentaris transzfúzió jön létre
- B. placenta praevia esetén mindig kontraktilis az uterus**
- C. abruptio placentae esetén uteroplacentaris apoplexia is kialakulhat

D. előzetes császármetszés esetén placenta praevia diagnosztázásakor gondolni kell az incret lepedény lehetőségére

Helyes válasz: B

33. Polyhydramnion esetén az AFI értéke:

A. 24 feletti

B. 18 feletti

C. 8 feletti

D. 20 feletti

Helyes válasz: A

34. Rh isoimmunisatio esetén a magzati anaemia mértékét az alábbi vizsgálattal jellemezhetjük:

A. a magzati aorta véráramlásának mérésével

B. az arteria umbilicalis véráramlásának mérésével

C. az aretria cerebri media véráramlásának mérésével

D. az arteria renalis véráramlásának mérésével

Helyes válasz: C

35. Mikor áll fenn kromoszómarendellenesség gyanúja?

A. oligohydramnion és hypertonia esetén

B. polyhydramnion és IUGR esetén

C. macrosomia és hypertonia esetén

D. asthma bronchiale és hypertonia esetén

Helyes válasz: B

36. Rh isoimmunisatio esetén végzett ultrahangvizsgálat során az alábbiak közül melyik 3 eltérés nem jellemző:

A. a magzat Buddha tartása, ascites, vastag placenta

B. magzati hydrothorax, kettős kontúrú koponya, hepatosplenomegalia

C. hordószerűen elődomborodó magzati hasi, kevés magzatmozgás, az a. cerebri

media véráramlási sebességének gyorsulás

D. echogén belek, az a. umbilicalis véráramlásának gyorsulása, IUGR

Helyes válasz: D

37. Melyik állítás hamis?

A. ikerterhességben gyakoribb az anyai anaemia

B. ikerterhességben gyakoribb a polyhydramnion

C. ikerterhességben gyakoribb a cholestasis

D. ikerterhességben gyakoribb a magzat méhen belüli elhalása

Helyes válasz: C

38. A terhesség alatti jóddhiány következménye lehet, kivéve:

A. vetélés, koraszülés

B. újszülöttkori hypothyreosis

C. újszülöttkori hyperthyreosis

D. kretinizmus

Helyes válasz: C

39. Méhen kívüli terhességet az alábbiak jellemzik, kivéve:

A. vérzéskimaradás után kávéaljszerű vérzés

B. hasi fájdalom

C. a szérum HCG 1,5-2 naponta duplázódik

D. felpuhult méh

Helyes válasz: C

40. Vércukor-profil vizsgálat során az egyórás postprandiális vércukorszintnek az alábbi határérték alatt kell lennie:

A. 5,5 mmol/l alatt

B. 7,8 mmol/l felett

C. 7,0 mmol/l alatt

D. 3,5 mmol/l alatt

Helyes válasz: C

41. Praeclampsiaával szövődött terhességben az anyai halálozás leggyakoribb oka:

- A. agyvérzés**
- B. szívinfarktus
- C. pulmonális embólia
- D. veseelégtelenség

Helyes válasz: A

42. Melyik tünet nem tartozik a praecclampsia szubjektív tünetei közé?

- A. fejfájás
- B. látászavar
- C. vesetáji fájdalom**
- D. epigastriális fájdalom

Helyes válasz: C

43. A várandósgondozás során melyik vizsgálatot nem szükséges minden ellenőrzés során elvégezni.

- A. vérnyomásmérés
- B. vizelet fehérjetartalmának ellenőrzése
- C. a méh kontraktilitásának ellenőrzése és az esetleges fájástevékenység ellenőrzése
- D. vérképvizsgálat**

Helyes válasz: D

44. Ha a nyakiredő (NT) nagyobb, mint 3 mm, akkor:

- A. a tüdő fejlődési rendellenesség kockázata nő
- B. a csontosodási zavar kockázata nő
- C. a praecclampsia kockázata nő
- D. Down-szindróma kockázata nő**

Helyes válasz: D

45. Melyik ultrahangvizsgálat méréseiből lehet legpontosabban következtetni a várható szülési időpontra?

- A. 0. szűrés méréseiből
- B. I. szűrés méréseiből**
- C. II. szűrés méréseiből
- D. III. szűrés méréseiből

Helyes válasz: B

46. A praeclampsia kialakulásának kockázatát az aszpirin az alábbi dózisban csökkenti a legerőteljesebben:

- A. 75 mg/nap
- B. 2x20 mg/nap
- C. 50 mg/nap
- D. 150 mg/nap**

Helyes válasz: D

47. A praeclampsia megelőzése céljából az aszpirint mikor tanácsos bevenni?

- A. reggel éhgyomorra
- B. reggel evés után
- C. este**
- D. mindegy

Helyes válasz: C

48. Mit jelent a tölcsérképződés az ultrahangvizsgálat során?

- A. a külső méhszáj tölcsérszerűen kinyílt
- B. a belső méhszáj tölcsérszerűen kinyílt**
- C. IUGR esetén a mellkas formája tölcsérszerű
- D. a magzati szív speciális fejlődési rendellenességét jellemzi

Helyes válasz: B

49. Melyik állítás jellemző HELLP-szindróma esetén?

- A. Hb > 12,5
- B. trombocitaszám > 150000/ μ l
- C. SGOT > 70 U/L**
- D. szérum húgysav > 400 μ mol/l

Helyes válasz: C

50. Mikor beszélünk koraszülésről?

- A. 28-38. hét közötti szülés esetén
- B. 20-34. hét közötti szülés esetén
- C. 24-37. hét közötti szülés esetén**
- D. ha az újszülött súlya 2500 g alatti

Helyes válasz: C

51. Oligohydramnion esetén az AFI (amniotic fluid index) értéke:

- A. AFI < 10 cm
- B. AFI < 24 cm
- C. AFI < 5 cm**
- D. AFI < 15 cm

Helyes válasz: C

52. A méhnyakzáró műtét feltétele:

- A. álló burok
- B. vérzés
- C. elsimult portio
- D. anamnézisben szereplő koraszülés**

Helyes válasz: D

53. Melyik 3 tünet jellemzi a chorioamnionitist?

- A. leukocytosis, láz, bűzös hüvelyi folyás**
- B. leukocytosis, thrombocytopenia, láz
- C. magzati tachycardia, láz, purpurák a bőrön
- D. magzati tachycardia, bűzös hüvelyi folyás, anyai bradycardia

Helyes válasz: A

54. Miért veszélyes a prosztaglandin szintézis gátló adása terhességben?

- A. rontja az uteroplacentaris vérkeringést
- B. csökkenti a magzati agy vérellátását
- C. elősegíti a Botallo-vezeték záródását**
- D. nyitva tartja a foramen ovale

Helyes válasz: C

55. A méhnyakzáró műtét neve:

- A. conisatio
- B. cerclage**
- C. trachelectomia
- D. metroplastica

Helyes válasz: B

56. Az atosiban nevű gyógyszerre melyik állítás igaz?

- A. kalciumcsatorna-blokkoló
- B. betamimetikum
- C. oxitocin receptor blokkoló**
- D. prosztaglandin szintézis gátló

Helyes válasz: C

57. A koraszülés késői szövődménye lehet:

- A. májelégtelenség
- B. érzékszervi károsodás (hallás, látás)**
- C. PCO-syndroma
- D. Down-syndroma

Helyes válasz: B

58. Melyik két tényező játszik szerepet a koraszülés előrejelzésében:

- A. a szérum fibronektinszint és a húgysavszint emelkedése
- B. az anamnézisben szereplő koraszülés és a magas lactobacillus csíraszám a hüvelyben
- C. a méhnyak hossza és az anamnézisben szereplő koraszülés**
- D. az anamnézisben szereplő koraszülés és a 21 napnál rövidebb menstruációs ciklus

Helyes válasz: C

59. Mikor kell genetikai tanácsadásra irányítani a várandóst?

- A. ha 30 évnél idősebb
- B. ha 35 évnél idősebb
- C. ha 37 évnél idősebb**
- D. ha 18 évnél fiatalabb és 35 évnél idősebb

Helyes válasz: C

60. Mi állhat az oligohydramnion hátterében?

- A. oeseophagus atresia
- B. duodenum atresia
- C. veseanomália**
- D. a tüdő fejlődési rendellenessége

Helyes válasz: C

61. Melyik állapotra nem jellemző polyhydramnion?

- A. diabetes mellitus
- B. chorioangioma
- C. anyai vashiányos anaemia**
- D. iker-iker transzfúzió

Helyes válasz: C

62. Milyen placentációra jellemző a „T” jel?

- A. MMD placentációra jellemző**
- B. DDD placentációra jellemző
- C. MDD placentációra jellemző
- D. MMM placentációra jellemző

Helyes válasz: A

63. Vegetáriánus étrendet folytató várandós esetén az alábbi hiányállapot alakulhat ki:

- A. A-vitaminhiány
- B. vashiány
- C. C-vitamin- és vashiány
- D. B12- vitamin és vashiány**

Helyes válasz: D

64. A méhen kívüli terhesség gyakorisága:

- A. az összes terhesség 0,2%-a
- B. az összes terhesség közel 5%-a
- C. az összes terhesség közel 2%-a**
- D. az összes terhesség közel 0,5%-a

Helyes válasz: C

65. A polyhydramnion oka lehet:

- A. diabetes mellitus és oesophagus atresia**
- B. veseanomália és oesophagus atresia
- C. iker-iker transzfúzió és vese agenesia
- D. ureterszűkület és diabetes mellitus

Helyes válasz: A

66. IUGR esetén mikor kell befejezni a terhességet?

- A. ha a magzati becsült súly 5-10 percentilis közötti
- B. ha az AFI 2 cm alatti**
- C. ha az IUGR mellett anyai hipertónia lép fel
- D. ha az IUGR mellett a legnagyobb magzatvíz zseb 4 cm

Helyes válasz: B

67. Melyik állítás igaz?

- A. DDD placentációra jellemző a „lebegő iker” jelenség
- B. MDD placentáció esetén mindig azonos nemű a két magzat
- C. MMD placentációt a „lambda jel” jellemzi
- D. MMM placentáció esetén nincs magzatburok**

Helyes válasz: D

68. Iker-iker transzfúzió esetén melyik állítás hamis?

- A. iker-iker transzfúzió a monochorialis ikerterhességek 10%-ában fordul elő
- B. a donor magzatnál oliguria, növekedési retardatio, oligohydramnion alakul ki
- C. a recipiens magzatnál polyhydramnion, cardiomegalia, hydrops alakul ki
- D. a donor magzatnál polyhydramnion, cardiomegalia, hydrops alakul ki**

Helyes válasz: D

69. Mit jelent a vasa praevia?

- A. a burok erei a méhszáj területén futnak**
- B. a placenta fedti a belső méhszájat
- C. a köldökzsinór a placenta praeviából ered
- D. előesett köldökzsinór

Helyes válasz: A

70. Hosszú utazás során melyik a leggyakrabban előforduló szövődmény:

- A. gastrooesophagealis reflux jelentkezése
- B. tarkótáji fejfájás
- C. mélyvénás thrombosis az alsó végtagban**
- D. epigastriális fájdalom

Helyes válasz: C

71. Melyik meghatározás fejezi ki a Pearl-indexet?

- A. adott fogamzásgátló módszer alkalmazása esetén rendszeres nemi élet mellett hány nő nem esik teherbe egy év alatt
- B. mekkora a valószínűsége a teherbeesésnek egy év alatt, ha rendszeresen él valaki nemi életet és nem védekezik a teherbeesés ellen
- C. adott fogamzásgátló módszer alkalmazása esetén egy év alatt 100 nő közül hány esik teherbe (rendszeres nemi élet mellett)**
- D. adott fogamzásgátló módszer alkalmazása esetén egy év alatt, rendszeres nemi élet esetén mekkora a teherbeesés valószínűsége a fogamzásgátló tablettát szedőkhöz képest

Helyes válasz: C

72. Mit jelent a dysmenorrhoea?

- A. a menstruációs ciklust nem tartó rendszertelen vérzés
- B. rendszertelenül jelentkező menstruációs erős vérzések
- C. rendszertelenül jelentkező alhasi fájdalom vérzés nélkül
- D. a menstruáció alatti fájdalom**

Helyes válasz: D

73. Milyen gyakorisággal fordul elő az endometriózis?

- A. krónikus kismencedei fájdalom esetén 25%-ban, nők között 30%-ban, meddő nők között 10%-ban fordul elő endometriózis
- B. meddő nők között 30%-ban, krónikus kismencedei fájdalom esetén 50%-ban, egyébként a nő 10%-ában fordul elő endometriózis**
- C. a nők 5%-ában, kismencedei fájdalom esetén 30%-ban, meddőségben 15%-ban fordul elő endometriózis
- D. a nők 10%-ában, meddőségben 20%-ban, krónikus kismencedei fájdalomban 30%-ban fordul elő endometriózis

Helyes válasz: B

74. Melyik 3 tünet jellemző endometriózisra?

- A. kismencedei fájdalom, szédülés, gyengeség
- B. menstruáció alatti láz, meddőség, fejfájás
- C. menstruáció alatti fájdalom, meddőség, a hashártyán tiszta bennékű vezikulumok**
- D. menstruáció alatti fájdalom, fájdalmas közösülés, migraine

Helyes válasz: C

75. Mi nem jellemző az endometriózisra?

- A. ösztrogéndependens betegség
- B. fő tünete a fájdalom és a meddőség
- C. véres széklet
- D. menstruáció alatti mellfeszülés**

Helyes válasz: D

76. Válassza ki a helyes állítást!

- A. endometriózis esetén tilos fogamzásgátlót szedni, mert ösztrogéntartalma miatt a méhnyálkahártya hyperplasiája jöhet létre, ami fokozza a fájdalmat
- B. endometriózis esetén dienogeszt tartalmú szer szedése kontraindikált

C. a GnRH agonista az első választandó szer endometriózisban

D. a MIRENA IUD előnyös lehet adenomyosisban

Helyes válasz: D

77. Melyik állítás igaz bacterialis vaginosisra?

A. a hüvelyi pH > 4,5, a hüvely leggyakoribb gyulladása

B. túró-jellegű folyás, magas aerob baktérium csíraszám

C. kellemetlen szagú folyás, a hüvely hámsejtjeiben zárványtestek mutatathatók ki

D. csak szexuálisan aktív nőkben fordul elő, ampicillinnel jól kezelhető

Helyes válasz: A

78. Melyik tünet nem jellemző bakteriális vaginosisra?

A. a hüvelykenetben clue-sejtek láthatók

B. homogén, szürkésfehér folyás

C. hüvelyváladék pH értéke 4,5 alatti

D. hüvelykenetre cseppentve a KOH hatására kellemetlen halszagot érzünk

Helyes válasz: C

79. Mi nem igaz az alábbiak közül?

A. bacterialis vaginosisban Gardnerella vaginalis csíraszámja emelkedik

B. a bacterialis vaginosis metronidazollal és clindamycinnel kezelhet

C. a lactobacillus fajok száma csökken

D. a bacterialis vaginosis recidiva megelőzésére fluconasolt kell adni

Helyes válasz: D

80. Melyik tényező nem növeli a myoma kockázatát?

A. multiparitas

B. obesitas

- C. PCO-syndroma
- D. családban előforduló myoma

Helyes válasz: A

81. Válassza ki a helytelen válaszokat!

- A. a myoma vetélést okozhat
- B. a myoma diszkomfort érzést okozhat
- C. a myomagöb elhalása fájdalommal járhat
- D. vérzészavar nem fordul elő myoma esetén**

Helyes válasz: D

82. PCO-syndromát az alábbi tünetek jellemezik, kivéve:

- A. meddőség
- B. acne
- C. hisztizmus
- D. alhasi fájdalom**

Helyes válasz: D

83. Corpus luteum elégtelenséget az alábbiak jellemzik, kivéve:

- A. alacsony szérumszintű progeszteron
- B. az alaphőmérsékleti görbe luteális szakasza rövid
- C. magas szérumszintű HCG**
- D. az endometrium nem alakul át megfelelően szekréciossá

Helyes válasz: C

84. Melyik állítás nem igaz?

- A. a fogamzásgátló tabletták magasabb ösztrogén tartalma több mellékhatással jár
- B. a leiomyoma subserosum nem befolyásolja a terhesség lefolyását

C. PCO-syndroma kezelése során az inzulinérzékenységet csökkentő szer, a Metformin adása is szóba jön

D. PCO-syndromában a szérumban a D-vitamin szint gyakran alacsony

Helyes válasz: C

85. Melyik hüvelyi fertőzés a leggyakoribb?

A. Chlamydia

B. Candida

C. Trichomonas

D. Bacterialis vaginosis

Helyes válasz: D

86. Milyen folyás jellemzi a Trichomonas fertőzést?

A. sárgás folyás

B. zöldes-habos folyás

C. szürkés-fehér folyás

D. híg fehér folyás

Helyes válasz: B

87. Melyik állítás nem igaz?

A. bacterialis vaginosis esetén a hüvelyi pH 4,5 feletti

B. bacterialis vaginosis Clue-sejtek jelenléte jellemzi

C. bacterialis vaginosis csak szexuális életet folytató nőknél lép fel

D. bacterialis vaginosisban az aerob baktériumok elszaporodnak, ezért penicillinnel hatékonyan kezelhetjük

Helyes válasz: D

88. Melyik állítás nem jellemző a gonorrhoeás fertőzésre?

- A. szövődménye lehet a pyosalpinx
- B. mucopurulens cervicitis jellemzi
- C. ritkán tünetmentes**
- D. fájdalmas vizeletürítéssel járhat

Helyes válasz: C

89. Mi okozhat mucopurulens cervicitist?

- A. chlamydia**
- B. lues
- C. candida
- D. HPV fertőzés

Helyes válasz: A

90. Melyik állítás igaz?

- A. az ultrahangvizsgálattal a myomagöbök száma könnyebben és biztosabban határozható meg, mint MR vizsgálattal
- B. a myomagöb vérellátása csak ultrahangvizsgálattal lehetséges, MR vizsgálat erre nem alkalmas
- C. mind az ultrahangvizsgálat, mind az MR vizsgálat jó szenzitivitással rendelkezik a myomagöb felismerése során**
- D. a myomagöb fogamzásgátló tablettával is kezelhető, mert alkalmazása esetén csökken a myomagöbök mérete

Helyes válasz: C

91. Mi az endometriosis gyógyszeres kezelésének elsődleges célja?

- A. az ösztrogénhatás felfüggesztése**
- B. ovuláció elősegítése
- C. atípusos gyulladás provokálása
- D. a hypermenorrhoea kezelése

Helyes válasz: A

92. Mi jellemző endometriózisa?

- A. barna peritoneális laesiók
- B. tiszta bennékű hólyagocskák a hashártyán
- C. összenövések a hasüregben

D. valamennyi felsorolt elváltozás

Helyes válasz: D

93. Melyik állítás nem igaz?

- A. endometriózisban tenezmus is elfordulhat
- B. bélendometriosiban a széklet mindig véres**
- C. endometriosiban székrekedés is előfordulhat
- D. endometriosiban hasmenés is előfordulhat

Helyes válasz: B

94. Melyik állítás hamis orális fogamzásgátló használata esetén?

- A. a méhtestrák előfordulása nő**
- B. a petefészekrák előfordulása csökken
- C. vastagbél carcinoma előfordulása csökken
- D. a cervix carcinoma előfordulása nő

Helyes válasz: A

95. A klomifén-citrátra (Clostilbegyt) jellemző, kivéve:

- A. alkalmazása esetén az ikerterhesség kockázata nő
- B. alkalmazása esetén az ovuláció rendeződhet
- C. a hypothalamus ösztrogén receptoraihoz kötődik
- D. 10-15%-ban a petefészek hyperstimulációjára kell számítani, ezért gyakoribb az ikerterhesség**

Helyes válasz: D

96. Adenomyosisra jellemző:

- A. a méh kerekded, diffúz megnagyobbodása
- B. a szérum CA 125 szint emelkedhet
- C. myometrium vastag, inhomogén, lyukacsos kifejezett echodens területek cystikus lacunákkal
- D. valamennyi felsorolt elváltozás**

Helyes válasz: D

97. Melyik lokalizációjú myomagöb befolyásolja a megtermékenyített pete beágyazódását?

- A. leiomyoma intraligamentare
- B. leiomyoma subserosum
- C. leiomyoma submucosum**
- D. leiomyoma intramurale

Helyes válasz: C

98. Herpes genitalisra jellemző, kivéve:

- A. a bőrön kis hólyagocskák megjelenése
- B. inguinális nyirokcsomók fájdalmas duzzanata
- C. a herpes genitalis kezelésekor acyclovirt adunk
- D. mindhárom állítás igaz**

Helyes válasz: D

99. Melyik állítás hamis?

- A. a hormontartalmú IUD etinilösztadiolt tartalmaz**
- B. kismencedei gyulladás kialakulásának az esélye az IUD felhelyezése után nagyobb
- C. szoptatás alatt csak progeszteront tartalmazó készítmény szedhető
- D. hormontartalmú méhen belüli eszköz nem szült nőnél is alkalmazható

Helyes válasz: A

100. Adenomyosis esetén alkalmazható terápia a következő:

- A. myomectomy
- B. hormontartalmú IUD felhelyezése**
- C. antibiotikum terápia
- D. rendszeres ciklus felépítés

Helyes válasz: B

101. Melyik állítás helytelen?

- A. a meddőség oka lehet az adenomyosis
- B. a meddőség oka lehet a hyperprolactinaemia
- C. a gonadotropin hormon a petefészek hyperstimulációját okozhatja
- D. klomifén-citrát hatására a myomagöb megkisebbedik, ezért myoma esetén folyamatos szedése javasolt**

Helyes válasz: D

102. Melyik állítás igaz?

- A. a hormontartalmú IUD atrofizálja a méhnyálkahártyát, így a menstruáció átmenetileg megszűnhet**
- B. a csak progeszteront tartalmazó fogamzásgátló tabletta ugyanolyan jó Pearl index-szel rendelkezik, mint bármelyik kombinált fogamzásgátló tabletta
- C. sürgősségi fogamzásgátlás céljából dienogeszt tartalmú tablettát alkalmazunk
- D. fogamzásgátló tabletta szedése nem befolyásolja a vashiányos anaemia kialakulását

Helyes válasz: A

103. Milyen esetben kontraindikált a hormonpótló terápia?

- A. tartós antikoaguláns terápia
- B. dohányzás
- C. anamnézisben mélyvénás thrombosis
- D. mindhárom esetben**

Helyes válasz: D

104. PCO syndromában szenvedő beteg kezelésének legfontosabb céljait az alábbiak tartalmazzák. A felsoroltak közül egy hamis, ezt jelölje meg.

- A. az egészséget károsító következmények megelőzése
- B. az acne és a hirsutismus kezelése
- C. ovuláció és fertilitas visszaállítása
- D. az inzulinrezisztencia növelése, hogy megelőzzük a később kialakuló cukorbetegséget**

Helyes válasz: D

105. Válassza ki a helyes állítást.

- A. ovuláció után 24 órával emelkedik az alaphőmérséklet
- B. ovuláció után a Douglas-üregben folyadék jelenhet meg
- C. érett tüszőre utal ha a folliculus átmérője 16-20 mm és a szérum ösztadiol értéke 600 pg/ml feletti
- D. mindhárom állítás igaz**

Helyes válasz: D

106. Mi a menopausa meghatározása? A helyes választ jelölje meg!

- A. az az időpont, amikor a nőnek új életszakasza kezdődik, ami magas FSH, LH, és ösztrogén szérumszintekkel jár
- B. az utolsó rendes menstruáció, amit 12 hónapig nem követ újabb vérzés**
- C. az utolsó menstruáció utáni időszak
- D. mindhárom állítás igaz

Helyes válasz: B

107. Melyik állítás nem igaz?

- A. a transzdermális hormonkezelés során kevesebb ösztrogén jut a szervezetbe és kevésbé terhelődik a máj
- B. PCO syndromában drospirenon és ciproteronacetát tartalmú fogamzásgátló tablettát célszerű alkalmazni
- C. PCO syndromában ovuláció-indukcióval kezelhetjük a meddőséget, de IVF alkalmazása már kontraindikált**

D. elhízott PCO syndromás betegekben a testsúlycsökkentés segíti az ovuláció visszatérését

Helyes válasz: C

108. Melyik állítás hamis?

A. a menopausa kb. 50 éves korban jelentkezik

B. postmenopausában alkalmazott hormonkezelés mellett kétfévente ajánlott a mammographia

C. postmenopausában alkalmazott hormonkezelés egyik mellékhatása a cholecystopathia

D. postmenopausában a hormonkezelés mellékhatása lehet az emlő szöveti dezitálásának fokozódása

Helyes válasz: B

109. Milyen folyás jellemzi a Trichomonas fertőzést?

A. sárgás folyás

B. zöldes-habos folyás

C. szürkés-fehér folyás

D. híg fehér folyás

Helyes válasz: B

110. Mi okozhat mucopurulens cervicitist?

A. chlamydia

B. lues

C. candida

D. HPV fertőzés

Helyes válasz: A

111. Mi az endometriosis gyógyszeres kezelésének elsődleges célja?

- A. az ösztrogénhatás felfüggesztése**
- B. ovuláció elősegítése
- C. atípusos gyulladás provokálása
- D. a hypermenorrhoea kezelése

Helyes válasz: A

112. Adenomyosis esetén alkalmazható terápia a következő:

- A. myomectomy
- B. hormontartalmú IUD felhelyezése**
- C. antibiotikum terápia
- D. rendszeres ciklus felépítés

Helyes válasz: B

113. Melyik állítás igaz?

- A. a hormontartalmú IUD atrofizálja a méhnyálkahártyát, így a menstruáció átmenetileg megszűnhet**
- B. a csak progeszteront tartalmazó fogamzásgátló tabletta ugyanolyan jó Pearl index-szel rendelkezik, mint bármelyik kombinált fogamzásgátló tabletta
- C. sürgősségi fogamzásgátlás céljából dienogest tartalmú tablettát alkalmazunk
- D. fogamzásgátló tabletta szedése nem befolyásolja a vashiányos anaemia kialakulását

Helyes válasz: A

114. Melyik állítás igaz a klomifén-citrát hatásmechanizmusára?

- A. a hypothalamus ösztrogén receptoraihoz kötődik, blokkolja az ösztrogén – hypothalamus „feed back”-et, aminek következtében megváltozik a GnRH pulzáció és fokozódik a gonadotrop hormon termelés**
- B. direkt hat a granulosa sejtekre és így növeli az ösztrogén termelést
- C. a hypothalamus ösztrogén receptoraihoz kötődik, blokkolja az ösztrogén – hypothalamus „feed back”-et, és visszaszorítja a gonadotrop hormon elválasztást
- D. a hypothalamus ösztrogén receptoraihoz kötődik, blokkolja az ösztrogén – hypothalamus „feed back”-et, és HCG termelést vált ki ami ovulációhoz vezet

Helyes válasz: A

115. Melyik állítás nem igaz?

- A. ma már csak ritkán használunk egyfázisú fogamzásgátló tablettát, mert nem korszerű**
- B. a többfázisú fogamzásgátló tablettáknak kedvezőbb a glükóz-anyagcserére kifejtett hatása
- C. hormonális fogamzásgátlók csökkentik a petefészekrák kockázatát
- D. a fogamzásgátló hüvelygyűrű ösztrogént és progeszteront is tartalmaz

Helyes válasz: A

116. A kismedence részei a következők, kivéve az egyiket. Melyik a hamis?

- A. medencebemenet
- B. medencetágulat**
- C. medencekimenet
- D. medenceüreg

Helyes válasz: B

117. Melyik állítás igaz?

- A. valamennyi harántátmérő felezési pontját összekötő egyenes a linea terminalis
- B. a kismedence bemeneti síkja a két ülőtövist összekötő egyenes mentén helyezkedik el
- C. ha a bemenet egyenes átmérőjét képzeletben előre felé meghosszabbítjuk, ez a vonal a vízszintes síkkal 60 fokos szöget zár be. Ez a medence dőlése**
- D. a kismedence kimeneti síkja a két ízvápa belső felületének egymáshoz legközelebb eső pontjain átfektetett sík

Helyes válasz: C

118. Melyik állítás hamis?

- A. a medenceüreg határai: mellől a két szeméremcsont, a szemérem ízület belső felszíne, hátul a keresztcsonti csigolyák
- B. a medencekimenet határai: mellől a szeméremív alsó széle, hátul a farkcsont csúcsa, kétoldalt az ülőgumók
- C. a medenceszoros részei: mellől a szeméremcsontok, a symphysis felső széle, hátul az utolsó ágyékcsigolya és a keresztcsont közti porckorong, oldalt a linea terminalis**
- D. a medenceszoros részei: mellől a symphysis alsó széle, hátul a keresztcsont csúcsa, kétoldalt az ülőtövis

Helyes válasz: C

119. Melyik állítás helyes?

- A. az egyenes átmérők középpontjait összekötő vonal a medence tengelye**
- B. a medence minden részén a ferde átmérő a legnagyobb átmérő
- C. a medencebemenet legnagyobb átmérője az egyenes átmérő
- D. a bemeneti sík a symphysis alsó széle, a két ízvápa és a keresztcsont csúcsa mentén helyezkedik el

Helyes válasz: A

120. Melyik magzati koponyavarrat elnevezése hamis?

- A. homlokvarrat
- B. koszorúvarrat
- C. nyílvarrat (sutura sagittalis)
- D. deltavarrat**

Helyes válasz: D

121. Válassza ki a szülés szakaszainak helyes sorrendjét!

- A. jósló fájások - táglási szak - lépényi szak - postplacentaris szak
- B. táglási szak – lépényi szak – posplacentaris szak - kitolási szak
- C. táglási szak – kitolási szak – lépényi szak – postplacentaris szak**

D. táglási szak – kitolási szak – postplacentaris szak – utóvérzés szak

Helyes válasz: C

122. Mi a jósló fájás?

A. 5 perces rendszeres fájástevékenység a méhszáj tágulása nélkül

B. szabálytalan időközönként rövid ideig tartó méhösszehúzódnás

C. szabálytalan időközönként legalább 30-40 másodpercig tartó fájás a szülés kezdetén

D. a burokrepedés előtt kezdődő 5 perces rendszeres fástevékenység

Helyes válasz: B

123. Mi a szülés fogalma?

A. a magzat és mellékreszeinek világrajövetele a 24. betöltött terhességi hét után

B. a magzat világrajövetele a terhességi kortól függetlenül

C. a magzat és mellékreszeinek világrajövetele a 28. hét után

D. a magzat világrajövetele a magzati részek nélkül a 24. terhességi hét előtt

Helyes válasz: A

124. Mi jellemzi az utófájásokat?

A. a magzat megszületése után lép fel, hatására megszületik a lepény

B. a lepényi fájások elnevezése más néven

C. a gyermekágy első napjaiban, főleg szoptatáskor és multiparáknál a méh kontrakciója során lép fel

D. az utófájások hatására válik le a lepény

Helyes válasz: C

125. Mi a Bandl-gyűrű?

A. az uterus aktív és passzív szakaszának határán észlelhető sekély barázda

B. a méhszáj körüli ectopia

C. a köldök körülgyűrűszerű fokozott pigmentáció

D. a hüvelybemenet szerzői neve a Bandl-gyűrű

Helyes válasz: A

126. Normál fekvégű fekvésben levő magzat megszületése során melyik állítás igaz?

- A. először kigördül az arc, majd a homlok, végül a fejtető
- B. először megszületik a fejtető, majd a homlok, azután az arc**
- C. először a homlok és az arc születik meg, majd a fejtető
- D. először a fejtető születik meg, majd a medencekimenetben elfordul a fej az anya combja felé, végül világrajön a homlok és az arc

Helyes válasz: B

127. Melyik állítás nem igaz?

- A. a kitolási szakban domborodik a gát
- B. a kitolási szakban két tolófájás között a fej visszahúzódhat
- C. a kitolási szakban székelési inger jelentkezik
- D. a kitolási szakban már nem szükséges a magzati szívhangot észlelni, mert nincs jelentősége**

Helyes válasz: D

128. Melyik állítás nem igaz?

- A. a mellső nyakszirttartás elnevezése más néven positio occipitalis sacralis
- B. mellső nyakszirttartás esetén a kiskutacs a symphysis felé tekint**
- C. mellső nyakszirttartás esetén a kiskutacs a sacrum felé tekint
- D. mellső nyakszirttartás esetén a nyílvarrat a kimenet harántátmérőjében van

Helyes válasz: B

129. Melyik állítás igaz?

- A. ha a nyílvarrat a bemenet egyenes átmérőjében van eltűnt méhszáj mellett mindig császármetszést kell végezni
- B. ha a nyílvarrat a bemenet egyenes átmérőjében van és a kiskutacs a symphysis felé tekint esetleg hüvelyi úton is megszülethet a magzat**
- C. hátsó nyakszirttartás esetén nem kell mindig császármetszést végezni
- D. positio occipitalis posterior esetén a kiskutacs a symphysis felé tekint

Helyes válasz: B

130. Melyik állítás igaz?

- A. a mellső falcsonttartást Litzman-féle obliquitásnak (beilleszkedésnek) hívjuk
- B. Litzman-féle obliquitás esetén a nyílvarrat a symphysishez van közelebb**
- C. Litzman-féle obliquitás esetén a nyílvarrat a bemenet egyenes átmérőjében van, a kiskutacs a promontórium felé tekint
- D. mellső falcsonttartás (Naegle obliquitás) esetén mindig császármetszést kell végezni

Helyes válasz: B

131. Mit jelent a forgási rendellenesség?

- A. a magzat koponyája a második forgását helytelen irányban végzi, vagy nem végzi el**
- B. ha a magzati koponya úgy forog, hogy az a promontóriumon fennakad
- C. a magzati koponya szabálytalan forgása következtében a magzat harántfekvésbe kerül
- D. ha a magzati fej második forgása során a kiskutacs mellfelé forog úgy, hogy a nyílvarrat a bemenet haránt átmérőjéből, az üreg ferde átmérőjén keresztül a kimenet egyenes átmérőjébe kerül

Helyes válasz: A

132. Melyik állítás nem igaz?

- A. a fejtetőtartást elhúzóító kitolási szak jellemzi
- B. fejtetőtartás esetén a fej a magassági átmérőben nyúlik meg, kialakul a toronyfej (turriccephal)
- C. fejtetőtartás esetén vezérvonal a nyílvarrat, vezérpont a nagykutacs
- D. a fejtetőtartás a legsúlyosabb fokú deflexiós tartás**

Helyes válasz: D

133. A caput succedaneumra melyik állítás nem jellemző?

- A. bőr alatti oedema a vezérpontnak megfelelően
- B. nincs éles harára

C. a szülés után néhány nap múlva eltűnik

D. néhány órával a szülés után alakul ki

Helyes válasz: D

134. Mi a toldalékcső?

A. a medencefenék izomrétegének tetőcserépszerű eltolódása

B. szülés alatt a nyakcsatorna megnyúlása

C. az uterus passzív szakaszának megnyúlása

D. a méhtest alsó harmadának megnyúlása

Helyes válasz: A

135. Mit nevezünk Csukalov-Küstner jelnek?

A. amikor a symphysis felett a hasfalat benyomva a köldökzsinór nem húzódik vissza, mely egyben a lepény leválását jelzi

B. amikor az uterus fundusára nyomást gyakorolunk, melynek hatására a hüvelybemenet ben megjelenik a lepény

C. amikor az uterus „tarajosodik” jeleve, hogy a lepény levált

D. amikor a symphysis felett a hasat benyomva a köldökzsinór visszahúzódik, jelezve, hogy a lepény levált

Helyes válasz: A

136. Jelölje meg a szülés alatti forgások helyes sorrendjét!

A. deflexio – rotatio – flexio – a megszületett magzati fej az anya combjának mediális felszíne felé fordul

B. flexio – deflexio – rotatio - a megszületett magzati fej az anya combjának mediális felszíne felé fordul

C. flexio – rotatio – deflexio - a megszületett magzati fej az anya combjának mediális felszíne felé fordul

D. rotatio – deflexio – flexio - a megszületett magzati fej az anya combjának mediális felszíne felé fordul

Helyes válasz: C

137. Jelölje meg a vacuum extractio kontraindikációit!

- A. magzati koponya bemenetben, tűnőfélben levő méhszáj, deflexiós tartás**
- B. magzati asphyxia, fájásgyengeség
- C. magzati szív működés anomáliái
- D. magzati koponya a kimenetben, mellette renyhe fájástevékenység

Helyes válasz: A

138. Mely ultrahang jelek utalnak Rh izoimmunisatióra?

- A. a magzati szívben hyperechogen papillaris izom – oligohydramnion – IUGR
- B. IUGR – a placenta cysticus degeneratioja – az agyállományban echodens képletek
- C. a magzat Buddha-tartásban – polyhydramnion – vastag placenta – kettős kontúrú koponya**
- D. a magzati májban echodens reflexiók – oligohydramnion – hiperaktív magzat

Helyes válasz: C

139. Hogyan lehet megállapítani a magzati anaemia mértékét Rh isoimmunisatio során?

- A. az arteria cerebri media véráramlási sebességének mérésével (flometriával)**
- B. az arteria umbilicalis véráramlási sebességének mérésével (flowmetriával)
- C. az aorta descendens véráramlási sebességének mérésével (flowmetriával)
- D. az arteria uterinák pulsatis indexének mérésével (flowmetriával)

Helyes válasz: A

140. Rh isoimmunisatio kezelése során mely eljárások jönnek szóba?

- A. glükóz-infúzió, non-szteroid gyulladáscsökkentők adása az anyának
- B. a terhesség lezárása, a magzati hasüregbe vörösvértest koncentrátum adása, a köldökszinórba transfusio adása**
- C. fehérjepótlás céljából albumin és transfusio adása az anyának
- D. antibiotikum és aminosavak adása az anyának

Helyes válasz: B

141. Abruptio placentae szövődményei közül melyik nem igaz?

- A. apoplexia uteroplacentaris
- B. fetomaternalis transfusio
- C. véralvadási zavar (DIC)

D. ruptura uteri

Helyes válasz: D

142. Melyik tényező nem hajlamosít lepényleválásra?

- A. praeclampsia
- B. gestatiós diabetes**
- C. mechanikus hasi trauma
- D. rövid köldökszínór vongálódása a szülés során

Helyes válasz: B

143. Az alábbiak közül melyik tünet nem jellemző placenta praeviára?

- A. az uterus tónusa normális
- B. a vérzés mennyisége a kórkép súlyosságát jelzi
- C. a magzat gyakran haránt- vagy ferdefekvésben helyezkedik el
- D. az uterus kontraktilis**

Helyes válasz: D

144. A méhen kívüli terhesség 3 fő tünete:

- A. vérzéskimaradás, 38°C feletti hőmérséklet, alhasi görcs
- B. vérzéskimaradás, vérzéskimaradás után kávéaljszerű barnás vérzés, hasi fájdalom**
- C. hasi fájdalom, magas vérnyomás, hányinger
- D. vérvesztéses shock, súlyos lázas állapot, hasi fájdalom

Helyes válasz: B

145. Melyik állítás nem igaz?

- A. méhen kívüli terhesség differenciáldiagnosztikája során a torquált petefészekcysta, a rupturált sárgatest cysta lehetősége is fennáll
- B. normál, egészséges terhességben a szérum HCG koncentráció kétnaponta

duplázódik a terhesség első 41 napja alatt

C. méhen kívüli terhesség esetén az ultrahangvizsgálat üres uterusüreget, vagy álpetezsákot igazol, viszont vastag méhnyálkahártyát ír le

D. méhen kívüli terhesség esetén a szabad hasüregben mindig van vér

Helyes válasz: D

146. A méhen kívüli terhesség konzervatív kezelése során az alábbi gyógyszerek közül melyiket alkalmazzuk?

A. drotaverin-hidroklorid

B. methotrexat

C. valzartán

D. rozuvastatin

Helyes válasz: B

147. Mi terminustúllépés meghatározása?

A. ha a terhesség betöltötte a 41. terhességi hetet

B. ha a terhesség betöltötte a 42. terhességi hetet

C. ha a terhesség betöltötte a 40. terhességi hetet

D. ha a terhesség betöltötte a 38. terhességi hetet

Helyes válasz: C

148. Terminustúllépés esetén a betöltött 41. hét utáni méhszájérlelést milyen módon végezhetjük?

A. prosztaglandin készítménnyel, vagy Foley-katéter segítségével

B. oxytocintartalmú infúzióval

C. progeszteron készítménnyel

D. intraamniális rivanol-feltöltéssel

Helyes válasz: A

149. A 26/2014. (IV. 8.) EMMI várandósgondozásról szóló rendelete értelmében melyik terhességi héten ajánlott az NST vizsgálat elkezdése:

- A. 33
- B. 35
- C. 36
- D. 38**

Helyes válasz: D

150. Melyik a helyes?

- A. a köldökzsinórban egy véna umbilicalis és kettő artéria umbilicalis fut**
- B. a köldökzsinórban kettő véna umbilicalis és egy artéria umbilicalis fut
- C. a köldökzsinórban három artéria umbilicalis fut
- D. a köldökzsinórban kettő véna umbilicalis és kettő artéria umbilicalis fut

Helyes válasz: A

151. Az alábbi betegségek közül melyik nem vírus eredetű?

- A. Szifilisz**
- B. Herpesz genitális
- C. HIV - fertőzés
- D. Hepatitis A

Helyes válasz: A

152. Hányadik terhességi héten kell a terheléses vércukorvizsgálatot elvégezni?

- A. 18-20. hét között
- B. 21- 24. hét között
- C. 24-28. hét között**
- D. 25-29. hét között

Helyes válasz: C

153. Hogyan történik a szülés várható időpontjának kiszámítása?

- A. az utolsó menstruációhoz hozzáadunk 9 hónapot
- B. az utolsó menstruáció utolsó napjához hozzáadunk 9 hónapot és elveszünk 5 napot
- C. az utolsó menstruáció első napjához hozzáadunk 7 napot és 9 hónapot**

D. az utolsó menstruáció első napjához hozzáadunk 5 napot és elveszünk 3 hónapot

Helyes válasz: C

154. Az intézeten kívüli szülészeti ellátás igénybevételéről a várandós dönthet:

A. a várandótság 25. hetéig

B. a várandótság 36. hetéig

C. a várandótság 37. hetéig

D. a szülés megindulásáig

Helyes válasz: B

155. Menarche átlagos ideje Európában:

A. 13,5 év

B. 12,5 év

C. 11,5 év

D. 14,5 év

Helyes válasz: B

156. Telarche jelentése:

A. pubertás alatt a hónaljszőrzet megjelenése

B. pubertás alatt a szeméremszőrzet megjelenése

C. pubertás alatt az emlő növekedése

D. pubertás alatt a testmagasság növekedése

Helyes válasz: C

157. Hypermenorrhea jelentése:

A. elhúzódó vérzés

B. nagy mennyiségű vérzés

C. 21 napnál gyakoribb vérzés

D. 38 napnál ritkább vérzés

Helyes válasz: B

158. Milyen komponensekből áll össze az APGAR érték?

- A. keringés, légzés, bőrszín, izomerő, tudatállapot
- B. szívfrekvencia, légzés, izomtónus, reflexingerlékenység, bőrszín**
- C. szív működés, O₂-saturatio, izomerő, in reflexek, bőrszín
- D. szívfrekvencia, légzés, izomtónus, inreflexek, bőrszín

Helyes válasz: B

159. Raromenorrhoea jelentése:

- A. fájdalommal, görcsökkel járó vérzés
- B. nagy mennyiségű vérzés
- C. 21 napnál gyakoribb vérzés
- D. 35 napnál nagyobb időközönként jelentkező vérzés**

Helyes válasz: D

160. Pearl-index jelentése:

- A. használt módszer mellett egy éve alatt 10 nőből hány esik teherbe
- B. használt módszer mellett egy év alatt 100 nőből hány esik teherbe**
- C. használt módszer mellett két év alatt 10 nőből hány esik teherbe
- D. használt módszer mellett két év alatt 100 nőből hány esik teherbe

Helyes válasz: B

161. Melyik nem tartozik az érzelmi distressz jelei a közé a kitolási szakban?

- A. sírás vagy pánik
- B. elhúzóódó kitolási szak**
- C. a félelem kifejezése mimikával
- D. a lábak összeszorítása

Helyes válasz: B

162. Normál CTG alapfrekvenciája:

- A. 120-140/min
- B. 110-160/min

C. 120-160/min

D. 110-150/min

Helyes válasz: C

162. Menopauzában a fő hormonális változás:

A. prolactin szint emelkedik

B. progeszteron szint nő

C. ösztrogén szint csökken

D. ösztrogén szint nő

Helyes válasz: C

163. Az alábbi felsorolások közül melyik nem tartozik a menopauza tünetei közé:

A. vasomotoros tünetek

B. palpitáció

C. émelygés, hányás, étvágytalanság

D. vérzészavarok

Helyes válasz: C

164. Mi nem tartozik a szülésznő feladatai közé a szülés tágulási szakában?

A. az anya általános állapotának ellenőrzése

B. a cardinális tünetek ellenőrzése

C. a méhszáj változásainak nyomon követése

D. ultrahangvizsgálat végzése

Helyes válasz: D

165. Az alábbi mondatok közül melyik a helyes.

A. Piskacek jelnek nevezzük, ha vizsgálat során a cervix és a corpus külön mozgatható.

B. Piskacek jelnek nevezzük, ha a pete tapadásának megfelelően a méhfal különösen puha és elődomborodik.

C. Piskacek jelnek nevezzük, ha a hüvelyboltozaton keresztül ujjunk a méh kiboltosulófalába ütközik.

D. Piskacek jelnek nevezzük, ha a vizsgálat során a külső és belső kéz ujjai e területen majdnem összeérnek.

Helyes válasz: B

166. Hányadik terhességi hetek között végzik az amniocentesis vizsgálatot genetikai célból?

A. 10-15

B. 15-20

C. 20-25

D. 25-30

Helyes válasz: B

167. Az alábbiak közül melyik nem tartozik a placenta rendellenességei közé.

A. placenta praevia

B. korai lepényleválás

C. omphalokele

D. melléklepény

Helyes válasz: C

168. Az érett szülés a hetek között zajlik:

A. 36. és 42.

B. 37. és 42.

C. 37. és 40.

D. 37. és 41.

Helyes válasz: B

169. A várandósgondozás során kötelező vizsgálat (Magyarországon):

A. VDRL az első trimeszterben

B. OGTT a 12-13. héten

C. teljes vizeletvizsgálat minden megjelenéskor

D. AFP

Helyes válasz: A

170. A szülés utáni 2. napon az uterus fundusa:

- A. a köldök alatt két harántujjal tapintható**
- B. a köldök felett egy harántujjal tapintható
- C. a köldök magasságában van
- D. a symphysis magasságában tapintható

Helyes válasz: A

171. A gesztációs diabétesz szűrésének ideje:

- A. 24. és 28. hét között**
- B. 6. és 8. hét között
- C. 16. és 18. hét között
- D. 36. és 38. hét között

Helyes válasz: A

172. A várandósgondozás során kötelező vizsgálat (Magyarországon):

- A. HbsAg szűrés a 32. héten
- B. OGTT a 12. héten
- C. teljes vizeletvizsgálat+tenyésztés trimeszterenként**
- D. TORCH panel

Helyes válasz: C

173. A szülés utáni 1. napon az uterus fundusa:

- A. köldök alatt két harántujjal tapintható
- B. köldök alatt egy harántujjal tapintható**
- C. köldök magasságában van
- D. symphysis magasságában tapintható

Helyes válasz: B

174. A placenta megszületését nehezítheti:

- A. szülő nő oldalt fekvő helyzete
- B. telt húgyhólyag**
- C. az elvégzett episiotomia

D. epidurális érzéstelenítés

Helyes válasz: B

175. Az uterus fundusa (várandósnál) a köldök magasságában tapintható:

A. 12-14. héten

B. 6-8. héten

C. 22-24. héten

D. 28-30. héten

Helyes válasz: C

176. Az abruptio placentae rizikófaktorai, kivéve:

A. trauma

B. dohányzás

C. preeclampsia

D. hosszú köldökzsinór

Helyes válasz: D

177. Atoniás vérzés kezelésére adható, kivéve:

A. oxytocin

B. proszttaglandin

C. magnézium-szulfát

D. ergometrin

Helyes válasz: C

178. Hogyan különböztetjük meg a vajúdás aktív szakaszát a látens szakasztól?

A. az aktív szakasz a burokpedéskor kezdődik

B. az aktív szakaszban a cervix minimum 3-4 cm-re kitágult és a kontrakciók rendszeresek

C. az aktív szakasz a kontrakciók rendszeressé válásakor kezdődik

D. az aktív szakasz akkor kezdődik, amikor a szülőnehezen tolerálja a fájásokat

Helyes válasz: B

179. Az epidurális érzéstelenítés előnyei közé tartozik:

- A. hatékony fájdalomcsillapító eljárás**
- B. hypotenziót okoz
- C. használatával csökkenhet a szülésbefejező műtétek szükségessége
- D. alkalmazásakor a kitolási szak lerövidül

Helyes válasz: A

180. Milyen testhelyzet (szülőnőé) kerülendő a kitolási szak során?

- A. oldalt fekvő
- B. guggoló
- C. teljesen háton fekvő**
- D. ülő

Helyes válasz: C

181. A szülőnő testhelyzetének változtatása a vajúdás során:

- A. a placenta leválását okozhatja
- B. csak a szülőnő otthonában lehetséges
- C. megzavarhatja a normális méhtevékenységet
- D. hatékonyabb kontrakciókat eredményez**

Helyes válasz: D

182. Postpartum vérzésre hajlamosító tényező lehet:

- A. többes terhesség**
- B. koraszülés
- C. előzményben szereplő III. fokú gátrepedés
- D. GBS positivitás

Helyes válasz: A

183. A szülés alatti normális mennyiségű vérvesztesség:

- A. maximum 200 ml
- B. nem több mint 500 ml**
- C. nem több mint 100 ml
- D. maximum 300 ml

Helyes válasz: B

184. A secunder postpartum vérzés legvalószínűbb oka:

- A. a decidua kóros erezettsége
- B. cervicális sérülés
- C. véralvadási zavar
- D. cotyledo retentio**

Helyes válasz: D

185. A terhesség alatt jelentkező hyperventilláció az alábbi problémához vezethet:

- A. respiratórikus alkalózis**
- B. respiratórikus acidózis
- C. metabolikus alkalózis
- D. metabolikus acidózis

Helyes válasz: A

186. Az alábbi állítások közül, melyik nem igaz a 35-37. gestációs héten született újszülöttre?

- A. a koponyacsontok szélei hártyásak, a varratok nyitottak
- B. a fülporcok kemények, a fülkagylók formáltak, kialakultak**
- C. az emlőmirigy 1-4mm, az emlőbimbó lapos, de látható
- D. a kisajkak részben fedettek, a clitoris előemelkedik

Helyes válasz: B

187. Hogyan történik a köldök ellátása?

- a. 70%-os alkohollal megérintve
- b. Betadin -oldatos törléssel
- c. Octenisept-oldatos törléssel**
- d. Solutio acidi borici 2%-os

Helyes válasz: C

188. Újszülött kulcscsonttörésénél milyen melléksérülés található leggyakrabban?

- A. humerus epiphyseolysis
- B. nervus phrenicus laesio
- C. plexus brachiális laesio**
- D. musculus sternocleidomastoideus szakadása

Helyes válasz: C

189. A várandósság alatt a bőr pigmentációja fokozódik, mert:

- A. emelkedik a placentáris lactogén
- B. emelkedik a cortizol szint
- C. emelkedett a melatonin hormonszint**
- D. emelkedett ösztrogén szint

Helyes válasz: C

190. A várandós nő testtartására jellemző:

- A. lumbosacralis kifózis
- B. cervicalis lordosis
- C. lumbosacralis lordosis**
- D. dorsalis kifózis

Helyes válasz: C

191. Hol találhatók az ún. Montgomery mirigyek?

- A. uterus
- B. hüvely,
- C. emlők**
- D. ovariumok

Helyes válasz: C

192. A magzati szívhang auszkultációjának gyakorisága a látens fázisban:

- A. 10 percenként
- B. 5 percenként
- C. 60 percenként**
- D. 20 percenként

Helyes válasz: C

193. Melyik vizsgálómódszert alkalmazzuk a méhnyak vizsgálatára a várandósság alatt?

- A. Clemens teszt
- B. Lambotte teszt
- C. Bishop score**
- D. PKU teszt

Helyes válasz: C

194. Melyik időszakban ajánlott elhalasztani a várandós nő utazását?

- A. első trimeszterben
- B. utolsó trimeszter
- C. az utolsó hat hétben**
- D. csak az utolsó hat napban

Helyes válasz: C

195. Mikor alkalmazzuk a nyitott térd-könyök pozíciót azonnal?

- A. ha a kontrakciók, rövidék, gyakoriak
- B. hátfájás esetén
- C. előesett köldökzsinór esetén**
- D. becsípődött mellső méhnyak

Helyes válasz: C

196. Melyik baktérium csoport szűrővizsgálatának van jelentősége a várandósság 36. hetében?

- A. Streptococcus A csoportú
- B. Streptococcus B csoportú**
- C. Streptococcus C csoportú

D. Streptococcus D csoportú

Helyes válasz: B

197. Melyik hormon felel az anyatej termelődéséért?

A. prolactin

B. inzulin

C. tiroxin

D. tesztoszteron

Helyes válasz: A

198. Melyik tényező lehet elsődleges hatású a magzati kromoszóma rendellenességekre?

A. magzat neme

B. előrehaladott anyai életkor

C. az anya testtömege

D. lázas állapot

Helyes válasz: B

199. A Condyloma acuminatum megbetegedést okozza:

A. Citomegalovírus

B. Humán papillomavírus

C. Haemophilus ducreyi

D. Phthirus pubis

Helyes válasz: B

200. A szifilisz kórokozója:

A. Treponema pallidum

B. Neisseria gonorrhoeae

C. HIV

D. protozoon

Helyes válasz: A

201. Mastitist okozhat leggyakrabban:

- A. E.coli
- B. Staphylococcus aureus**
- C. Candida
- D. Gramm -pozitív baktériumok

Helyes válasz: B

202. A mastitis gyakrabban jelentkezik:

- A. multipara esetében
- B. primipara esetében**
- C. Császármetszés esetén
- D. műszeres befejezés esetén

Helyes válasz: B

203. Melyik Leopold-féle műfogással állapítjuk meg, hogy a magzati koponya promineál-e?

- A. Leopold I.
- B. Leopold II.
- C. Leopold III.
- D. Leopold V. (Zangemeister)**

Helyes válasz: D

204. A gyermekágyi folyás (lochia) időbeni változásaiban, melyik a helyes sorrend?

- A. rubra-cruenta-flava-fusca-serosa
- B. cruenta-rubra-flava-fusca-serosa
- C. cruenta-rubra-fusca-flava-serosa**
- D. fusca-rubra-cruenta-flava-serosa

Helyes válasz: C

205. Melyik lehet az epidurális analgédia szövődménye?

- A. hypertonia
- B. durapunctio**
- C. bőrkiütés

D. insomnia

Helyes válasz: B

206. A vajúdas-szülés folyamatának dokumentálása történhet:

A. lázlapon

B. műtési- altatási jegyzőkönyvben

C. postoperatív észlelőlapon

D. partogram alkalmazásával

Helyes válasz: D

207. A DIC jellemzője:

A. alvadási faktorok hiánya

B. biotin-hiány

C. kolinszteráz hiánya

D. P-vitamin hiánya

Helyes válasz: A

208. A DIC okai:

A. Down-kór

B. HELLP-szindróma

C. biotinidáz-hiány

D. Mg- hiány

Helyes válasz: B

209. A kóros CTG jellemzői szülés alatt:

A. szívfrekvencia 120-160/min között

B. szívfrekvencia variabilitás beszűkült

C. nincs deceleráció

D. acceleráció megfigyelhető a kontrakciók hatására

Helyes válasz: B

210. A Küstner jel arra utal, hogy:

- A. levált a lepény, ha a hasfalat a symphysis felett benyomjuk**
és a köldökzsinór nem húzódik vissza
- B. a köldökzsinór visszahúzódik
- C. a méh tarajosodik
- D. cotyledo visszamaradása áll fenn

Helyes válasz: A

211. A lochia jellemző színe a gyermekágy első hetének végén:

- A. véres
- B. barnásvörös
- C. véres-savós**
- D. sárgásbarna

Helyes válasz: C

212. A magas egyenes beilleszkedésre jellemző:

- A. positio occipitalis anterior seu publica**
- B. Negele-féle obliquitas
- C. Litzmann-féle obliquitas
- D. glabella

Helyes válasz: A

213. A magzatvíz normális mennyisége terminusban:

- A. 500-1000ml**
- B. 200-500ml
- C. 80ml
- D. 5000ml

Helyes válasz: A

214. A nemi érés során melyik baktérium válik uralkodóvá a hüvelyben?

A. MRSA

B. Lactobacilus

C. Chlamydia

D. CMV

Helyes válasz: B

215. A szülés harmadik szakasza azzal kezdődik, hogy:

A. a nyakcsatorna teljesen kifejtődik

B. megszületik a magzat feje

C. megszületik a lepény

D. egészében megszületik a magzat

Helyes válasz: D

216. A túlhordott magzatra jellemző:

A. 38.hét -re született

B. 39.hétre született

C. 40.hétre született

D. 42.hétre született

Helyes válasz: D

217. A vírusok csoportjába tartozik:

A. Candidiasis kórokozója

B. herpes genitalis kórokozója

C. a gonorrhoea kórokozója

D. a trichomoniasis kórokozója

Helyes válasz: B

218. Arctartásnál vezérpont:

A. nagykutacs

B. kiskutacs

C. állcsúcs

D. homlokvarrat

Helyes válasz: C

219. Az alábbiak közül melyik a nem önálló ápolási funkció?

A. Az ápolási dokumentáció vezetése.

B. A beteg meghallgatása.

C. A hozzátartozók megnyugtatója.

D. A gyógyszerek pontos beadása.

Helyes válasz: D

220. Az altatott nőbetegnél mi lehet a cyanosis oka?

A. nyelv hátracsúszása

B. placenta accreta

C. tachycardia

D. immobilitas

Helyes válasz: A

221. Az $\text{CO}_2 + \text{O}_2$ transzfer módja a magzati és anyai szervezet között:

A. egyszerű diffúzió

B. fagocitózis

C. szelektív felszívódás

D. szelektív transzfer

Helyes válasz: A

222. Az endometriosis externára jellemző:

A. amenorrhoea és insomnia

B. petechiák

C. meddőség

D. korai osteoporosis

Helyes válasz: C

223. Az osteoporosis diagnosztikájában fontos:

- A. RDV
- B. ODM**
- C. FOBT
- D. Pap-kenet

Helyes válasz: B

224. Az osteoporosis melyikkel tényezővel jellemezhető leginkább?

- A. ösztrogénhiány
- B. a csonttömeg és a csontsűrűség csökkenése**
- C. hipogonadizmus
- D. sovány testalkat

Helyes válasz: B

225. Fejtetőtartás esetén a megtámaszkodás:

- A. orrgyök feletti homlokrészen**
- B. áll alatt
- C. felső állcsont
- D. homlok és a hajás fejbőr határa

Helyes válasz: A

226. Fejtetőtartásnál vezérpont:

- A. kiskutacs
- B. nagykutacs**
- C. homlokdudor
- D. állcsúcs

Helyes válasz: B

227. Hátsó koponyforgásnál vezérpont:

- A. a kiskutacs**
- B. nagykutacs
- C. homlokvarrat
- D. állcsúcs

Helyes válasz: A

228. Hogyan diagnosztizálható a gyermekági Mastitis?

- A. MRI
- B. a lefejt tej mikrobiológiai vizsgálatával**
- C. ultrahangvizsgálattal
- D. a kórelőzmény alapján

Helyes válasz: B

229. Homloktartásnál vezérpont:

- A. nagykutacs
- B. kiskutacs
- C. homlokvarrat vagy a homlokdudor**
- D. állcsúcs

Helyes válasz: C

230. Hysterectomia után:

- A. megszűnik a menstruáció és csökken a petefészek hormontermelése
- B. azonnali menopauza
- C. folytatódik az oszcilláció a petefészek és a hipofízis hormonjai között**
- D. a petefészek hormontermelés megszűnik, de a hipofízis tovább termeli hormonjait

Helyes válasz: C

231. Idő előtti burokrepedés fogalma:

- A. a burok a méhszáj eltűnése után reped meg
- B. a burok a fájások megindulása előtt reped meg**
- C. a burok a fájások megindulása után, de a méhszáj eltűnése előtt reped meg
- D. a burok a koponya medencebemenetre illeszkedése után reped meg

Helyes válasz: B

232. Intrauterin fogamzásgátló eszköz hatásmechanizmusa:

- A. csökkenti a tubamotilitást
- B. akadályozza a megtermékenyített pete beágyazódását**
- C. fokozott kontrakció következtében a beágyazódott pete kilökődését
- D. csökkenti a spermiumok penetrációját a cervixnyákban

Helyes válasz: B

233. Ki rendelhet fájdalomcsillapítót?

- A. az orvos**
- B. a szakápoló
- C. bárki, akinek engedélye van
- D. a beteg magának

Helyes válasz: A

234. Kiknek tanácsoljuk havonta rendszeresen elvégezni az emlő önvizsgálatát?

- A. szült nőknek
- B. minden 17 éven felüli nőknek
- C. 30 év feletti nőknek**
- D. nőgyógyászati megbetegedésben szenvedő nőknek

Helyes válasz: C

235. Koraterhességben azonnali teendőt igényel:

- A. hüvelyi vérzés**
- B. emlő feszülése
- C. hányinger, fáradtság
- D. az előző válaszok mindegyike

Helyes válasz: A

236. Méhkontrakciók alatt a méh vérellátása:

- A. csökken**
- B. növekszik
- C. nem változik
- D. átmenetileg szünetel

Helyes válasz: A

237. Mekkora az Oxytocin felezési ideje?

- A. 5 -10 perc**
- B. 40 perc
- C. néhány másodperc
- D. 10 óra

Helyes válasz: A

238. Melyek a rugalmas pólya felhelyezésének szabályai?

- A. az alsó végtagot teljes egészében be kell fednie**
- B. mindig lefekvéskor kell felhelyezni
- C. mindig felkelés előtt kell eltávolítani
- D. legyen feszes

Helyes válasz: A

239. Melyek a szülésznő feladatai az atoniás vérzés észlelése esetén?

- A. az orvos azonnali értesítése**
- B. infúzió bekötése
- C. uterotonikum beadása
- D. az anyának nyugtató adása

Helyes válasz: A

240. Melyek a terhesség biztos jelei?

- A. pozitív terhességi vizelet
- B. magzati szívhang észlelése a terhesség 30. hetétől
- C. a vulva livid elszíneződése
- D. ultrahang vizsgálattal az embryo szív működésének**

Helyes válasz: D

241. Melyik a hyperemesis gravidarum legjelentősebb anyai szövődménye?

- A. gyakoribb vetélés
- B. kis születési súly
- C. nagyobb a szívfejlődési rendellenességek aránya
- D. exsiccosis**

Helyes válasz: D

242. Melyik nem tartozik a terhességhez kapcsolódó anyai halálozás három leggyakoribb oka közé?

- A. vérzés
- B. embolia
- C. praeeclampsia
- D. cardiomyopathia**

Helyes válasz: D

243. Melyik szer a legkevésbé hatékony a csontállomány elvesztésének megakadályozására?

- A. biszfoszfonát
- B. ösztrogén
- C. raloxifen
- D. gesztagén**

Helyes válasz: D

244. Melyik tekinthető a HELLP szindrómával kapcsolatos anyai halálozás egyik fő okának?

- A. szívritmuszavar
- B. alvadási zavar**
- C. tüdő embólia
- D. veseelégtelenség

Helyes válasz: B

245. Mi a súlyos preeclampsia definitív kezelése?

- A. erélyes vérnyomáscsökkentő kezelés
- B. vízhajtó kezelés
- C. intravénás fehérjepótlás
- D. a magzat és a lepény világra hozatala**

Helyes válasz: D

246. Melyik tünet jellemző a kóros terhességi hányásra?

- A. fejfájás
- B. láz
- C. erős hasi fájdalom
- D. általában a 9. terhességi hét előtt jelentkezik**

Helyes válasz: D

247. Mennyi legyen a szoptatások időtartama?

- A. 10 perc
- B. 20 perc
- C. az anya igénye szerint
- D. az újszülött igénye szerint**

Helyes válasz: D

248. Mi jellemzi a kontrakciókat az aktív vajúdás alatt?

- A. 4 percenként jelentkeznek**
- B. 2 percenként jelentkeznek, amplitúdójuk elérheti a 80Hgmm-t
- C. átlagosan 25-30 Hgmm intenzitású kontrakciók
- D. óránként 2-3-szor jelentkező, 10Hgmm

Helyes válasz: A

249. Mi tartozik a gerincközei érzéstelenítés ellenjavallatai közé?

- A. véralvadási zavar
- B. koponyaűri nyomásfokozódás
- C. haemodinamikai instabilitás

D. az előző válaszok mindegyike

Helyes válasz: D

250. Mikor beszélünk infertilitásról?

A. kétévi házasság után, annak ellenére, hogy nem védekeznek, nem esik teherbe

B. teherbe esik, de nem tudja kiviselni

C. nincs orgazmus a házasság során

D. egyévi házasság után, annak ellenére, hogy nem védekeztek, nem esik teherbe

Helyes válasz: B

251. Mikor kell az anyának anti-D Ig-t adni?

A. minden Rh-negatív vércsoportú szülőnek

B. ha az újszülöttnél az Rh károsodás jelei kimutathatók

C. ha az anyánál magas volt az ellenanyag titer

D. ha az újszülött Rh pozitív és az anya Rh –negatív

Helyes válasz: D

252. Mikor szennyeződnek a legkönnyebben az elsődleges varrattal zárt sebek?

A. első 24 órában

B. 72.óra után

C. 24-72 óra között

D. az első három napon bármikor

Helyes válasz: A

253. Milyen veszélyek fenyegetik a gestációs diabestesben szenvedő várandóst?

A. a szénhidrát anyagcsere felborul

B. a víz és elektrolit háztartás egyensúlya felborul

C. gyakori a preeclampsia, húgyúti fertőzés, colpitis

D. valamennyi felsorolt szövődmény

Helyes válasz: D

254. Milyen eszközt használunk hüvelyfeltárásnál?

- A. amnioscóp
- B. kolposzkóp
- C. spatula
- D. cusco-féle eszköz**

Helyes válasz: D

255. Milyen fő tünetek jellemzőek a postmenopausa időszakára?

- A. klimaktérium szindróma
- B. a nemi szervek atrofiás elváltozásai
- C. pszichés zavarok
- D. anovulációs ciklusok**

Helyes válasz: D

256. Milyen gyógyszer adható orvosi utasításra a műtéti fájdalom csillapítására?

- A. Marcain 0,5%
- B. Ergam injekció
- C. Nubain injekció**
- D. Mandokef injekció

Helyes válasz: C

257. Milyen hatása van a szülés után végzett gáttornának?

- A. javul a gáttájék vérellátása**
- B. lassul a gátmetszés gyógyulása
- C. gyengül a hólyagzáró izomzat
- D. a veseműködés csökken

Helyes válasz: A

258. Milyen hátránya lehet a mammográfiának?

- A. diszkomfort érzés**
- B. fokozza az emlőrák halálozást
- C. a korai felismerés korai halálhoz vezet

D. nagy sugárexpozíciót okoz

Helyes válasz: A

259. Milyen kórokozó okozza a condyloma acuminatum betegséget?

A. baktérium

B. vírus

C. gomba

D. trichomonas vaginalis

Helyes válasz: B

260. Milyen testhelyzetbe kell helyezni a dyspnoés beteget?

A. félig ülő helyzetbe

B. oldalfekvésbe

C. emelt lejtőztetéssel

D. nyújtott hátfekvésbe

Helyes válasz: A

261. Mire kell gondolni, ha a haskörfogat az átlagosnál nagyobb?

A. ikerterhességre

B. polyhidramnion

C. nagy magzat

D. a felsoroltak mindegyike

Helyes válasz: D

262. Missed abortion fogalma:

A. egymás után két vagy több terhesség megszakad

B. a terhességet legális úton szakítják meg

C. a terhességet illegális úton szakítják meg

D. amikor a terhesség elhal, de az embrió nem távozik a méhürből

Helyes válasz: D

263. Mit értünk I.fokú gátrepedésen?

- A. **A hátsó commisurára terjed, enyhe formája a fékrepedés**
- B. A ruptura ráterjed a gátra és izomzatára, de a végbél külső záróizma ép marad
- C. A gátizomzat repedésén kívül sérül a m. sphincter ani externus
- D. A repedés a végbélre is ráterjed

Helyes válasz: A

264. Mit jelent a seb szennyeződésének mértéke?

- A. sebben található baktériumok száma
- B. a sebbe került testváladék
- C. **a sebben képződő necrotikus szövetek mennyisége**
- D. a seb testfelszíntől, vagy testüregtől való távolsága

Helyes válasz: C

265. Mit jelent az STD rövidítés?

- A. A nemi betegségek összessége
- B. baktériumok okozta nőgyógyászati gyulladások
- C. mindenféle nőgyógyászati gyulladás
- D. **szexuális úton létrejött nemi szervi gyulladás**

Helyes válasz: D

266. Mit kell mérni vizelethajtás során?

- A. a bevitt folyadék mennyiségét
- B. a bevitt ürített folyadék mennyiségét
- C. **a bevitt és ürített folyadék mennyiségét és a testsúlyt**
- D. a testsúlyt

Helyes válasz: C

267. Fiatal korban jelentkező cikluszavarok esetén mely endokrin szervek hormontermelését vizsgáljuk?

- A. pajzsmirigy
- B. mellékvesekéreg
- C. petefészek
- D. mind**

Helyes válasz: D

268. Anorexia nervosara nem jellemző:

- A. funkcionális hypothalamicus krónikus anovulatio
- B. oligo, illetve amenorrhoea
- C. endometrium hyperplasia**
- D. osteoporosis

Helyes válasz: C

269. A polycystas ovarium syndromara jellemző tünetei:

- A. oligo-amenorrhoea
- B. hirsutismus
- C. UH-vizsgálattal az ovariumok cortexében 2-9 mm-es átmérőjű cystak
- D. mind**

Helyes válasz: D

270. Nem tartozik az endometriosis tünetei közé:

- A. oligomenorrhoea**
- B. dyspareunia
- C. meddőség
- D. kórinikus kismencedei fájdalom

Helyes válasz: A

271. Mi képezi a rutin nőgyógyászati rákszűrés részét?

- A. HPV tipizálás
- B. a méhnyak colposcopos vizsgálata, valamint onkocytologiai mintavétel**
- C. a méhnyak colposcopos vizsgálata
- D. onkocytologiai mintavétel

Helyes válasz: B

272. Colposcopos vizsgálat során milyen eljárással ítéltető meg a hám épsége?

- A. metilénkék teszt
- B. ecetsav próba, Schiller próba**
- C. Nílus-szulfát festés
- D. indikókármín festés

Helyes válasz: B

273. Az onkocytologiai kenet értékelésére az alábbi klasszifikáció alkalmazása ajánlott:

- A. Papanicolau-rendszer
- B. Bethesda-rendszer**
- C. FIGO-rendszer
- D. Clarck-rendszer

Helyes válasz: B

274. HPV 16 fertőzés mellett cytologiai vizsgálat során HSIL leletet kap. Mi a teendő?

- A. conisatio és fractionált abrasio**
- B. laseres vaporisatio
- C. cryocoagulatio
- D. aspiratio cytologia

Helyes válasz: A

275. Leiomyoma tünete lehet:

- A. dysmenorrhoea
- B. metrorrhagia
- C. dyspareunia
- D. mind**

Helyes válasz: D

276. Endometrium carcinoma tünete lehet:

- A. hematometra
- B. pyometra
- C. bűzös, húslészerű folyás
- D. mind**

Helyes válasz: D

277. Milyen módon alkalmazzuk a perioperatív anticoaguláns profilaxis részeként javasolt alacsony molekulású heparin készítményeket?

- A. intravénásan
- B. subcutan**
- C. per os
- D. intramuscularisan

Helyes válasz: B

278. Polycystas ovarium szindróma minden képviselőjére jellemző:

- A. a petefészkek tokja alatt számos 2-8 mm nagyságú cysticus képlet látható ultrahangvizsgálattal.
- B. a szérum emelkedett androgén szintje és/vagy a hyperandrogén tünet.**
- C. az inzulinrezisztencia és következményes hyperinsulinaemia
- D. a túlsúlyosság és elhízás

Helyes válasz: B

279. Anorexia nervosa esetén a következő képlet funkcionális károsodása állapítható meg:

- A. hypothalamus**
- B. hypophysis
- C. ovarium
- D. pajzsmirigy

Helyes válasz: A

280. A méhnyak rosszindulatú daganatára jellemző:

- A. gyorsan ad haematogén áttétet a májba
- B. II/b stádium esetén a hüvelyfal felső 2/3-ra terjed a daganat
- C. szövettani típusa 90%-ban adenocarcinoma

D. II. stádium esetén az 5 éves túlélés 60%.

Helyes válasz: D

281. A méhtest jóindulatú daganatára, a leiomyomára jellemző:

- A. polyclonális, több sejtből származó göb.
- B. menopausát követő 10 év során jelentős növekedést mutat.
- C. rosszindulatú, ún. leiomyomasarcoma is kialakulhat belőle.**
- D. a nők második leggyakoribb jóindulatú daganata.

Helyes válasz: C

282. Az endometrium hyperplasiájára jellemző:

- A. ösztrogén termelő Granulosa-sejtes tumor is előidézhetsi**
- B. ritkán rendellenes vérzés hívja fel rá a figyelmet
- C. évekig tartó gesztagén kezelés csak komplex atypiát igazoló szövettani eredménynél javasolt
- D. leggyakoribb az előfordulása menarche idején

Helyes válasz: A

283. Ovarialis intersexualitás jellemzője:

- A. szabályos ovarium szövet mutatható ki és a herék gyakran az inguinalis csatornában helyezkednek el
- B. a beteg karyotypusa 46,XY, ezért a Wolff-cső származékai minden esetben kimutathatóak
- C. terhes állapotban gyakran a magzati mellékvese rendellenes szteroidszintézise okoz veleszületett női álkevert-neműséget**
- D. hereszövet jelenléte felelős a férfias külső nemi szervek kialakulásáért

Helyes válasz: C

284. Műtét után az altatott beteg mikor fogyaszthat folyadékot?

- A. műtét után 3-4 órával
- B. az ébredés után 3-4 órával
- C. 2 óra múlva**
- D. 6 óra múlva

Helyes válasz: C

285. Nőgyógyászati műtét esetén melyek a szülésznő feladatai?

- A. felkészíti a beteget a narkózis várható szövődményeire
- B. felkészíti a műtét utáni fájdalomra
- C. előkészíti a betegágyat és a műszereket, a vitális paramétereket ellenőrzi és rögzíti**
- D. tájékoztatja a hozzátartozókat

Helyes válasz: C

286. Preeclampsias anyának milyen diétát kell biztosítani?

- A. könnyű - vegyes, de fehérje dús**
- B. szénhidrát-szegény
- C. nagy szénhidrát és fehérjetartalmú, zsír és sószegény
- D. szénhidrát és fehérjeszegény

Helyes válasz: A

287. Spontán szülés után meddig tiltott a szexuális érintkezés?

- A. amíg a gátseb be nem gyógyul és a méh involúciója be nem fejeződik
- B. 4 hétig
- C. 5 hétig
- D. 6 hétig**

Helyes válasz: D

288. Veseköves várandós nőnél, melyik betegségnek nagyobb az előfordulása?

- A. preeclampsia
- B. húgyúti fertőzés**
- C. spontán abortus
- D. veleszületett rendellenesség

Helyes válasz: B

289. A koraszülöttek egyik jellemző sajátossága:

- A. koraszülötteknél stabil a hőszabályozás
- B. a lányoknál a nagyajkak fedik a kisajkakat
- C. a bőr alatti zsírpárna fejlett
- D. a koraszülöttek között gyakoribbak a légzési zavarok**

Helyes válasz: D

290. Mi a foetalis típusú keringés átrendeződésének legfontosabb oka?

- A. a foramen ovale záródása
- B. első légyétel**
- C. a ductus Botalli záródása
- D. a ductus Arantii záródása

Helyes válasz: B

291. A bacterialis vaginosisra nem jellemző:

- A. dysuria**
- B. a hüvelyi pH 4,5 feletti
- C. kellemetlen, halszagú váladék
- D. homogén, szürkésfehér váladék

Helyes válasz: A

292. A Bartholin mirigy tályog kezelésének helyes módszere:

- A. oncotomia
- B. parenteralis antibiotikum kezelés
- C. marsupialisatio**
- D. párakötés

Helyes válasz: C

293. A homológ intrauterin inseminatio lényege:

- A. ovulatio indukciós kezelés után a 4-8 sejtes praeembryót az uterus üregébe juttatjuk
- B. ovulatio indukciós kezelés után az előzetesen lefagyasztott, majd felolvasztott 4-8 sejtes praeembryót az uterus üregébe juttatjuk
- C. ovulatio indukciós kezelés után a pár férfi tagjának mosott és megfelelően előkészített spermiumait műanyag katéterrel az uterus üregébe juttatjuk**
- D. ovulatio indukciós kezelés után a mosott és megfelelően előkészített donor spermiumokat műanyag katéterrel az uterus üregébe juttatjuk

Helyes válasz: C

294. A meddőség kivizsgálásának részét képezi:

- A. az ovuláció vizsgálata, hormonprofil
- B. a tubák átjárhatóságának vizsgálata
- C. a pár férfi tagjának andrológiai vizsgálata
- D. mind**

Helyes válasz: D

295. A méhnyak sejtjeit az alábbi kórokozó fertőzheti meg:

- A. Neisseria gonorrhoea, Chlamydia trachomatis
- B. HPV
- C. HSV
- D. mind**

Helyes válasz: D

296. A polycystas ovarium syndromára jellemző tünetei:

- A. oligo-amenorrhoea
- B. hirsutismus
- C. UH-vizsgálattal az ovariumok cortexében 2-9mm-es átmérőjű cysták
- D. mind**

Helyes válasz: D

297. A postoperatív betegápolás része:

- A. a hasi státusz, drainek, Foley katéter vezetésének ellenőrzése
- B. vérnyomás, pulzus, hőmérséklet, légzés ellenőrzése
- C. szükség esetén anticoagulans és antibioticum profilaxis alkalmazása
- D. mind**

Helyes válasz: D

298. Acut hasat okozó torquált ovariumcysta esetén mi a teendő?

- A. a beteget intenzív osztályon ápoljuk, széles spektrumú antibiotikumot adnak
- B. szoros observatio mellett várakozó álláspont, 2 naponta UH kontroll a torquatio spontán oldódásának ellenőrzésére
- C. a beteget azonnal a műtőbe szállítják percutan punctioval leszívják a cystát
- D. a beteget azonnal a műtőbe szállítjuk és laproscopiat vagy laparotomiát végzünk a torquatio megszüntetésére, vagy a torquatio hatására necrotisált szöveteket eltávolítjuk**

Helyes válasz: D

299. Acut salpingitis klinikai tünete lehet:

- A. bő, túrós jellegű folyás
- B. habos, zöldessárga folyás
- C. erős alhasi fájdalom, az adnexum nyomásérzékenysége**
- D. kellemetlen, jellegzetesen halszagú váladék

Helyes válasz: C

300. Az alábbi HPV-típusok közül válassza ki, amelyik nem tartozik a magas rizikójú csoportba!

- A. 16-os
- B. 45-ös
- C. 33-as
- D. 11-es**

Helyes válasz: D

301. Az alábbiak közül melyik lehet a Wertheim műtét szövődménye?

A. kismedencei lymphocysta

B. húgyhólyag dysfunctio

C. ureter-szűkület

D. mind

Helyes válasz: D

302. Az endometriosis kezelésében alkalmazott GnRH analóg agonistákat milyen módon alkalmazzuk?

A. naponta subcutan injekciók formájában

B. havonta intramuscularis injekciók formájában

C. naponta per os

D. intravénásan

Helyes válasz: B

303. Epithelialis petefészek első vonalbeli kemoterápiás kezelés?

A. Metotrexát-5FU

B. Taxán-platina

C. Doxorubicin-cyclophosphamid

D. Caelyx

Helyes válasz: B

304. Fiatal korban jelentkező cikluszavarok esetén mely endokrin szervek hormontermelését vizsgáljuk?

A. pajzsmirigy

B. mellékvesekéreg

C. petefészek

D. mind

Helyes válasz: D

305. Fogamzásgátló szedése mellett jelentkező alsó végtagi duzzanat, illetve nehézlégzés mellett mire gondol?

- A. alsó végtagi lymphoedema
- B. mélyvénás thrombosis, tüdőembolia**
- C. pneumonia
- D. felületes thrombophlebitis

Helyes válasz: B

306. Hogyan ítéltethető meg a tubák átjárhatósága?

- A. laparoscopos úton chromopertubatio segítségével
- B. hysterosalpingographia segítségével
- C. hystero-salpingo-sonographia segítségével
- D. mind**

Helyes válasz: D

307. Hysterosalpingographias vizsgálat szövődménye lehet:

- A. acut kismencedei gyulladás**
- B. anovulatoricus ciklus
- C. asherman syndroma
- D. az adnexum torsioja

Helyes válasz: A

308. Mellső falı hüvelyplasztikát követően mely eljárás helyes?

- A. a hólyagkatétert egy hét múlva távolítjuk el
- B. a hólyagkatétert egy hét múlva, hólyagtornát követően távolítjuk el
- C. a hólyagkatétert a műtétet követő 24 óra múlva távolítjuk el**
- D. a hólyagkatétert 3-4 nap múlva, hólyagtornát követően távolítjuk el

Helyes válasz: C

309. Mely nőgyógyászati műtétet esetén indokolt minden esetben a perioperatív antibiotikum profilaxis?

- A. **vaginalis hysterectomy**
- B. frakcionált abrasio
- C. diagnosztikus laparoscopia
- D. funkcionális ovarium cysta eltávolítása laparoscoppal

Helyes válasz: A

310. Mélyen infiltráló endometriosis esetén a beteg műtéti előkészítésének részét képezi:

- A. astrup vizsgálat
- B. **bélelőkészítés**
- C. anyai echocardiográfia
- D. emelet dózisú anticoagulans profilaxis

Helyes válasz: B

311. Mi a TVT műtét lényege?

- A. szintetikus szalaggal megemeljük a hólyag fundusát
- B. **szintetikus szalaggal feszülésmentesen alápárnázzuk az urethrát**
- C. transvaginalisan az urethran szöglettörést ejtünk
- D. a cystocelet dohányszacskó öltéssel elbuktatjuk

Helyes válasz: B

312. Mi tartozik az akut has tünetei közé?

- A. kiterjedt vagy körülírt izomvédekezés
- B. diffúz vagy körülírt hasi nyomásérzékenység
- C. hányinger, hányás, csuklás
- D. **mind**

Helyes válasz: D

313. Milyen laboratóriumi vizsgálattal követhető nyomon a kezelt epithelialis petefészek tumor?

A. CA-125

B. AFP

C. hCG

D. CEA

Helyes válasz: A

314. Milyen vizsgálattal igazolható az anovulatoricus ciklus?

A. a ciklus második felében mért szérumszint segítségével

B. a ciklus első felében mért szérumszint segítségével

C. a vizelet LH szint meghatározással

D. vizelet FSH szint meghatározással

Helyes válasz: A

315. Milyen egyéb nőgyógyászati kórkép társul gyakran haematometrához?

A. policisztás ovarium

B. hirsutismus

C. endometriosis

D. adnextorsio

Helyes válasz: C

316. Rizikófaktorok méhnyakrák esetén:

A. dohányzás

B. HPV fertőzés

C. multiparitas

D. mind

Helyes válasz: D

317. Melyik nem jellemző Turner –szindrómára?

A. pigmentált naevusok

B. hypoplasia körmök

C. gyakorisága az anyai életkorral nő az újszülöttek között

D. mind

Helyes válasz: C

318. A hysteroscopia alkalmas a rendellenes méhvérzés okának tisztázására az alábbi esetekben:

A. gócos endometrium laesio

B. uterusfejlődési rendellenesség

C. polypus endometrium

D. mind

Helyes válasz: D

319. Mikor a legalacsonyabb a Lactobacillus-kolonizáció a hüvelyben?

A. újszülöttkor

B. terhességben

C. nem terhes állapotban a menarche és a menopausa közötti időben

D. postmenopausában

Helyes válasz: D

320. Serdülőkorú, még szexuális kapcsolatot nem folytató lányok hüvelyfertőzésének okai, kivéve:

A. idegentest

B. a torok és garatflóra baktériumai

C. chlamydia trachomatis

D. egyik sem

Helyes válasz: C

321. A vulva szemölcsfertőzésére nem alkalmas kezelés:

A. podophyllin ecsetelés

B. cryoterápia

C. CO2 lézer

D. vagothyl ecsetelés

Helyes válasz: D

322. A petefészekrák leggyakoribb tünete:

- A. pecsételő vérzés
- B. testsúlycsökkenés
- C. hasi puffadás és fájdalom**
- D. székrekedés és gyakori vizeletürítési inger

Helyes válasz: C

323. Hatékonyan szűrhető nőgyógyászati daganat:

- A. méhtrák
- B. méhnyakrák**
- C. petefészekrák
- D. hüvelyrák

Helyes válasz: B

324. Válassza ki a helyes állítást!

- A. a propiltiuracil második vonalban alkalmazott szer hypothyreosisban
- B. a methimasol átjut a placentán, de a propiltiuracil nem jut át a placentán
- C. a propiltiuracil és a methimasol az újszülöttnél hypothyreosist okozhat**
- D. a methimasol első vonalban alkalmazott szer hypothyreosisban

Helyes válasz: C

325. Melyik állítás hamis?

- A. a metildopával viszonylag sok tapasztalat áll rendelkezésre
- B. a metildopa az I. trimeszterben alkalmazható
- C. a metildopa nem befolyásolja az uteroplacentaris vérkeringést
- D. a metildopa a szimpatikus tónust növeli**

Helyes válasz: D

326. Melyik szer nem kalcium-antagonista?

- A. verapamil
- B. nifedipin
- C. hidralazin**
- D. amlodipin

Helyes válasz: C

327. Melyik vérnyomáscsökkentő szer ellenjavallt terhességben?

- A. urapidil
- B. metoprolol
- C. ACE inhibitor**
- D. labetalol

Helyes válasz: C

328. Melyik állítás nem igaz?

- A. a magnézium intoxicação veszélyére hívja fel a figyelmet a patella-reflex kiesése
- B. az egyik korszerű tokolitikum az oxitocin-receptor antagonistája
- C. a prosztaglandin-szintézisgátlók a Botallo-vezeték elzáródását okozhatják
- D. a nifedipin jelentősen rontja az uteroplacentaris vérkeringést**

Helyes válasz: D

329. Az alábbi állítások közül jelölje meg a hamisat!

- A. az FDA „D” csoportba sorolt gyógyszerekre jellemző, hogy a humán vizsgálatok egyértelműen magzati kockázatot igazoltak, de a gyógyszer alkalmazásából származható előny, bizonyos esetekben indokolhatja a használatát
- B. az erősen teratogén kockázatú gyógyszerek kockázata meghaladja a 20%-ot
- C. Chlamydia fertőzés esetén penicillint kell adni**
- D. a nifedipin a terhesség alatt hipertóniák minden formájában adhatók

Helyes válasz: C

330. Melyik bétablokkoló okozhat magzati növekedési retardációt?

- A. oxprenolol
- B. metoprolol
- C. atenolol**
- D. pindolol

Helyes válasz: C

331. Válassza ki a hamis állítást!

- A. az FDA „X csoportjába tartozó gyógyszerek egyértelműen fejlődési rendellenességet okoznak
- B. a metildopa bázis gyógyszer a terhesség alatti krónikus hipertónia kezelésében
- C. a hidralazin kedvezően befolyásolja az uteroplacentalis vérkeringést**
- D. a folsav csökkenti a velőcsőzáródási rendellenességek kockázatát

Helyes válasz: C

332. Válassza ki azokat a gyógyszereket melyek akut hipertónia kezelésére alkalmasak terhességben!

- A. metildopa, metoprolol, prazosin
- B. ketanserin, metildopa, atenolol
- C. nifedipin, urapidil, labetalol**
- D. bármely diuretikum, pindolol, oxprenolol

Helyes válasz: C

333. Per os adott nifedipin esetében a vérnyomás csökkenésének a kezdete hány perc múlva várható?

- A. 60 perc múlva
- B. 10-15 perc múlva**
- C. 120 perc múlva
- D. 2 perc múlva

Helyes válasz: B

334. Magnézium-intoxicatio esetén milyen gyógyszert adandó?

- A. benzodiazepin
- B. kalcium-glukonát**
- C. szteroid
- D. diuretikum

Helyes válasz: B

335. Melyik állítás nem igaz a szteroid-profilaxisra?

- A. a surfactant képzést fokozza
- B. diabetesben tilos adni**
- C. kedvezőbb a postpartum adott surfactant hatása
- D. 48 óra múlva fejti ki a maximális hatását

Helyes válasz: B

336. A bethametason dózis szteroid-profilaxis során:

- A. 4x6 mg im 24 óra alatt
- B. 1x12 mg im
- C. 2x12 mg im (a 2. adagot 24 óra múlva adjuk)**
- D. 4x5 mg im 24 óra alatt

Helyes válasz: C

337. A szteroid-profilaxis kedvező hatása:

- A. csökken az agykamrai vérzés
- B. kedvezőbb a perinatalis mortalitás
- C. fokozza az alveolaris folyadék felszívódását
- D. mindhárom állítás igaz**

Helyes válasz: D

338. Melyik állítás hamis?

- A. a hidralazin csökkenti az uteroplacentaris véráramlást
- B. a metildopa nem befolyásolja az uteroplacentaris keringést

C. a nifedipin nem befolyásolja az uteroplacentaris keringést

D. az urapidil kedvezőtlenül befolyásolja az uteroplacentaris keringést

Helyes válasz: D

339. A vegetáriánusok között milyen ásványianyag- és vitaminhiány fordul elő leggyakrabban?

A. C-vitamin- és rézhiány

B. B₆ vitamin- és magnéziumhiány

C. B₁₂ vitamin- és vashiány

D. D-vitamin- és jódhiány

Helyes válasz: C

340. Melyik állítás nem igaz?

A. vashiányos anaemia szempontjából veszélyeztetett terhes az aki kevés vöröshúst fogyaszt

B. vashiányos anaemia szempontjából veszélyeztetett a fiatalok és a rossz szociális körülmények között élő várandós

C. vashiányos anaemia szempontjából veszélyeztetettek az ikerterhességet viselők

D. vashiányos anaemia szempontjából különösen veszélyeztetett az a terhes akinek a magzatánál valamilyen fejlődési rendellenesség mutatható ki

Helyes válasz: D

341. A terhesség alatti jódhiány következménye lehet, kivéve:

A. az újszülöttnél golyva

B. praeeclampsia

C. vetélés

D. halvaszülés

Helyes válasz: B

342. Terhességben a napi jódszükséglet:

- A. 200 mikrogramm/nap**
- B. 100 mikrogramm/nap
- C. 50 mikrogramm/nap
- D. 150 mikrogramm/nap

Helyes válasz: A

343. Melyik állítás hamis?

- A. 0,4 mg/napi folsav-pótlás már csökkenti a velőcsőzáródási rendellenesség kialakulását
- B. antikonvulzív terápia mellett folsav-pótlást kell alkalmazni
- C. a várandósság alatti C-vitamin szükséglet 70 mg/nap
- D. a várandós nők 95%-a anaemiás ezért kell minden várandósnak vas-pótlásban részesülni**

Helyes válasz: D

344. Melyik a leggyakrabban használt **amid** típusú helyi érzéstelenítő?

- A. procain
- B. ropivacain**
- C. tetracain
- D. panthocain

Helyes válasz: B

345. Opioid antagonistá szer:

- A. propofol
- B. naloxon**
- C. ketamin
- D. thiopental

Helyes válasz: B

346. Melyik gyógyszert adagolhatjuk az ún. „sétáló EDA” esetén?

- A. lidocain
- B. bupivacain/Ropivacain+Fentanyl**
- C. pethidin
- D. fentanyl

Helyes válasz: B

347. Melyik a leggyengébb gáznarkotikum?

- A. sevofluran
- B. nitrogén-oxidul**
- C. desfluran
- D. enfluran

Helyes válasz: B

348. Melyik intravénás narkotikum az alábbiak közül?

- A. metoclopramid
- B. benzodiazepinek (Midazolam, Diazepam)**
- C. atropin
- D. emetron készítmények (Ondansetron)

Helyes válasz: B

349. Válassza ki, hogy az alábbi fogamzásgátló módszerek közül, melyik véd a herpes vírus, chlamydia, gonococcus, CMV, HIV ellen:

- A. fogamzásgátló tabletták
- B. IUD
- C. spermicidek
- D. önmeztartóztatás**

Helyes válasz: D

350. Az Ogino-Knaus -féle módszer esetén mely ciklusnapokon kell védekezni?

- A. a 12-16. napon
- B. a 10-17. napon**
- C. a ciklus második felében
- D. a ciklus első felében

Helyes válasz: B

351. IUD-t viselő nők ellenőrzése:

- A. évente szükséges
- B. csak panasz esetén
- C. felhelyezés után egy hónappal, majd évenként szükséges**
- D. havonta kötelező

Helyes válasz: C

352. Rézbevonattal rendelkező IUD javasolt használati ideje:

- A. 1 év
- B. 3 év
- C. 5 év**
- D. 7 év

Helyes válasz: C

353. Hepatitis B fertőzés esetén a serumban kimutatható:

- A. HBsAg
- B. HBcAg
- C. HBeAg
- D. mindegyik**

Helyes válasz: D

354. Mi különbözteti meg a várandósság alatti glomerulonephritist a preeclampsiatól?

- A. hypertonia
- B. haematuria**
- C. proteinuria
- D. oedema

Helyes válasz: B

355. Hány kilogramm az ideális havonkénti súlygyarapodás a várandósság alatt?

- A. 0,5 kg
- B. 1,0 kg**
- C. 2 kg
- D. 2,5 kg

Helyes válasz: B

356. A vajúdo nő testhőmérséklete: 38,6°C. Az anyai lázas állapot következtében a

CTG regisztrátumon nagy valószínűséggel az alábbi látható:

- A. beszűkült oszcilláció
- B. variábilis deceleráció
- C. tachycardia**
- D. korai deceleráció

Helyes válasz: C

357. A perinatalis mortalitas fogalma:

- A. a magzat szülés alatti elhalása
- B. a magzat szülés alatti és az újszülött szülés utáni 168 órán belüli elhalása
- C. a magzat terhesség alatti és szülés alatti elhalása és az újszülött szülés utáni 168 órán belüli elhalása**
- D. egyik sem

Helyes válasz: C

358. Válassza ki a convulsio-profilaxis helyes protokollját:

- A. 4 g MgSO₄ 20 perc alatt iv. majd 1-2 g MgSO₄ infúzióban 24 órán keresztül**
- B. 10 g MgSO₄ 20 perc alatt iv. majd 1-2 g MgSO₄ infúzióban 24 órán keresztül
- C. 2 g MgSO₄ 1 óra alatt iv., majd óránként 5 g MgSO₄ 12 órán keresztül
- D. 20 g MgSO₄ 20 perc alatt iv., majd 1-2 g MgSO₄ infúzióban 24 órán keresztül

Helyes válasz: A

359. A bemenet melyik átmérőjének a hossza a legnagyobb?

- A. ferde átmérő
- B. egyenes átmérő
- C. haránt átmérő**
- D. vertikális átmérő

Helyes válasz: C

360. Mi a Bandl-gyűrű?

- A. az előzetes császármetszés hegében kialakuló kötőszövetes képződmény
- B. az uterus aktív (összehúzódnak része) és a passzív szakaszának határa**
- C. a külső méhszáj körüli ectopia mely körkörös az „A” zónára terjed
- D. a mellbimbó körüli gyűrűszerű pigmentált terület

Helyes válasz: B

361. Jelölje meg a lágy szülőcsatorna részeit!

- A. hüvely és a méh
- B. hüvely
- C. hüvely és a medencefenék izomzata
- D. méh, hüvely, medencefenék izomzata**

Helyes válasz: D

362. Normál koponyavégű hüvelyi szülés esetén a vállak megszületési sorrendje a következő:

- A. megszületik a mellső váll azután a hátsó váll
- B. megszületik a hátsó váll majd megszületik a mellső váll**
- C. I. állás esetén először a mellső váll születik meg, majd a hátsó váll
- D. II. állás esetén is először a mellső váll születik meg, majd a hátsó váll

Helyes válasz: B

363. Koponyavégű hosszfekvés, I. állás esetén a vezérvonal hol tapintható a medence üregében?

- A. a jobb ferdében**
- B. a bal ferdében
- C. a haránt átmérőben
- D. az egyenes átmérőben

Helyes válasz: A

364. Medencevégű hosszfekvésre igaz:

- A. Leopold I-es műfogással a fundusban nem tapintható magzati nagyrész
- B. Leopold II-es műfogás során II. állásban a magzati koponyát az anya jobb oldalának megfelelően tapintjuk
- C. a koponya a fundusban**
- D. Zangemesiter műfogással promineáló magzati koponyát tapintunk C

Helyes válasz: C

365. Méhen kívüli terhesség tünete lehet:

- A. vérzéskimaradás
- B. alhasi fájdalom
- C. abarnás-vérezgetés
- D. mind**

Helyes válasz: D

366. Mi a teendő abban az esetben, ha a gravida a minimális magzatmozgásról számol be?

- A. glükóz tartalmú infúzió bekötése a magzatmozgáshoz szükséges fokozott energia fedezésére
- B. azonnal császármetszés végzése
- C. a gravidát a magzatmozgás gyakoribb számolására kérjük
- D. a magzati állapot megítélésére flowmetrias, illetve CTG vizsgálat végzése**

Helyes válasz: D

367. Mit jelent a lepényi szak aktív vezetése?

- A. a magzat megszületését követően várakozó állásponton vagyunk míg a lepény megszületik
- B. a magzat megszületését követően 10 NE oxytocint adunk be bolusban, majd lefogjuk a köldökzsinórt és enyhe húzás segítségével a lepényt eltávolítjuk
- C. a magzat megszületését követően lefogjuk a köldökzsinórt, majd 10 NE oxytocint adunk bolusban és a köldökzsinór enyhe húzásával eltávolítjuk a lepényt**
- D. a lepény eltávolítása során Credé féle műfogást alkalmazunk

Helyes válasz: C

368. Válassza ki a Bracht féle manuális segítségnyújtásra jellemző helyes leírást!

- A. a magzatot a medencetengely meghosszabításában tartjuk.**
ívben a symphysis körül az anya hasa felé
- B. amikor a magzat a scapula alsó csúcsáig megszületett, a magzatot I. állásban az anya bal combhajlata felé húzzuk
- C. a Bracht féle eljárással fejtjük ki a koponyát
- D. a Bracht féle módszer az elakadt karok kifejtésére szolgál

Helyes válasz: A

369. Válassza ki az alábbiak közül a helyes állítást!

- A. a terhesség első felében az anyai vérnyomás nő
- B. a terhesség első felében az anyai vérnyomás csökken**
- C. a terhesség alatt az anyai vérnyomás nem változik
- D. a terhesség alatt ugyan az anyai vérnyomás nem változik, de a pulzusszám nő

Helyes válasz: B

370. Válassza ki az asyncliticus beilleszkedés jellemzőit:

- A. Litzmann-féle obliquitas mellett a nyílvarratot a symphysishez közelebb tapintjuk.**
- B. Naegele-féle obliquitas mellett hüvelyi szülés nem lehetséges.
- C. Litzmann féle obliquitas fennálásakor a magzat mindig könnyen megszületik a szülés előrehaladásával a magzati fül tapinthatóvá válik
- D. Naegele obliquitas mellett gyakoribb a köldökzsinór előesése

Helyes válasz: A

371. Válassza ki azt az állítást, ami helyesen jellemzi a hátsó koponyaforgást!

- A. hátsó koponyaforgás esetén a vezérpont rövidebb utat jár be
- B. hátsó koponyaforgás esetén a kigördülés kétszakaszos,**
- C. hátsó koponyaforgás esetén a gátsérülés veszélye kisebb
- D. hátsó koponyaforgás esetén a nagykutacs hátrafelé forog

Helyes válasz: B

372. Válassza ki azt az állítást, ami helyesen jellemzi az arctartást!

- A. vezérpont az állcsúcs**
- B. a szülés mechanizmusa a normál koponyatartásnak megfele
- C. mentoposterioir arctartás esetén spontán szülés is lehetséges
- D. vezérvonal a sutura frontalis

Helyes válasz: A

373. Válassza ki azt az állítást, ami igaz homloktartásra!

- A. vezérpont a kiskutacs
- B. vezérvonal az arcél
- C. a kigördülés kétszakaszos**
- D. a koponya kilépési síkja a kis ferde átmérőnek megfelelő

Helyes válasz: C

374. Válassza ki azt az állítást, ami nem igaz a befejezetlen vetélésre!

- A. a klinikai tüneteket a bő, darabos vérzés, illetve az alhasi görcsök uralják
- B. hüvelyi vizsgálattal nyitott nyakcsatorna
- C. kívánt terhesség esetén várakozó álláspont**
- D. a vetélést curette-kanállal szükséges befejezni

Helyes válasz: C

375. Válassza ki élettani terhességben a normális nyugalmi pulzusszám felső határának helyes értékét!

- A. 80/min
- B. 90/min
- C. 100/min**
- D. 110/min

Helyes válasz: C

376. Válassza ki mi a praeconceptionalisan és a várandósság alatt alkalmazott folsav szerepe!

- A. Velőcsőzáródási rendellenességek megelőzése**
- B. Gestatos diabetes profilaxisa
- C. Terhességi thrombocytopenia megelőzése
- D. Magzati szívfejlődési rendellenességek megelőzése

Helyes válasz: A

377. Válassza ki, mely kóros terhességi állapot, illetve magzati anomália jár polyhydramnionnal!

A. Potter-syndroma

B. lepényi elégtelenség következtében kialakuló intrauterin retardáció

C. súlyos fokú praeeclampsia

D. egyik sem

Helyes válasz: D

378. A szülés szempontjából a legkedvezőtlenebb:

A. egyszerű fartartás

B. lábtartás

C. far-lábtartás

D. térdtartás

Helyes válasz: B

379. Hány forgást végez a koponya a szülés során?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Helyes válasz: D

380. Mi az oka a terhesség során előforduló epilepsziás görcsrohamok magasabb számának?

A. az első görcsroham gyakran terhesség alatt jelentkezik

B. a beállított antiepileptikumok szérumszintje csökken

C. terhességben fokozott a görcskészség

D. monoterápia alkalmazása biztonságosabb a kombinált helyett

Helyes válasz: B

381. Mit tartalmaz a szikhólyag?

- A. szikvizet
- B. az embrió elsődleges tápanyagát, a szikanyagot**
- C. emberi embrió esetén ez a képlet jelentéktelen
- D. itt jönnek létre az első vérerek és vérsejtek

Helyes válasz: B

382. Vazodilatációs shock alakul ki:

- A. anaphylaxiás reakció esetén**
- B. folyadék- és elektrolitvesztés következtében
- C. ileus (bélelzáródás) esetén
- D. pericardium tamponád következtében

Helyes válasz: A

383. A terhesség alatt folsav szedésével csökkenthető a magzatnál a(z) ... kialakulásának esélye.

- A. Down-szindróma
- B. ajak- és szájpadasadék
- C. microphtalmia
- D. spina bifida**

Helyes válasz: D

384. A korai kezdetű praeclampsia hatékony megelőzése céljából alkalmazott kis dózisú aszpirin mennyisége:

- A. 10 mg/nap
- B. 50 mg/nap
- C. 100 mg/nap
- D. 150 mg/nap**

Helyes válasz: D

385. Melyek a corpus carcinoma tünetei:

- A. rendellenes vérzés
- B. alhasi fájdalom
- C. pyometra esetén láz

D. mindegyik

Helyes válasz: D

386. Válassza ki a terhesség gyanújelét:

- A. fejfájás
- B. alhasi görcs
- C. émelygés**
- D. bő fehér folyás

Helyes válasz: C

387. A terhességi tesztek melyik hormon kimutatásán alapulnak?

- A. ösztrogén
- B. progeszteron
- C. hCG**
- D. FSH

Helyes válasz: C

388. Oligohydramnion esetén a magzatvíz index (AFI: amniotic fluid index) értéke az alábbi határértéknél kisebb:

- A. 10 alatti
- B. 5 alatti**
- C. 10 alatti
- D. 20 alatti

Helyes válasz: B

389. A HELLP-syndroma rövidítésében mit jelöl a „H” betű?

- A. hypertonia
- B. hyperuricaemia
- C. haemolysis**
- D. hypertermia

Helyes válasz: C

390. Válassza ki a gyermekágyban kialakuló mastitis leggyakoribb kórokozóját!

- A. Escherichia coli
- B. Pseudomonas aeruginosa
- C. Staphylococcus aureus**
- D. Egyik sem

Helyes válasz: C

391. Válassza ki, hogy a nifedipinnnek mi a leggyakoribb mellékhatása!

- A. hányinger
- B. látászavar
- C. tachycardia**
- D. végtag remegés

Helyes válasz: C

392. Válassza ki a leggyakoribb rosszindulatú petefészekdaganatot!

- A. dermoid cyta
- B. csírasejtes petefészekrák
- C. hámeredetű petefészekrák**
- D. sex cord stromális daganatok

Helyes válasz: C

393. A petefészekrák 5 éves túlélési aránya:

- A. kb. 10%
- B. kb. 80%
- C. kb. 30%
- D. kb. 45%**

Helyes válasz: D

394. Praeclampsia során mikor beszélünk oliguriáról?

- A. ha a 24 óra alatt ürített vizelet mennyisége 1000 ml alatti
- B. ha a 24 óra alatt ürített vizelet mennyisége 1500 ml alatti
- C. ha a 24 óra alatt ürített vizelet mennyisége 600 ml alatti
- D. ha a 24 óra alatt ürített vizelet mennyisége 400 ml alatti**

Helyes válasz: D

395. Magnézium-intoxicatio esetén milyen gyógyszert kell adni?

- A. iv. kalciumot**
- B. B₆-vitamint
- C. metoprololt
- D. iv. vasat

Helyes válasz: A

396. Melyik antibiotikum ellenjavallt terhességben?

- A. penicillin
- B. cephalosporin
- C. tetracyclin**
- D. clindamycin

Helyes válasz: C

397. Praeclampsia esetén az anyai halálozás leggyakoribb oka:

- A. veseelégtelenség
- B. agyvérzés**
- C. tüdőembólia
- D. DIC miatti elvérzés

Helyes válasz: B

398. Spinális érzéstelenítést követő fejfájásra az alábbi jellemző:

- A. felüléskor fokozódik**
- B. lefekvéskor fokozódik
- C. folyadékterápia fokozza a tüneteket
- D. gyakran hidegrázás, láz kíséri

Helyes válasz: A

399. Melyik rendellenesség nem jellemző a Down-syndromára?

- A. gyakori szívfejlődési rendellenesség
- B. ferde (mongoloid) szemrések
- C. a tenyéren 4 ujjas harántredő (majombarázda)
- D. 18-as trisomia**

Helyes válasz: D

400. A várandós nő táplálkozásával kapcsolatban melyik állítás hamis?

- A. a folyadékfogyasztás korlátozása nem indokolt
- B. vegetáriánus várandós nő étrendjében ügyelni kell a vas-bevitelre
- C. terhességben a magnéziumigény fokozódik
- D. terhességben tilos a feketekávé fogyasztása**

Helyes válasz: D

401. Mi a multikulturalizmus?

- A. Egy etnikum asszimilációja során létrejövő felemás kulturális identitás.
- B. Az etnikai csoportok és kisebbségek asszimilálására való törekvés.
- C. Az etnikai csoportok és menekültek kezelésére, szabályozására kidolgozott szakpolitikák.
- D. A többségi társadalom által alkalmazott eljárások a kulturális sokféleség fenntartására, illetve az erről folyó diskurzus.**

Helyes válasz: D

402. Melyik mobilitási típusra igaz? Olyan társadalmi helyváltoztatást tükröz, amely nem jár együtt hierarchikus pozícióváltással, tehát a társadalmi helyzet változatlan marad.

- A. Vertikális mobilitás
- B. Horizontális mobilitás**
- C. Mindkettő
- D. Egyik sem

Helyes válasz: B

403. A következő állítás esetében melyik válasz a helyes? A beteg kiszolgáltatott és passzív szereplője a gyógyítás folyamatának.

- A. Az egészség biomedikális megközelítése**
- B. Az egészség komplex modellje
- C. Mindkettő
- D. Egyik sem

Helyes válasz: A

404. A következő állítás esetében melyik válasz a helyes? Ez a megközelítés figyelmet fordít az egészség szociális és szubjektív tényezőire is.

A. Az egészség biomedikális megközelítése

B. Az egészség komplex modellje

C. Mindkettő

D. Egyik sem

Helyes válasz: B

405. Az alábbiak közül melyik állítás igaz az abszolút szegénység fogalmára?

A. Csak a relatív depriváció segítségével mérsékelhető.

B. Magyarországon csak a rendszerváltást követően van jelen.

C. Például a létminimum meghatározásával mérhetjük.

D. Más néven tisztes szegénységnek is hívjuk.

Helyes válasz: C

406. A bioetikai dilemmák egy része abból fakad, hogy az ember biológiai és morális élettartama:

A. szétválaszthatatlan

B. folyton csökken

C. nem esik egybe

D. egybeesik

Helyes válasz: C

407. A direkt és indirekt eutanázia közti különbségtétel a(z) ____ elvéből következik.

A. negatív felelősség

B. spiritualitás

C. pozitív felelősség

D. kettős hatás elvéből következik

Helyes válasz: D

408. Az életképesség kritériuma minden esetben a(z) _____ veszi alapul.

A. orvostechnológia fejlettségét

B. magzatot

C. hozzátartozó döntését

D. az élet minőségének elvét

Helyes válasz: A

409. Az anya önrendelkezési jogát tartják elsődlegesnek a _____ álláspont hívei.

A. liberális

B. mérsékelt

C. konzervatív

D. arisztokratikus

Helyes válasz: A

410. A magzatszelektálás módszere és az abortusz erkölcsileg _____

A. nem különbözik egymástól

B. elfogadhat

C. megkülönböztethető

D. elítélendő

Helyes válasz: C

411. A tudományos állítás igazsága a függvénye.

A. paradigma

B. perspektíva

C. társadalom

D. tudós

Helyes válasz: A

412. Az ún. téglaelmélet szerint:

- A. a tudomány alapját a logikai pozitivizmus adja
- B. a tudomány normális folyamatát időnként minőségi változások szakítják meg, és ilyenkor átalakul a tudomány egész szemlélete
- C. a tudomány úgy halad előre, hogy csak az ismeretek bővülnek, minőségi változás nem történik**
- D. a tudomány szűkebb értelemben bizonyítottan igaz

Helyes válasz: C

413. Az „ember a jelentések önmaga szötte hálójában függő állat”

- A. a kultúra egyik definíciója**
- B. a modern ember egyik meghatározása
- C. a társadalom definíciója
- D. a politológia középkori eszméje

Helyes válasz: A

414. A Húsvét-szigetek példázata egy alapja:

- A. meggyőző antropológiai érv
- B. ismert biológiai modell
- C. hatásos ökonómiai modell
- D. meggyőző ökológiai modell**

Helyes válasz: D

415. A filozófiai, tudományos, vallásos és művészi megismerési módok:

- A. egymást kizárják
- B. jól megférnek egymás mellett, ha ismerjük funkciójukat**
- C. a megismerés különböző fejlődési fokait jelenítik meg
- D. lényegében ugyanúgy működnek

Helyes válasz: B

416. Jogi szempontból vizsgálva a terhesség-megszakítás szabályozása során elméleti síkon mely személyiségi jogok kerülnek egymással ellentétbe?

- A. Az állapotos nő méltóságteljes élethez való joga és a magzat önrendelkezési joga.
- B. Az állapotos nő önrendelkezési joga és a magzat apjának gyermekhez való joga.
- C. Az állapotos nő önrendelkezési joga és a magzat élethez való joga.**
- D. Nincsenek egymással ellentétbe kerülő jogok.

Helyes válasz: C

417. Szabályszerű eljárást feltételezve, melyik esetben lehet bármikor megszakítani a terhességet?

- A. Az állapotos nő életét veszélyeztető egészségügyi ok miatt.**
- B. A magzat genetikai, teratológiai ártalmának valószínűsége eléri az 50%-ot.
- C. A terhesség bűncselekmény következménye és az állapotos nő kiskorú, cselekvőképtelen.
- D. Az állapotos nő rendkívül súlyos válsághelyzete esetén.

Helyes válasz: A

418. Miért jár sérelemdíj?

- A. a ruházatában keletkezett kárért
- B. a személyiségi jog megsértéséért**
- C. a vagyonban beállott kárért
- D. az elmaradt vagyoni előnyért

Helyes válasz: B

419. Ki ismerheti meg a beteg orvosi dokumentációját?

- A. a beteg közeli ismerősei
- B. az ellátásában közvetlenül részt vevő egészségügyi dolgozók**
- C. az egészségügyi szolgáltató orvos végzettségű alkalmazottai, más viszont nem
- D. az egészségügyi ellátó összes alkalmazottja, hiszen csak így biztosítható az alkalmazottak biztonsága

Helyes válasz: B

420. Ki adományozhat az alábbiak közül reprodukciós eljárás céljából ivarsejtet?

- A. 35 éven aluli, cselekvőképese személy**
- B. Bárki adományozhat
- C. 40 éven aluli, cselekvőképese személy
- D. 45 éven aluli, cselekvőképese személy

Helyes válasz: A

421. Mit vizsgálna, ha az emberi élet értékét szeretné meghatározni a humántőke megközelítés szerint?

- A. a veszélyességi pótlék nagyságát
- B. a szervek (pl. vese) feketepiaci árát
- C. a kártérítések összegét
- D. a fizetések nagyságát**

Helyes válasz: D

422. Mit jelent az egészségügyi kereslet?

- A. felismert és megélt egészségügyi szükséglet.
- B. a szükséglet, amelyhez vásárlóerő és fizetőeszköz kötődik az egészségügyi piacon.**
- C. amikor a beteg észleli panaszait, de nem fordul orvoshoz.
- D. az egészségügyi dolgozók aggregált bruttó keresete.

Helyes válasz: B

423. Mi jellemző a morális kockázatra?

- A. ha valaki nem érzi közvetlenül és azonnal egy szolgáltatás árát, az a szükségleteit meghaladó mennyiségű fogyasztást eredményez**
- B. ha valaki olyan ajándékot ad másnak, amelyet az nem vásárolna meg, pazarlás következik be
- C. kétszereplős viszony, ahol a szembenállók között érdekellentét van
- D. háromszereplős viszony, ahol mindhárom szereplőnek más érdekei lehetnek

Helyes válasz: A

424. Mi jellemző a fejkvóta típusú finanszírozásra?

- A. hasonló betegségekre azonos összeget fizet
- B. egy fix összeget fizet évente
- C. egy fix összeg fizetése minden napra
- D. egy adott területen lévők száma alapján nyújtja a finanszírozást**

Helyes válasz: D

425. Melyik állítás igaz a magyarországi egészségügyi piacra?

- A. finanszírozója közvetlenül a fogyasztó
- B. csak a fizetőképes fogyasztó veheti igénybe a szolgáltatást
- C. finanszírozója a biztosító (NEAK) vagy a fogyasztó**
- D. reklámozási lehetősége korlátlan

Helyes válasz: C

426. Egy 12 kg-os gyermek napi folyadékszükséglete:

- A. 1000 ml
- B. 1050 ml
- C. 1100 ml**
- D. 1150 ml

Helyes válasz: C

427. Egy 5 éves gyermek normál szisztolés vérnyomás értéke:

- A. 90 Hgmm
- B. 100 Hgmm**
- C. 110 Hgmm
- D. 120 Hgmm

Helyes válasz: B

428. A Moro- reflex:

- A. az újszülöttet ülő testhelyzetbe hozzuk, a nyaki izomzat megfeszülése a fej hátrabilenését csökkenti
- B. hátán fekvő csecsemő párnájára két kézzel ráütünk, olyan mozdulatot tesz, mintha átkarolna valakit, hasonló mozgást végez a lábával is**
- C. a csecsemő talpának külső szélén valamilyen tárgyat végighúzunk, hüvelykujját a többi négy ujjal ellentétes irányban, a talptól távolítva hátrafesztí. A járás elsajátítása után ez a reflex eltűnik.
- D. a talp érintésével az ujjak behajlanak. Ez a reflex a születéstől a 12. hónapig váltható ki

Helyes válasz: B

429. Válassza ki a hamis állítást a colostrumra vonatkozóan:

- A. Az első 72 órában előtej képződik, a colostrum.
- B. Nagy mennyiségű immunglobulint tartalmaz.
- C. Az érett anyatejnél több fehérjét és zsírt tartalmaz.**
- D. A colostrum kis mennyisége ellenére jelentős szerepe van a bélcsatorna születés utáni adaptációjában

Helyes válasz: C

430. Miért lehet csak a 32- 34. héttől elkezdni a koraszülött cumisüvegből való táplálását?

- A. a bélcsatorna éretlensége miatt
- B. mert ekkor alakul ki a szopás- nyelés- légzés koordináció**
- C. az emésztőrendszer éretlensége miatt
- D. mert ekkor már biztonsággal ki tud venni az inkubátorból

Helyes válasz: B

431. Az újszülött resuscitatioiban a mellkaskompresszió : befúvás aránya:

- A. 3:1**
- B. 1:3
- C. 1:5
- D. 5:1

Helyes válasz: A

432. Sűrű meconiumos magzatvízből született gyermek ellátása:

- A. nincs különbség, az újszülött ellátásra vonatkozó algoritmust alkalmazzuk
- B. azonnali leszívást alkalmazunk**
- C. szárazra törlés után, leszívást alkalmazunk
- D. azonnal maszkos ballonos lélegeztetést kezdünk

Helyes válasz: B

433. Velőcsőzáródási rendellenességek esetén ápolási feladatok, kivéve:

- A. myelomeningokelés újszülött megfelelő pozicionálása (háton fektetés)**
- B. a kele azonnali fedése nedvesített gézlappal
- C. gyakori kis mennyiségű etetés
- D. műtét után a fejkörfogat mérése naponta

Helyes válasz: A

434. Ha a gyermeknél Cephalhaematoma externum alakul ki, ápolási feladat:

- A. a hőmérséklet mérése
- B. a fej körfogat mérése
- C. bevitt- ürített folyadék mérése
- D. a területet nyomástól, sérüléstől védeni kell**

Helyes válasz: D

435. Gyermekeknél műtét előtt tájékozódni kell:

- A. van e mozgó fog**
- B. van e kitört fog
- C. hány fog bújt már ki
- D. van e még tejfog

Helyes válasz: A

436. Drogfüggő édesanya újszülöttjére jellemző, kivéve:

- A. verejtékezés
- B. aluszékonyság**
- C. csuklás
- D. tüsszögés

Helyes válasz: B

437. Ha a gyermeket nem megfelelően táplálják és öltöztetik, az:

- A. testi bántalmazás
- B. shaken- baby syndrome
- C. elhanyagolás**
- D. érzelmi bántalmazás

Helyes válasz: C

438. Náthás csecsemő esetében ápolási feladat:

- A. többszöri etetés
- B. orrváladák leszívása**
- C. vénabiztosítás
- D. párasítás

Helyes válasz: B

439. Az EKG bipoáris elvezetése

- A. aVR
- B. II**
- C. aVL
- D. V1-V6

Helyes válasz: B

440. A vérkészítmények felmelegítésére NEM igaz

- A. a készítmény hőmérséklete 20-37 °C között kell legyen
- B. a felmelegítés idő tartama 20-30 perc**
- C. a készítmény fél- maximum 1 órát állhat szobahőmérsékleten
- D. maximum 37 °C-fokos vízfürdőben melegíthető a készítmény

Helyes válasz: B

441. A HbA1c- re igaz állítás

- A. eltelt 12-16 hét átlagos vércukorszint értékét tükrözi
- B. egészségeseknél az érték 4–6%.**
- C. fontos az 1-es és 2-es típusú DM differenciáldiagnosztikájában
- D. minél magasabb a vércukorszint, annál kevesebb hemoglobin alegység köt cukrot

Helyes válasz: B

442. Dorsalis EKG készítése esetén a készülék V5-ös elektródájának pozíciója

- A. bal oldalon, a hátsó hónaljvonal a V6 magasságban
- B. bal oldalon, az angulus scapulae vonalában (scapula középvonalában) a V7 magasságban**
- C. bal oldalon, paravertebrálisan a gerinc processus spinosusán a V8 magasságban
- D. bal oldalon, a hátsó hónaljvonal és a gerincoszlop felezőtávolságán

Helyes válasz: B

443. Nem tartozik a gyors hatású inzulinok csoportjába

- A. Actrapid HM
- B. Humulin L**
- C. NovoRapid Penfill
- D. Humalog Cartridge

Helyes válasz: B

444. A balra tolt vérképre igaz:

- A. alacsony fehérvérsejtszám
- B. polyglobulia
- C. fiatalabb, éretlen fehérvérsejtek a vérben**
- D. polycithaemia

Helyes válasz: C

445. Nyombélfekélyben jelentkező fájdalom jellemzői, kivéve:

- A. éles, égő, ritkán görcsös, „éhségfájdalom”
- B. étkezés után, a gyomor kiürülésével megszűnik**
- C. étkezés, antacid szünteti; alkohol, kávé, idegesség fokozza
- D. hátba, jobbra, derékba sugárzik

Helyes válasz: B

446. A HIV fertőzött betegek korszerű gyógyszeres kezelésére jellemző, kivéve

- A. nagyon sokféle a gyógyszermellékhatás**
- B. egytablettás terápia
- C. a terápiás kudarc oka a nem megfelelő adherencia
- D. hosszú hatású vegyületek alkalmazása

Helyes válasz: A

447. A pillangó erythema megjelenése melyik autoimmun kórkép jellegzetes tünete?

- A. SLE**
- B. Scleroderma
- C. Polyarteritis nodosa
- D. Schönlein henoch purpura

Helyes válasz: A

448. Melyik állítás NEM igaz az ABPM kapcsán?

- A. alkalmas az ingadozó vérnyomásértékek monitorozására
- B. nem elkerülhető, nem kizárható általa a fehérköpeny hipertónia**
- C. nem kell a megszokottól eltérő tevékenységet folytatni
- D. a kapott eredményekkel az egyénre szabott kezelés lehetőség válik lehetségessé

Helyes válasz: B

449. A felsorolt kórképek közül melyik nem tartozik az akut hasi katasztrófa kórképei közé?

- A. ileus
- B. mesenterialis thrombozis
- C. appendicitis acuta
- D. struma nodosa**

Helyes válasz: D

450. Mely betegség gyanúja esetén kell vizsgálni a McBurney-pont?

- A. ileus
- B. varicositas
- C. appendicitis acuta**
- D. struma nodosa

Helyes válasz: C

451. Mely napokon végezzük az emlő önvizsgálatát?

- A. ciklus utáni 7. nap**
- B. ciklus előtt 7. nap
- C. bármikor
- D. menstruáció alatt

Helyes válasz: A

452. Melyik nem ápolói kompetencia míg a beteg a műtőben tartózkodik?

- A. Beteg ágyának előkészítése
- B. Felkészülés a beteg fogadására
- C. Oxigén, szívó rendszer ellenőrzése
- D. Műtőbe bemenni a beteg állapotáról érdeklődni és a családdal kommunikálni a műtéti fejleményekről**

Helyes válasz: D

453. Meddig lehet elsődleges varratot készíteni?

A. sérülést követő 6 órán belül

B. soha

C. sérülést követő 4 órán belül

D. mindig

Helyes válasz: A

454. Mennyi a normál légzésszám felnőttél?

A. 16-20/min

B. 12-16/min

C. 25-30/min

D. 30-35/min

Helyes válasz: B

455. Hűtőfürdő esetén hány fokos vízbe helyezzük a beteget?

A. a beteg testhőmérsékleténél alacsonyabb hőmérsékletű vízbe

B. 28°C –os hőmérsékletű vízbe

C. a beteg testhőmérsékletével azonos hőmérsékletű vízbe

D. mindig 39°C a kiinduló vízhőmérséklet

Helyes válasz: C

456. Mely tudományterületbe tartozik az akadémiai tudományszakokon belül az „Egészségtudományok”?

A. Természettudományok

B. Orvostudományok

C. Társadalomtudományok

D. Bölcsészettudományok

Helyes válasz: B

457. Melyik az ápolási folyamat helyes sorrendje?

- A. felmérés – tervezés – értékelés – végrehajtás
- B. felmérés – végrehajtás – tervezés – értékelés
- C. felmérés – tervezés – végrehajtás – értékelés**
- D. felmérés – értékelés – tervezés – végrehajtás

Helyes válasz: C

458. Hogyan mérjük fel a Decubitus rizikóját?

- A. bővített Norton-skálával**
- B. OPQRST skálával
- C. GCS skálával
- D. BMI indexszel

Helyes válasz: A

459. A tüdőembólia típusos tünetei közé tartozik:

- A. bradycardia, fejfájás
- B. bradypnoe, látási zavar
- C. mellkasi fájdalom, dyspnoe**
- D. hányinger, hasmenés

Helyes válasz: C

460. Mikor beszélünk esszenciális hypertoniáról?

- A. ha coartáció aortae áll a háttérben
- B. ha balkamra aneurysma is kíséri
- C. ha nem mutatható ki primer betegség a háttérben**
- D. ha már több éve fenn áll a betegség

Helyes válasz: C

461. Perifériás vena, kivéve:

A. vena mediana antebrachii

B. vena femoralis

C. vena saphena magna

D. vena cephalica

Helyes válasz: B

462. A rutin EKG:

A. 12 elvezetéses

B. 6 elvezetéses

C. 24 elvezetéses

D. 10 elvezetéses

Helyes válasz: A

463. Az anuria mennyisége felnőtténél:

A. kevesebb, mint 100 ml/24h

B. 200-400/ml/12h

C. 500ml/24h

D. 500-700 ml/12h

Helyes válasz: A

464. A tű mérete subcután beadásnál:

A. 21-23 G

B. 25-27 G

C. 18-22 G

D. 18 G-nél kisebb

Helyes válasz: B

465. Mi a haemocultura vizsgálat?

- A. a vér bakteriológiai vizsgálata**
- B. a vizelet vizsgálata
- C. a köpet tenyésztéses vizsgálata
- D. a vér alvadási paramétereinek vizsgálata

Helyes válasz: A

466. Antikoaguláns terápiával kapcsolatban melyik állítás helyes?

- A. az anticoagulált beteg INR értékét 1-2-re kell beállítani
- B. az anticoagulált beteg INR értékét 3-4-re kell beállítani
- C. az anticoagulált beteg INR értékét 4-5-re kell beállítani
- D. az anticoagulált beteg INR értékét 2-3-ra kell beállítani**

Helyes válasz: D

467. Melyik nem tartozik a digitalis intoxicatio jelei közé?

- A. mellkasi fájdalom**
- B. bradycardia
- C. szikralátás
- D. hányinger, hányás

Helyes válasz: A

468. Mire gondol a következő jelenség kapcsán: A diabeteses beteg éjszakai éhségérzetről panaszkodik, de reggeli vércukrai magasak.

- A. hiperglikémiás kóma
- B. somogyi-effektus**
- C. diabeteses ketoacidosis
- D. terhességi cukorbetegség

Helyes válasz: B

469. Melyik az első választandó szer a magasvérnyomás kezelésében?

- A. Ca antagonisták
- B. ACE gátlók**
- C. alfa blokkolók
- D. diuretikum

Helyes válasz: B

470. Az i.v. Verpamil adása melyik ritmuszavarban kontraindikált:

- A. paroxysmalis supraventricularis tachycardia
- B. WPW—s pitvarfibrillatio**
- C. pitvari flutter

Helyes válasz: B

471. Diabeteses ketoacidoticus coma kezelésének első lépése:

- A. inzulin adás
- B. folyadék pótlás**
- C. acidózis korrekciója

Helyes válasz: B

472. Melyik a leggyakoribb haemophiliás vérzéses manifestatio:

- A. epistaxis
- B. suffusio
- C. haemarthros**

Helyes válasz: C

473. Mikor beszélünk Inzulin dependens diabetesről?

- A. ha csak inzulin adásával tudunk jó anyagcsere állapotot elérni
- B. ha a beteg életben tartásához inzulin szükséges**
- C. ha a diabetes 40 éves kor alatt manifesztálódik

Helyes válasz: B

474. A status asthmaticus kezelési stratégiája:

- A. béta-receptor mimeticum (inhalátor) + aminophyllin + steroid**
- B. nagydózisú nyugtató + steroid
- C. aminophyllin+ steroid + mucolyticum
- D. béta-receptor blockolo + aminophyllin + steroid
- E. béta-receptor mimeticum (inhalátor) + mucolyticum

Helyes válasz: A

475. Az alábbiak közül válassza ki a helytelen állítást:

- A. a tüdőembólia a kórházi halálozás 5-10%-áért tehető felelőssé
- B. a hirtelen halál ténye mögött 25%-ban tüdőembólia áll
- C. a diagnózist követő 1 hónapon belül az alsó végtagi mély vénás trombózisos betegek 6%-a egy hónapon belül meghal
- D. a lélegeztetés a rászoruló tüdőembóliás betegek túlélését 80%-ban biztosítja**

Helyes válasz: D

476. A kardiovaszkuláris betegségek szekunder prevenciójában nem szerepel:

- A. aszpirin adása
- B. ACE inhibitorok adása
- C. diabetes kezelése
- D. helicobacter pylori eradikáció**
- E. rozuvasztatin kezelés

Helyes válasz: D

477. Válassza ki a helyes állítást:

- A. a részegség jogilag általában enyhítő körülménynek számít
- B. az alkohol rendszeres fogyasztása mindenképpen függőséget okoz
- C. déleuropában több tömény szeszt isznak mint Északon
- D. mindennapi rendszeres alkoholfogyasztásnak is lehet egészségkárosító hatása**

Helyes válasz: D

478. Az alábbiak közül melyik az, ami nem rizikófaktor a dohányzásra:

- A. idős vagy középkor**
- B. nagy munkaterhelés
- C. társas támogatottság hiánya
- D. férfi nem

Helyes válasz: A

479. Válassza ki a helytelen állítást:

- A. a májcirrózis prevalenciája csökken**
- B. a májcirrotikus betegek többsége férfi
- C. a májcirrózis kialakulásának jelenleg a Hepatitis B a fő oka
- D. becslések szerint 2030-ra a májcirrózis fő oka alkoholos eredetű lesz

Helyes válasz: A

480. Az alábbiak közül melyik nem szerepel a COPD rizikófaktorai között:

- A. alkaptonuria**
- B. dohányzás
- C. foglalkozási expozíció.
- D. infekció
- E. alfa1-antitripszin hiány

Helyes válasz: A

481. Az alábbiak közül melyik állítás helytelen:

- A. az emlőrák szűrése populációs szinten 45 és 65 éves korú nők között zajlik
- B. az emlőrák szűrése ultrahang vizsgálattal történik**
- C. az emlőrák szűrése populációs szinten 2 évente szükséges
- D. az emlőrák halálozás a megelőzhető halálozás kategóriájába tartozik

Helyes válasz: B

482. A szenzitivitás:

- A. megmutatja, hogy minden beteget kiszűr-e a vizsgálat**
- B. megmutatja, hogy biztosan beteg-e, akit kiszűrtek
- C. nem ez a fontos, hiszen a specificitás fontosabb
- D. a kiszűrt betegek és egészségesek aránya

Helyes válasz: A

483. Válassza ki a helytelen állítást:

- A. az eset-kontroll vizsgálat más néven retrospektív vizsgálat
- B. a kohorsz vizsgálat más néven prospektív vizsgálat
- C. a kohorsz vizsgálatot nevezik incidencia vizsgálatnak is
- D. a kohorsz vizsgálatot nevezik prevalencia vizsgálatnak is**

Helyes válasz: D

484. Válassza ki a helytelen állítást:

- A. a fejlett országok legnagyobb problémája az előregedés
- B. a túlnépesedés főleg a fejlődő országok jellemzője**
- C. a piramis alakú korfa alapján valószínű az alacsony születéskor várható élettartam.
- D. a piramis alakú korfa a fejlődő társadalmakra jellemző

Helyes válasz: B

485. A retrospektív vizsgálat:

- A. más néven kohorsz vizsgálat
- B. más néven prevalencia vizsgálat
- C. más néven eset-kontroll vizsgálat**
- D. más néven incidencia vizsgálat

Helyes válasz: C

486. Ritka betegségek rizikófaktorainak kivizsgálására mit választana?

- A. eset-kontroll vizsgálatot**
- B. bármelyik analitikus vizsgálatot
- C. kohorsz vizsgálatot
- D. keresztmetszeti vizsgálatot

Helyes válasz: A

487. Mi a farmakokinetika fogalma?

- A. a gyógyszer hatásmechanizmusának vizsgálata
- B. a gyógyszerek szervezeten belüli sorsának vizsgálata**
- C. a gyógyszerteran tudományos elnevezése
- D. farmakoökonómia más néven

Helyes válasz: B

488. Melyik a felsoroltak közül elsőként választandó gyógyszer terhelességi hipertóniában?

- A. Papaverin
- B. α -metil-dopa (DOPEGYT tabl.)**
- C. Atropin
- D. Atorvastatin

Helyes válasz: B

489. Mi a compliance jelentése?

- A. a betegnek a gyógyszeres terápia során tanúsított együttműködése**
- B. a beteg terápiahűsége, tudatos életmódja és gyógyulni akarása
- C. a Farmakoökonómia egyik elemző módszere
- D. a nem-kívánt mellékhatás angol megfelelője

Helyes válasz: A

490. Mit nevezünk egy gyógyszerkészítmény esetében retard hatásnak?

- A. valamely gyógyszer alkalmazása után fellépő legintenzívebb hatás
- B. ha a gyógyszer kevesebb mellékhatással rendelkezik
- C. ha a hatóanyag szabályozottan és elnyújtottan szabadul fel a gyógyszerből**

Helyes válasz: C

491. Mit nevezünk adherenciának?

- A. személyre szabott, új gyógyszerek használatát
- B. a beteg terápiahűségét, tudatos életmódját és gyógyulni akarását**
- C. széles körben használt gyógyszerek helyes alkalmazását
- D. a betegek gyógyszeres terápia során tanúsított együttműködését
- E. az egyidejűleg alkalmazott szerek egymásra való hatását

Helyes válasz: B

492. Melyik állítás nem igaz az alábbiak közül?

- A. Az NSAID-okat széles körben alkalmazzák fájdalomcsillapításra és gyulladáscsökkentésre.
- B. A NSAID-ok nem használhatóak rheumatoid arthritis, köszvény és migrénes fejfájás csillapítására.**
- C. A morfin szintetikus és félszintetikus származékai az ún. major analgetikumok.
- D. Az ópiátok hosszú távú alkalmazásával tolerancia, ill. dependencia alakulhat ki

Helyes válasz: B

493. A gyógyszerek osztályozási rendszere az ATC rendszer, mely:

- A. anatómiai, terápiás, kémiai szerkezet alapú besorolási rendszer**
- B. farmakokinetikai besorolási rendszer
- C. gyógyszerbiztonsági rendszer
- D. farmakovigilancia alapú besorolási rendszer

Helyes válasz: A

494. Mely hatóanyagnak egyik káros mellékhatása a Reye-szindróma?

- A. papaverin
- B. atropin
- C. aszpirin**
- D. cisplatin

Helyes válasz: C

495. Mely hatástani csoportra jellemző a MDR fogalma? (Multidrug resistant)

A. acetilszalícilsav

B. antibiotikumok

C. simaizom görcsoldók

D. obstipánsok

Helyes válasz: B

496. A NYHA stádiumok:

A. az ischaemiás szívbetegség súlyossági fokozatai

B. a szívelégtelenség súlyossági fokozatai

C. nem függ össze a túlélési prognózissal

D. a májelégtelenség súlyossági fokozatai

Helyes válasz: B

497. Az asthma bronchialera jellemző:

A. irreverzibilitás

B. crepitáció a hallgatózáskor

C. szörcszörejek

D. hörgők simaizom sejtjeinek spazmusa

Helyes válasz: D

498. A COPD –re jellemző, kivéve:

A. produktív köhögés

B. progresszió

C. reverzibilitás

D. crepitáció

Helyes válasz: D

499. Válassza ki a helytelen állítást:

- A. az akut hasi fájdalom az esetek felében nem típusos
- B. a tévesen megoperált appendektomia nem számít műhibának
- C. fiatal és középkorú nőknél az akut has leggyakoribb oka nőgyógyászati
- D. a laborvizsgálatok döntő jelentőségűek akut hasi történésnél**
- E. Szívinfarktus is tud akut hasi tünetekre hasonlító képet adni

Helyes válasz: D

500. Az astma bronchiáléra jellemző kivéve:

- A. nyálkahártya oedema
- B. fokozott nyáktermelés
- C. irreverzibilitás**
- D. sipolás-búgás hallgatózáskor

Helyes válasz: C

501. A glaukoma rizikófaktorai között nem szerepel:

- A. idős kor
- B. magas vérnyomás
- C. vitium**
- D. cukorbetegség
- E. genetikai hajlam

Helyes válasz: C

502. A conjunctivitis esetében nem igaz:

- A. lehet vírusos
- B. lehet bacterialis
- C. lehet Allergiás
- D. látásromlással jár**

Helyes válasz: D

503. A garatmandula kivételének indikációja, kivéve:

- A. évi három- négy gennyes mandulagyulladás
- B. ízületi gyulladások, amelyek összeköthetők idült mandulagyulladással
- C. prevencióként**
- D. mandula környéki tályog

Helyes válasz: C

504. Az orrmandula kivételének indikációja:

- A. visszatérő arcüreggyulladás
- B. halláskárosodás
- C. visszatérő középfülgyulladás
- D. horkoló légzés
- E. prevencióként**

Helyes válasz: E

505. Arcüreggyulladás kezelése, kivéve:

- A. szisztémás szteroid**
- B. antibiotikum
- C. arcmelegítés
- D. lohasztó orrspray

Helyes válasz: A

506. Hogyan nevezzük a megtermékenyített petesejtet?

- A. zygóta**
- B. embryo
- C. foetus
- D. blastocysta

Helyes válasz: A

507. Mely időintervallumban nevezzük embryónak?

- A. 10. héttől fogva
- B. 2. és 8. hét között**
- C. 10. héttől a 1. hétig
- D. 15. héttől a 20. hétig

Helyes válasz: B

508. Mekkora egy petesejt mérete?

- A. 60 mikrométer
- B. 80 mikrométer
- C. 100-200 mikrométer**
- D. 150-300 mikrométer

Helyes válasz: C

509. Mekkora egy spermium mérete?

- A. 30 mikrométer
- B. 60 mikrométer**
- C. 80 mikrométer
- D. 100 mikrométer

Helyes válasz: B

510. Hogyan nevezzük a szedercsíra állapotot?

- A. blastocysta
- B. zygóta
- C. embryo
- D. morula**

Helyes válasz: D

511. Hogyan nevezzük a hólyagcsíra állapotot?

- A. morula
- B. embryo
- C. blastocysta**
- D. zygóta

Helyes válasz: C

512. Milyen hám fedi az ovariumot?

- A. egyrétegű csillósórös hengerhám
- B. egyrétegű köbhám**
- C. egyrétegű hengerhám
- D. egyrétegű kefeszegélyes hengerhám

Helyes válasz: B

513. Hol helyezkedik el az ovarium?

- A. az arteria iliaca externa és interna elágazásában**
- B. arteria hepatica propria szomszédságában
- C. vena iliaca communis dextra et sinistra elágazásában
- D. vena azygos kezdetén

Helyes válasz: A

514. Mely képlet tartozik a tuba uterinához?

- A. pars uterina**
- B. fundus uteri
- C. corpus uteri
- D. isthmus uteri

Helyes válasz: A

515. Mely képlet nem tartozik a tuba uterinához?

- A. pars uterina
- B. isthmus tubae**
- C. portio vaginalis
- D. ampulla tubae

Helyes válasz: B

516. Milyen hám van a tuba uterinában?

- A. egyrétegű több mag Soros csillós hengerhám
- B. egyrétegű csillós hengerhám**
- C. egyrétegű hengerhám
- D. egyrétegű köbhám

Helyes válasz: B

517. Hány cm hosszúságú a tuba uterina?

- A. 12 cm**
- B. 10 cm
- C. 24 cm
- D. 32 cm

Helyes válasz: A

518. Milyen hám van a légutakban?

- A. egyrétegű köbhám
- B. egyrétegű hengerhám
- C. kefésegeles köbhám
- D. egyrétegű többmag Soros csillós hengerhám**

Helyes válasz: D

519. Milyen hám van a vékonybélben?

A. egyrétegű mikrobolyhos hengerhám

B. kefeszegélyes köbhám

C. egyrétegű köbhám

D. egyrétegű hengerhám

Helyes válasz: A

520. Milyen hám van a tubulus contortus proximalisban?

A. egyrétegű csillós hengerhám

B. egyrétegű mikrobolyhos hengerhám

C. egyrétegű kefeszegélyes köbhám

D. egyrétegű hengerhám

Helyes válasz: C

521. Milyen hám van a tubulus rectusban?

A. epithel

B. mesothel

C. endothel

D. egyrétegű köbhám

Helyes válasz: A

522. Milyen hám van a testisben?

A. egyrétegű köbhám

B. egyrétegű stereociliumos hengerhám

C. epithel

D. mesothel

Helyes válasz: B

523. Milyen hám van a húgyutakban?

A. urothelium

B. epithel

C. mesothel

D. endothel

Helyes válasz: A

524. Milyen hám van a férfi húgycsőben?

A. urothelium

B. több rétegű hengerhám

C. epithel

D. mesothel

Helyes válasz: B

525. Hol fordul elő a szervezetben holocrin mirigy?

A. prostata

B. faggyúmirigy

C. emlő

D. glandula submandibularis

Helyes válasz: B

526. Hol fordul elő a szervezetben apocrin mirigy?

A. glandula sublingualis

B. prostata

C. parotis

D. emlő

Helyes válasz: B

527. Mely képlet a hashártyaborítéka az uterusnak?

- A. ligamentum flavum
- B. ligamentum teres uteri
- C. ligamentum costoclaviculare
- D. ligamentum latum uteri**

Helyes válasz: D

528. Átmegy a placentán:

- A. IgG**
- B. IgM
- C. IgA
- D. IgD

Helyes válasz: A

529. Az IgA ellenanyag:

- A. hízósejtekhez kötődik
- B. szekréciókban jelen van**
- C. opszonizál
- D. opszonizál
- E. az újszülöttben először ez jelenik meg

Helyes válasz: B

530. A Cori-körben:

- A. tejsav jut az izomból a májba**
- B. a májban piruvátból laktát képződik
- C. tejsav jut a májból az izomba
- D. glükóz jut az izomból a májba
- E. a pancreasban zajlik

Helyes válasz: A

531. Mennyi a vvt átlagos élettartama?

- A. 50 nap
- B. 300 nap
- C. 120 nap**
- D. 24 óra

Helyes válasz: C

532. A citromsav ciklusra jellemző:

- A. 2 mol CO₂ keletkezik a biológiai oxidáció során lebomló 1 mol glükózból
- B. H-szállító a NADP+
- C. anaerob folyamat
- D. citromsav kapcsolódva az acetyl-csoporthoz oxálcetsavvá alakul
- E. a mitokondrium belső plazmaállományában zajlik**

Helyes válasz: E

533. Melyik nem tartozik a TSH jellemzői közé?

- A. stimulálja a I- pajzsmirigybe jutását
- B. stimulálja a jodinálást
- C. stimulálja a follikuláris sejtbe a tireoglobulin endocitózist**
- D. stimulálja a follikuláris sejtől a tireoglobulin exocitózist

Helyes válasz: C

534. Melyik nem jellemző a Női nemi ciklus 14-28. napjára?

- A. sárgatest kezd visszafejlődni a 27. naptól**
- B. fokozódó méhnyálkahártya-váladéktermelés
- C. újabb tüsző érkezik (26. nap)
- D. cervixnyák átjárhatatlan

Helyes válasz: A

535. Nem placentáris hormon:

- A. hCS
- B. hCG
- C. relaxin
- D. oxitocin**
- E. ösztradiol

Helyes válasz: D

536. A hereműködés szabályozása:

- A. az LH serkenti a Sertoli sejtek működését
- B. az FSH serkenti a tesztoszteron termelést
- C. az inhibint a Leydig sejtek termelik
- D. a tesztoszteron gátolja a GnRH termelést**
- E. az FSH gátolja a GnRH termelést

Helyes válasz: D

537. A vazomotor központ helye:

- A. nyúltvelő**
- B. hipotalamusz
- C. középagy
- D. agykéreg
- E. híd

Helyes válasz: A

538. Premotoros área végzi:

- A. mozgások tervezését
- B. akaratlagos mozgások indítását
- C. mozgáskoordináció
- D. a beszéd szervezését
- E. mozgások előkészítését**

Helyes válasz: E

539. A Henle-kacs felszálló vastag szegmentumán:

- A. aktív Na⁺ reabszorpció folyik**
- B. passzív Na⁺ reabszorpció folyik
- C. aktív víz reabszorpció folyik
- D. passzív víz reabszorpció folyik
- E. nincs Na⁺ reabszorpció

Helyes válasz: A

540. Hydronephrosist okozhat:

- A. vesekő**
- B. akut glomerulonephritis
- C. akut pyelonephritis
- D. akut veseelégtelenség

Helyes válasz: A

541. A clearance:

- A. a vesén átaramló plazma mennyisége egy perc alatt
- B. az a plazmamennyiség, amit a vese egy adott anyagtól 1 perc alatt megtisztít**
- C. a vesén átaramló vér mennyisége egy perc alatt
- D. a szűrlet
- E. az a plazma mennyiség, ami átszűrődik a glomerulusokon

Helyes válasz: B

542. A bronchiolusokra jellemző:

- A. csillószőrös hengerhám borítja
- B. mirigysejtjei mucosus váladékot termelnek
- C. kolinerg hatásra kontrahálódnak**
- D. porcszövet építi fel
- E. nincs benne simaizom

Helyes válasz: C

543. A vitálkapacitás:

- A. 1-2 liter
- B. 1500-2000 ml
- C. 3100-4800 ml**
- D. 6500-8000 ml
- E. 400-500 ml

Helyes válasz: C

544. Mit jelent a szív automáciája?

- A. az AV csomó is lehet pacemaker
- B. a szívben az ingerületet módosult izomsejtek vezetik
- C. a szívizom sajátos vérellátását
- D. a denervált szív megfelelő tápanyag- és oxigénellátás mellett továbbra is működik**
- E. a szív működését a vegetatív idegrendszer irányítja

Helyes válasz: D

545. Az erek ellenállása:

- A. nem függ az érátmérőtől
- B. nem függ a vér viszkozitásától
- C. fordítottan arányos az ér sugarával
- D. fordítottan arányos az érsugár negyedik hatványával**
- E. fordítottan arányos az érsugár második hatványával

Helyes válasz: D

546. Az angiotenzin II.:

- A. a májban keletkezik angiotenzin I-ből
- B. értágító hatású
- C. fokozza a májban az angiotenzin I. szintézisét
- D. a tüdőkapillárisokban képződik konvertáz enzim hatására angiotenzin I-ből**
- E. gátolja a mellékvesekéreg aldoszteron-termelését

Helyes válasz: D

547. A szívizomra jellemző:

- A. a Ca^{2+} csak a szarkoplazmás retikulumból származik
- B. a munkaizomrostok szimpatikus beidegzést kapnak**
- C. a vékony filamentum a miozin
- D. nincs harántcsíkoltat

Helyes válasz: B

548. Hány kromoszóma van egy hímivarsejtben?

- A. 46 különböző kromoszóma
- B. 23 darab kromoszóma**
- C. 23 pár kromoszóma (összesen 46)
- D. 1 (vagy X, vagy Y kromoszóma)

Helyes válasz: B

549. Melyik esetben van veszélyben a magzat az Rh-inkompatibilitás miatt?

- A. ha az anya Rh+ a gyerek pedig Rh- vércsoportú
- B. ha az anya Rh- a gyerek pedig Rh+ vércsoportú**
- C. ha mindketten Rh⁺ vércsoportúak
- D. ha mindketten Rh⁻ vércsoportúak

Helyes válasz: B

550. Mi játszik szerepet a nyitott gerinc kialakulásában?

- A. folsav hiány**
- B. vírus fertőzés
- C. nehézfémek
- D. anya toxoplazma fertőzése

Helyes válasz: A

551. Mi okozza a Down szindrómát?

- A. a 21-es kromoszóma triszómiája**
- B. deléción az 5. kromoszóma rövid karján
- C. a 18-as kromoszóma triszómiája
- D. egy gén hibás allélja

Helyes válasz: A

552. Mi jön létre a neuruláció során?

- A. a velőcső**
- B. a 3 csíralemez
- C. két haploid sejtől egy diploid sejt
- D. a gyomor

Helyes válasz: A

553. Mit jelenthet az, ha egy örökletes betegség gyakrabban fordul elő férfiakban, mint nőkben?

- A. hogy a génje biztosan a 21-es kromoszómán van
- B. hogy domináns módon öröklődik
- C. hogy a génje az X kromoszómán található**
- D. hogy a nők sokkal ellenállóbbak a betegségekkel szemben, mint a férfiak

Helyes válasz: C

554. Az alábbiak közül melyik minta NEM alkalmas citogenetikai vizsgálatra?

- A. vörösvérsejtek**
- B. tumorszövet
- C. hereszövet
- D. limfociták

Helyes válasz: A

555. A teratogénekre való érzékenység ebben az időszakban a legnagyobb:

- A. magzati fejlődés időszaka (3. hónaptól)
- B. organogenezis időszaka (2-8.hét)**
- C. pre-embriónális fejlődés időszaka (0-2. hét)
- D. azonos az érzékenység az összes fejlődési szakaszban

Helyes válasz: B

556. Mi jellemző a típusos gyászreakcióra?

- A. hajlamosíthat pszichózisra
- B. előfordul, hogy az érzelmek elfojtásával, hiányával jár
- C. eltarthat akár 3-6 hónapig is**
- D. gyakori az elvesztett tárggyal való azonosulás, a hipochondriás megnyilvánulás

Helyes válasz: C

557. Mikor a legnagyobb az öngyilkosság veszélye depressziós betegeknél?

- A. este
- B. hajnalban**
- C. reggel
- D. délután

Helyes válasz: B

558. A szorongásos zavarok közé tartozik, kivéve:

- A. generalizált szorongásos zavar
- B. hipochondriázis**
- C. agorafóbia
- D. pánik zavar

Helyes válasz: B

559. Az átkeretezés olyan kommunikációs stratégia, amikor:

A. az adott helyzetnek más közeget, értelmezési keretet adunk.

B. tudatosan torzítjuk a rendelkezésünkre álló információt.

C. kérdésekkel más irányba tereljük a kommunikációt.

D. egymás után olyan kérdéseket teszünk fel, amikre „igen” választ kapunk

Helyes válasz: A

560. Az egészségnevelés a pedagógia tudományának melyik ágába tartozik?

A. általános

B. speciális - egyéb

C. speciális - életkor szerinti

D. nem tartozik egyikbe sem

Helyes válasz: B

561. Melyik egészségfejlesztési modell áll legközelebb a pedagógiához?

A. medicinális

B. magatartásformáló

C. kliensközpontú

D. környezetalakító

Helyes válasz: B

562. Melyik kommunikációs zavarforrás jelenti az egészségnevelő hiteltelenségét?

A. inkongruencia

B. empátia

C. asszertivitás

D. bipolaritás

Helyes válasz: A

563. Melyik nevelési módszer nem alkalmazható az egészségnevelésben?

- A. meggyőzés
- B. gyakoroltatás
- C. büntetés**
- D. metakommunikáció

Helyes válasz: C

564. Az epigenetikai szemléletű egészségnevelés nézete szerint:

- A. a betegséghajlamokat tanuljuk
- B. az egészség a személyiségtípuson múlik
- C. a szocializáció alakítja a betegségeket
- D. az egészségmagatartás bizonyos elemei generációkon át öröklődnek**

Helyes válasz: D

565. A betegedukáció azt jelenti, hogy:

- A. komplex oktatás, nevelés, fejlesztés, tanácsadás**
- B. nevelés és képzés
- C. elsődleges szocializáció
- D. intézményi betegellátás

Helyes válasz: A

566. Az elsődleges prevenció legfőbb eszköze a:

- A. rehabilitáció
- B. szegregáció
- C. védőoltások és edukáció**
- D. pszichoterápia

Helyes válasz: C

567. A legkorszerűbb iskolai egészségnevelési eljárások közé tartozik:

- A. nagylétszámú előadás
- B. plakát
- C. élő könyvtár**
- D. oktatófilm

Helyes válasz: C

568. Projektív tesz az alábbiak közül:

A. Minnesota Multiphasic Personality Inventory

B. Rorschach teszt

C. Wechsler-féle intelligencia teszt

D. Spielberger szorongásbecslő skála

Helyes válasz: B

569. Az alábbi állítások közül melyik hamis?

A. A pszichoanalitikus elmélet az agressziót alapvető késztetésnek tekinti.

B. A gyermekek agresszivitása alapvetően fokozódik, ha megerősítik és csökken, ha megbüntetik őket agresszív viselkedésükért.

C. Az agresszió kifejezése csökkenti a további agresszív megnyilvánulásokat.

D. A szociális tanuláselmélet szerint az agresszív válaszok utánzás útján is elsajátíthatók.

Helyes válasz: C

570. A fejlődés szakaszaira melyik állítás nem jellemző?

A. A gyermekek egyediek, nem ugyanazokon a szakaszokon haladnak fejlődésük során.

B. A viselkedés egy adott időszakon belül egy adott dolog vagy összetartozó tulajdonságok köré szerveződik.

C. Egy adott időszak jellemző viselkedése minőségileg eltér a korábbi szakaszok jellemzőitől.

D. Egy adott időszak jellemző viselkedése minőségileg eltér a későbbi szakaszok jellemző viselkedésétől.

Helyes válasz: A

571. A sémák:

- A. a csoporthoz tartozást szimbolizálják
- B. emberek, tárgyak, helyzetek mentális reprezentációi**
- C. növelik a kohézió erejét
- D. főként érzelmi tartalmakat közvetítenek

Helyes válasz: B

572. Az alábbi állítások közül melyik hamis?

- A. Mindannyian rendelkezünk ideális énnel, bizonyos elképzelésekkel arról, hogy milyenek szeretnénk lenni.
- B. A reális én tartalmazza az „ént” jellemző összes elképzelést, észleletet és értéket, beleértve a „ki vagyok én” és „mire vagyok képes” tudatát.
- C. Minél közelebb áll énídeálunk reális énünkhöz, annál kiteljesedettebbek és boldogabbak leszünk.
- D. A reális én és az ideális én között sohasem jön létre össze nem illés.**

Helyes válasz: D

573. Az alábbiak közül melyik krízis jellemzi Erik Erikson elmélete szerint a serdülőkort?

- A. identitás vagy szerepkonfúzió**
- B. autonómia vagy kétely
- C. kezdeményezés vagy büntudat
- D. intimitás vagy izoláció

Helyes válasz: A

574. Az alábbiak közül melyik nem tartozik az érzelmek közé?

- A. szomorúság
- B. undor
- C. harag
- D. szomjúság**

Helyes válasz: D

575. Melyik állítás nem igaz a fejlődéslélektanra?

- A. A fejlődéslélektan azt vizsgálja, hogy az emberi működés hogyan változik az élet folyamán.
- B. A fejlődéslélektan a kognitív működés sajátosságaival foglalkozik.**
- C. A fejlődéslélektan a testi fejlődéssel, a kognitív fejlődéssel, és a társas készségek fejlődésével foglalkozik.
- D. Az élethosszig tartó pszichés fejlődést mutatja be.

Helyes válasz: B

576. Mit értünk a személyiség introverzió- extraverzió dimenziója alatt?

- A. A személy figyelme milyen mértékben irányul önmaga irányába befelé vagy a külvilág irányába.**
- B. A személy mennyire a hangulata által vezérelt, szorongó, rosszul alkalmazkodó illetve higgadt és jól alkalmazkodó.
- C. A személy mennyire gondatlan, megbízhatatlan illetve gondos és megbízható.
- D. A személy mennyire konvencionális és bátortalan illetve eredeti és merész.

Helyes válasz: A

II. Többszörös feleletválasztás

1. A laparaskópiás beavatkozás előnye más hasi műtéttel szemben:

- A. kicsi metszés a hason.**
- B. a lábadozási idő, a kórházban töltött napok száma, illetve a teljes felépülés ideje jelentősen csökken.**
- C. a műtétek utáni összenövéses szövődmények előfordulása kevesebb.**
- D. esztétika eredmény

Helyes válasz: A, B, C

2. Laparaskópos beavatkozást lehet végezni:

- A. meddőség okainak tisztázása végett**
- B. petevezeték átjárhatósági vizsgálata miatt**
- C. hasi szervekből, hasüregből mintavétel daganat gyanújakor.**
- D. krónikus kismencedei fájdalom hátterének tisztázása céljából**

Helyes válasz: A, B, C, D

3. Laparaskópiás beavatkozáson átesett beteg ápolása során mindig figyelni kell:

- A. a bevitt- ürített folyadék mennyiségére**
- B. a drénen keresztül ürülő váladékra**
- C. a vitális funkciókra**
- D. a beteg tudatállapotára**

Helyes válasz: A, B, C, D

4. A hasi műtéten átesett beteg ápolása során azonnal orvosnak kell szólni, ha a betegnél:

- A. erős szegycsont mögötti fájdalom lép fel**
- B. vérköpet, véres hányást tapasztalunk**
- C. hirtelen fellépő cianózist tapasztalunk**
- D. hőemelkedés, láz esetén**

Helyes válasz: A, B, C, D

5. A gyermek-nőgyógyászati vizsgálóeljárások esetén fontos a gyermek megnyugtatása, melyet elősegíthetünk azzal, ha:

- A. biztosítsuk a szülő jelenlétét**
- B. elvonjuk a gyermek figyelmét azáltal, hogy játékot adunk a kezébe**
- C. az orvos és a szülésznő türelmes**
- D. a vizsgálóhelyiségben barátsággal fogadjuk a gyermeket**

Helyes válasz: A, B, C, D

6. Az alábbi fogamzásgátlási módszerek közül, melyek tartoznak a természetes fogamzásgátlás közé:

- A. naptármódszer**
- B. hüvelynyák vizsgálata**
- C. méhszájsapka
- D. ébredési hőmérséklet mérése**

Helyes válasz: A, B, D

7. Melyek az ápolási folyamat alkalmazásának előnyei:

- A. biztosítja a speciális tervezést**
- B. tökéletesíti a betegnek nyújtott ellátás folyamatosságát**
- C. a szükséges információk a betegről a team valamennyi tagja számára rendelkezésre állnak**
- D. lehetővé teszi a személyközpontú ápolást**
- E. biztosítja, bátorítja a beteget a saját ellátásában való részvételre**

Helyes válasz: A, B, C, D, E

8. Mely tünetek tartoznak a terhesség gyanújelei közé:

- A. émelygés**

- B. a menstruáció elmaradása
- C. hányinger**
- D. kedélyállapot-változás**

Helyes válasz: A, C, D

9. A gyermekágy időszaka alatt, a kismamának különösen figyelnie kell:

- A. fokozott mértékben ügyeljen a személyi higiéniére**
- B. a gáttájékot naponta többször mossa le**
- C. szoptatás előtt a mellett is elő kell készíteni, mossa le**
- D. fontos a gyakori vizeletürítés**
- E. bőséges folyadékbevitel**

Helyes válasz: A, B, C, D, E

10. A szülés megindulásának biztos jelei:

- A. a magzatvíz elfolyása**
- B. a méhizomzat rendszeres összehúzódása, szülőfájások**
- C. a mell feszülése
- D. a várandós fokozott émelygésről, hányingerről panaszkodik

Helyes válasz: A, B

11. Melyek a szülőszék használatának előnyei:

- A. egyszerű, könnyen tisztítható**
- B. a kitolási szak lerövidül**
- C. a szülés könnyebbé válik**
- D. a szülésznő számára kisebb fizikai megterhelést jelent a szülés vezetése

Helyes válasz: A, B, C

12. A várandósgondozás keretében a szülésznő által önállóan, a szakmai irányelv alapján végezhető vizsgálatok:

- A. a várandósság külső tapintásos vizsgálata**
- B. a vizelet vegyi vagy tesztcsíkos vizsgálata**

C. vérnyomás és pulzus mérése

D. belső (hüvelyen keresztül) végzett vizsgálat, és a hozzá tartozó kolposzkópos vizsgálat

E. alsó végtag megfigyelése és vizsgálata

Helyes válasz: A, B, C, E

13. Nem lehetséges az Intézetén kívüli szülés abban az esetben, ha:

A. az előző szülésnél negyedfokú gátsérülés történt

B. amennyiben az anyánál hipertónia áll fenn

C. a várandós nő lázas állapotban van

D. anyai szívbetegség esetén

E. amennyiben a terhesség, in vitro fertilizáció eredménye

Helyes válasz: A, B, C, D, E

14. Intézetén kívüli szülés esetén a kórházba szállítás indikációi:

A. kóros magzati szívhangeltérések

B. fekvési rendellenességek

C. előesett köldökzsinór

D. az újszülött aluszékony

E. erős vérzés

Helyes válasz: A, B, C, E

15. A meconium a magzat veszélyeztetettségét jelentheti abban az esetben, ha ezzel együtt:

A. a CTG görbe nem megnyugtató

B. lázas állapot áll fenn, vagy a fertőzés bármelyik jele mutatkozik

C. ha olygohydramnion is fennáll

D. a meconiumos magzatvíz önmagában is veszélyeztetettséget jelent

Helyes válasz: A, B, C, D

16. Melyek a kitolási szak szülésznői teendői?

A. az anya állapotának ellenőrzése

B. a magzat észlelés

C. a nyomások irányítása

D. a húgyhólyag telttségének ellenőrzése

E. a koponya, vállak, törzs kifejtése

Helyes válasz: A, B, C, D, E

17. A gátmetszés javallatai közé tartozik:

A. nagy magzat esetén

B. a koponya forgási rendellenességei esetén

C. nehezen táguló, heges, merev gát esetén

D. minden esetben, a méhszáj eltűnése után azonnal

Helyes válasz: A, B, C

18. Melyek a nőgyógyászati betegek ápolásának legfontosabb elvei:

A. személyre szóló, a beteg szükségletein alapuló ápolás

B. biztonságos környezet megteremtése

C. segíteni a megelőzés és a rehabilitációt

D. figyelembe kell venni a női életkori sajátosságokat, az életkornak megfelelő nőgyógyászati jellemzőket

Helyes válasz: A, B, C, D

19. Melyek a műtéthez kapcsolódó leggyakoribb szövődmények?

A. vérzések

B. keringési, légzési szövődmények

C. műtét utáni jó kedélyállapot

D. a vizelet kiválasztás és ürítés zavarai

E. shock

Helyes válasz: A, B, D, E

20. A DIC oka lehet a szülészetben:

A. IUGR

B. preeclampsia

C. szeptikus shock

D. idő előtti lepényleválás

Helyes válasz: B, C, D

21. A lepényleválás jelei közé tartozik:

A. Küstner-jel

B. a méh tarajosodása

C. leválást kísérő vérzés

D. Schultze - jel

Helyes válasz: A, B, C

22. A magzati szív működését a szülésznő/ápoló vizsgálhatja:

A. fetoszkóppal („fafüllel”)

B. CTG-vel

C. Doppler készülékkel

D. ultrahanggal

Helyes válasz: A, B, C

23. Az epidurális érzéstelenítés lehetséges szövődményei:

A. véletlen dura punctio

B. hypotensio

C. infekció

D. epiduralis érsérülés

Helyes válasz: A, B, C, D

24. Az első vizsgálat legfontosabb céljai a várandósgondozás során:

A. a szülés várható idejének meghatározása

B. rizikóbesorolás

C. a szülés módjának megválasztása

D. tanácsadás

Helyes válasz: A, B, D

25. A terhesség biztos jelei közé tartozik:

A. emelkedett β -HCG érték

B. magzati szív működés

C. nemi szervek változásai

D. magzatmozgás észlelhető

Helyes válasz: B, D

26. A várandósgondozás az alábbi személyek együttműködésén alapul:

A. védőnő

B. szülész-nőgyógyász szakorvos

C. várandós nő

D. háziorvos

Helyes válasz: A, B, C, D

27. A terhesség gyanújelei közé tartozik:

A. emelkedett β -HCG érték

B. magzati szív működés

C. hányinger

D. íz érzés megváltozása

Helyes válasz: C, D

28. A magzati szív működés vizsgálata történhet:

A. sztetoszkóppal

B. CTG-vel

C. Doppler készülékkel

D. ultrahanggal

Helyes válasz: B, D

29. A várandósgondozás során kötelező minden alkalommal (megjelenéskor) elvégezni:

A. vizelet fehérje vizsgálata szulfoszalicilsav-val, vagy tesztcsíkkal

B. vérnyomásmérés

C. teljes vizeletvizsgálat laborban

D. méhszáj vizsgálata

Helyes válasz: A, B

30. A terhességi vészes hányás kezelésében/ápolásában fontos:

A. hospitalizáció

B. i.v. folyadék- és elektrolitpótlás

C. antiemetikumok adása

D. szteroid profilaxis

Helyes válasz: A, B, C

31. Spontán vetélés oka lehet:

A. kromoszómarendellenesség

B. alacsony progeszteron szint

C. septum uteri

D. dohányzás

Helyes válasz: A, B, C, D

32. A meddőség oka lehet:

A. PCOS

B. endometriosis

C. pajzsmirigy túlműködése

D. azoospermia

Helyes válasz: A, B, C, D

33. A CTG regisztrátum elemzésekor az alábbi változókat kell figyelembe vennünk:

A. alapfrekvencia

B. alapfrekvencia-variabilitás

C. accelerációk megléte, vagy hiánya

D. decelerációk megléte, vagy hiánya

Helyes válasz: A, B, C, D

34. A prenatális konzultáció célja:

A. csökkenteni a félelmet, szorongást

B. az életminőség javítása a várandósság alatt

C. elkerülni a magzati fejlődési rendellenességeket

D. pszichés támogatás a szülők részére

Helyes válasz: A, B, C, D

35. A vajúdas alatti tápanyagmegvonás következtében fellépő jelenség:

A. ketosis

B. hypoglykaemia

C. éhség és szomjúságérzés

D. gyengeség

Helyes válasz: A, B, C, D

36. Az elhúzódó, aktív vajúdás oka lehet:

A. méhre visszavezethető tényezők (fájásgyengeség)

B. méhnyaki tényezők (rigid méhszáj)

C. érzelmi tényezők (félelem, fájdalom, feszültség)

D. anyai tényezők (dehidráció, EDA)

Helyes válasz: A, B, C, D

37. Intézetén kívüli szülésben segédkező szülésznő számára a szülőnő kórházba szállítása indokolt az alábbi esetekben:

A. nyugtalanító FHR értékek

B. 37. hétnél rövidebb gesztációs idő

C. 42. hétnél hosszabb gesztációs idő

D. jelentős mennyiségű, sötét, sűrű, darabos meconium a magzatvízben

Helyes válasz: A, B, C, D

38. A méhösszehúzódások jellemzői:

A. gyakoriság

B. időtartam

C. intenzitás

D. nyugalmi idő

Helyes válasz: A, B, C, D

39. Az újszülött vizsgálata (anomáliák keresése) kiterjed a születés után:

A. kutacsok, varratok, fej,

B. testsúly, testhossz, fejkörfogat

C. bőrszín, pigmentáció, kiütések

D. száj, szájpád, orr, fül, szem

Helyes válasz: A, B, C, D

40. A gyermekágyi infekció következménye lehet:

A. endometritis

B. peritonitis

C. abscessus

D. láz

Helyes válasz: A, B, C, D

41. Melyik tényező kiemelkedő fontosságú a klimaktérium időszakában?

A. inkontinencia

B. osteoporosis

C. életmód,táplálkozás

D. szexuális élet

Helyes válasz: A, B, C, D

42. A klimaktérium jellemzői lehetnek:

A. vasomotor instabilitás

B. pszichés instabilitás

C. genitáliák atrófiája

D. gyors köröm és hajnövekedés

Helyes válasz: A, B, C

43. A Bishop- érték kiterjed:

A. méhszáj tágasságára

B. nyakcsatorna kifejtettségére

C. koponya helyzetére

D. testhőmérsékletre

Helyes válasz: A, B, C, D

44. A szteroid mellékhatásokhoz tartozik:

A. vércukor emelkedés

B. izomgyengeség

C. hypertonia

D. ulcerogén hatás

Helyes válasz: A, B, C, D

45. Milyen fő tünetek jellemzőek a postmenopausa időszakára?

A. klimaktérium szindróma

B. a nemi szervek atrofiás elváltozásai

C. pszichés zavarok

D. anovulációs ciklusok

Helyes válasz: A, B, C, D

46. A lepény leválási zavarához tartozik:

A. placenta adhaerens

B. placenta accreta

C. placenta increta

D. placenta percreta

Helyes válasz: A, B, C, D

47. Melyek a túlhordás magzati jellemzői?

A. oligohydramnion

B. felázott bőr

C. meconium ürítés

D. polyhidramnion

Helyes válasz: A, B, C

48. Melyek a vállak elakadására hajlamosító tényezők?

A. nagy magzat

B. túlhordás

C. obesitas

D. gestációs diabetes

Helyes válasz: A, B, C, D

49. Teljes személyi fertőtlenítést kell a szülésznőnek végezni:

A. a testfelület váladékkal történt szennyeződése esetén

B. szülésvezetés után

C. a műszak átadása után

D. gyógyszerelés előtt

Helyes válasz: A, B, C

50. A beteg folyadék felvétel/leadás mennyiségét meg kell figyelni a következő esetekben:

A. műtétek után

B. minden intenzív ellátást igénylő állapotokban

C. lázzal, hányással járó állapotokban

D. insomnia esetén

Helyes válasz: A, B, C

51. Szülészeti transzabdominális ultrahangvizsgálattal mérhető magzati mutatók:

A. BPD

B. HC

C. AC

D. FL

Helyes válasz: A, B, C, D

52. Az intubációhoz szükséges eszközök:

A. laryngoscop

B. endotracheális tubus, tubusvezető

C. fecskendő

D. szívókatéter

Helyes válasz: A, B, C, D

53. A szülésfelkészítés elemeihez tartozik:

A. előadások, filmvetítések

B. várandóstorna

C. légző és relaxációs gyakorlatok

D. autogén tréning

Helyes válasz: A, B, C, D

54. Az oxytocin adagolás szövődménye lehet:

A. abruptio placentae

B. tetánia uteri

C. magzati distressz

D. uterus ruptura

Helyes válasz: A, B, C, D

55. Az amnionúrt fertőzését okozhatja:

A. mycoplasma hominis

B. trichomonas vaginális

C. cytomegalovírus

D. streptococcus

Helyes válasz: A, B, C, D

56. Az epidurális analgészia ellenjavallatát képezi:

A. a szülőnő nem egyezik bele

B. lázas állapot

C. hiányos személyi feltételek

D. caries

Helyes válasz: A, B, C

57. A hysteroscopia alkalmas a rendellenes méhvérvzés okának tisztázására az alábbi esetekben:

A. gócos endometrium laesio

B. uterusfejlődési rendellenesség

C. polypus endometrium

D. submucosus myoma

Helyes válasz: A, B, C, D

58. A terhesség műszeres megszakításának esetleges késői szövődményei:

A. asherman szindróma

B. sterilitas

C. a szabályos menstruációs ciklus megváltozása

D. méhszáj elégtelenség

Helyes válasz: A, B, C, D

59. Abruptio placentae lehetőségére a következő kórképek esetén kell gondolni:

A. essentialis hypertonia

B. diabetes mellitus

C. chronicus nephritis

D. preeclampsia

Helyes válasz: A, B, C, D

60. A várandós nő légzését jellemzi:

A. a percenkénti légzésszám csökken

B. a costodiaphragmális légzés helyett a costalis légzés előtérbe kerül

C. a vitálkapacitás csökken

D. a légzési volumen nő

Helyes válasz: B, D

61. Középidős terhességmegszakítás során a méhszáj érlelésére, tágítására használható gyógyszerek, módszerek:

A. extraamniális Rivanol feltöltés

B. intracervicális prostaglandin felhelyezés

C. intramniális PG

D. laminária

Helyes válasz: A, B, C, D

62. Abortus imminensre jellemző:

A. hüvelyi vérzés

B. zárt méhszáj

C. alhasi görcsök

D. peterészek távozása

Helyes válasz: A, B, C

63. Abortus febrilisről beszélünk, ha:

A. vetélés közben lázas szövődmény jelentkezik

B. a vetélés közben lázas állapot, kismencedei gyulladás alakul ki

C. a vetélés közben a fertőzés az ereken keresztül az egész szervezetet érinti

D. a terhesnél korábban lezajlott állapot, később vetéléshez vezet

Helyes válasz: A, B, C

64. IVF kezelés indokolt a következő esetekben:

A. impotencia

B. oligozoospermia

C. endometriosis

D. kétoldali tubaocclusio

Helyes válasz: B, D

65. Az orális hormonális fogamzásgátlók hasznos mellékhatásai:

A. csökkentik a dysmennorrhoeás tüneteket

B. csökkentik a cervixcarcinoma előfordulásának gyakoriságát

C. csökkentik a funkcionális petefészek ciszták előfordulását

D. csökkentik az emlőcarcinoma előfordulásának gyakoriságát

Helyes válasz: A, C

66. Az áttöréses vérzés leggyakoribb okai:

A. tablettaszedési hiba

B. gyógyszer-interakció

C. felszívódási zavar

D. pszichés megterhelés

Helyes válasz: A, B, C, D

67. A terhesség műszeres megszakításának esetleges korai szövődményei:

A. gyulladás

B. a méhfal perforációja

C. peterészek visszamaradása

D. aneszteziológiai szövődmények

Helyes válasz: A, B, C, D

68. Az alábbiak közül mely gyógyszerek adását nem javasoljuk általában a terhesség alatt:

A. cholramphenicol

B. citosztatikumok

C. per os antidiabetikumok

D. ampicillin

Helyes válasz: A, B, C

69. Várandós tanácsadás során, egy 31 hetes várandós vizeletében fehérjét találtak, az alábbiak gyanúja merül fel:

A. húgyúti infekció

B. praeeclampsia

C. hüvelyi folyással való keveredés

D. polycystás vese

Helyes válasz: A, B, C

70. Hogyan ismerhető fel a rejtett terhességi ödéma?

A. a tibia felett benyomjuk a bőrt

B. a bevitt és ürített folyadék mérésével

C. a folyadékterek izotópos meghatározásával

D. a testsúly mérésével

Helyes válasz: B, D

71. Normotenzív krónikus vesebetegek terhessége esetén gyakoribb:

A. praeeclampsia

B. abruptio placentae

C. koraszülés

D. intrauterin retardáció

Helyes válasz: A, B, C, D

72. Mely gyógyszerek alkalmazását kell kerülni asztma esetén?

A. oxytocin

B. ergometrin

C. cephalosporinok

D. prostaglandin F2

Helyes válasz: B, D

73. Mely okok játszhatnak szerepet a fenyegető koraszülés kialakulásában?

A. rossz szociális körülmények

B. erős dohányzás

C. a méh rendellenességei

D. betöltött 40. gestációs hét

Helyes válasz: A, B, C

74. A hysteroscopia szövődmenyei lehetnek:

A. fertőzés

B. méhperforatio

C. vérzés

D. embolia

Helyes válasz: A, B, C, D

75. Melyek lehetnek az anovulatio okai:

A. terhesség

B. pubertás

C. lactacio

D. lázas állapot

Helyes válasz: A, B, C

76. A méhen belüli fogamzásgátló eszköz alkalmazása ellenjavallt:

A. akut kismencedei gyulladás esetén

B. menstruáció esetén

C. szuperosus myoma

D. várandótság esetén

Helyes válasz: A, B, D

77. Medencevégű szülések szövődményei lehetnek:

A. a fej elakadása

B. a karok felcsapódása

C. köldökzsinór kompresszió

D. hányinger, hányás

Helyes válasz: A, B, C

78. A fogamzásgátló módszerekkel kapcsolatos kívánalmak:

A. legyen olcsó

B. legyen megbízható

C. ne legyen illúzióromboló

D. ne legyenek káros mellékhatásai

Helyes válasz: A, B, C, D

79. Az újszülött születési súlya alapján megkülönböztetünk:

A. kis súlyú újszülöttet

- B. igen kis súlyú újszülöttet**
- C. extrém mértékben kis súlyú újszülöttet**
- D. teljes mértékben kissúlyú újszülöttet

Helyes válasz: A, B, C

80. Melyek a menopauzához kapcsolódó tünetek:

- A. vérzészavarok**
- B. hőhullámok**
- C. hüvelyszárasság**
- D. vizelési inger

Helyes válasz: A, B, C

81. A Bethesda rendszer alkalmas:

- A. a vér zsírszintjének kimutatására
- B. a cervix kenetek besorolására**
- C. a vér LDH szintjének meghatározására
- D. a kóros citológiai elváltozások jelzésére**

Helyes válasz: B, D

82. A gestációs diabetes magzati szövődményei:

- A. koraszülés veszélye**
- B. nagyméretű placenta**
- C. macrosomia**
- D. polyhydramnion**

Helyes válasz: A, B, C, D

83. A gyermekágyas időszakra jellemző:

- A. pervolúciós folyamatok

B. involúciós folyamatok

C. deléciós folyamatok

D. evolúciós folyamatok

Helyes válasz: B, D

84. A magzati koponya forgásaihoz tartozik:

A. flexió

B. rotáció

C. deflexió

D. marsupializáció

Helyes válasz: A, B, C

85. A méhen kívüli terhesség következtében fellépő kürtrepedés tünetei:

A. heves éles hasi fájdalom

B. gyorsan kialakuló shockos

C. peritoneális izgalmi jelek

D. vérrel telt Douglas-üreg

Helyes válasz: A, B, C, D

86. A szülés megindulásának jelei:

A. magzatvízfolyás

B. hirsutismus

C. rendszeres 5 perces fájások

D. erythema

Helyes válasz: A, C

87. A szülés utáni első héten történő vérzés okai lehetnek:

A. észrevétlen, nem ellátott seb

- B. uterus atónia**
- C. retenció cotyledonis**
- D. subinvolúció uteri**

Helyes válasz: A, B, C, D

88. A szülésre-felkészítő tanfolyam célja:

- A. terhesség és a szülés pszichológiai támogatása**
- B. információátadás a terhességről**
- C. felkészíteni az anyát és az apát a terhességre**
- D. anya-gyermek -apa kapcsolatot elősegíteni**

Helyes válasz: A, B, C, D

89. Az atonia uteri okai lehetnek:

- A. a méh túlzott kitágulása**
- B. ikerterhesség**
- C. nagy magzat**
- D. polyhydramnion**

Helyes válasz: A, B, C, D

90. Az osteoporosis rizikó tényezőihez tartozik:

- A. a korai petefészek kimerülés**
- B. kétoldali ovariectomia**
- C. mozgásszegény életmód**
- D. gyorsult vérsejtsüllyedés

Helyes válasz: A, B, C

91. Az újszülöttkori szűrővizsgálatokhoz tartozik:

- A. PKU-szűrés**

- B. csípőízület-vizsgálat**
- C. Galactosaemia-szűrés**
- D. Congenitalis hypothyreosis**

Helyes válasz: A, B, C, D

92. Bacterialis vaginosis fertőzésre jellemző:

- A. híg, szürkésfehér, halszagú folyás**
- B. erythema
- C. clue sejtek a kenetben**
- D. sárgászöld folyás

Helyes válasz: A, C

93. Császármetszést követően milyen tünetek észlelésekor kell számítanunk ileus kialakulására?

- A. erős haspuffadás**
- B. bélgázok távozásának hiánya**
- C. székürítést nem eredményező bélgörcsök**
- D. hányinger, hányás**

Helyes válasz: A, B, C, D

94. Hogyan történik a mastitis puerperalis kezelése?

- A. pangó tej eltávolítása fejéssel**
- B. antibiotikum adása orvos rendelése szerint**
- C. borogatás, jégelés**
- D. abscessus esetén incisio**

Helyes válasz: A, B, C, D

95. Intrauterin infekció kialakulásának megelőzése:

- A. hüvelyi vizsgálat számának csökkentése**

- B. gyakori pozícióváltás
- C. hőmérséklet, pulzus rendszeres megfigyelése**
- D. derékmasszázs

Helyes válasz: A, C

96. Lehetséges klinikai elváltozások szövődményes ovulációindukció során:

- A. ascites**
- B. hydrothorax**
- C. thromboembolia**
- D. akut veseelégtelenség**

Helyes válasz: A, B, C, D

97. Melyek az ápolási teendők terhességi hypertonia esetén?

- A. a vérnyomás, a proteinuria, az oedema jeleinek szoros megfigyelése**
- B. a magzati szívhangok megfigyelése**
- C. a fenyegető eclampsia jeleinek megfigyelése**
- D. fehérjedús, sószegény étrend**

Helyes válasz: A, B, C, D

98. Melyek az oxytocinos infúzió adásának ellenjavallatai az alábbiak közül?

- A. korai lepényleválás**
- B. placenta praevia**
- C. haránt és ferde fekvés**
- D. téraránytalanság**

Helyes válasz: A, B, C, D

99. Melyik tényezőre kell rákérdezni a szülés előtt?

- A. művi vetélések száma, időpontja, lefolyása**

- B. spontán vetélések száma, időpontja, lefolyása**
- C. koraszülések száma, időpontja, lefolyása, a koraszülött adatai**
- D. szülések száma időpontja, lefolyása, (az újszülöttre és a gyermekágyra vonatkozó adatok)**

Helyes válasz: A, B, C, D

100. Melyek lehetnek a méhen kívüli terhesség jelei?

- A. pozitív menoteszt**
- B. kávéaljszerű vérzés**
- C. alhasi fájdalom**
- D. gyakori vizeelési inger

Helyes válasz: A, B, C

101. Mi jellemzi a chronikus hypertoniát?

- A. a terhesség előtti magas vérnyomás**
- B. ráakódásos préeklampsia kialakulása**
- C. a szülés után is fennálló magasvérnyomás**
- D. gyakoribb koraszülés**

Helyes válasz: A, B, C, D

102. Mi a jelentősége a Trichomonas vaginalis fertőzésnek?

- A. krónikus gyulladást okoz**
- B. diszpláziát okoz
- C. hüvelyi folyást okozhat**
- D. a méhnyakrák kialakulásának oki tényezője

Helyes válasz: A, C

103. Mi jellemző az üszögterhességre?

- A. a méh nagysága nagyobb a számítotttnál**

B. vérezgetés jelentkezik

C. a terhességi reakció sokszoros hígításban is pozitív

D. hamar ad távoli metasztázist

Helyes válasz: A, B, C

104. Mi lehet a női meddőség oka?

A. ovuláció hiánya

B. genitális tuberculosis

C. kürtök elzáródása

D. pszichés ok

Helyes válasz: A, B, C, D

105. Milyen esetben lassabb a méh visszafejlődése gyermekágyban?

A. nagy magzat szülése után

B. ikerszülés után

C. polyhydramnion után

D. méhizomdaganat esetén

Helyes válasz: A, B, C, D

106. Subdurális haematománál:

A. kutacs elődomborodik

B. suturák szétnyílnak

C. vénák teltek, keringési zavar

D. szoporózus állapot

Helyes válasz: A, B, C, D

107. Teendő:súlyos magzati bradycardiánál (40/sec):

A. azonnali hüvelyi vizsgálat

B. ha köldökzsínór előesés van, akkor térd-könyök helyzet biztosítása

C. orvost azonnal értesíteni

D. azonnali császármetszés feltételeit biztosítani

Helyes válasz: A, B, C, D

108. Válassza ki a caput succedaneum jellemzőit!

A. csonthatárokat megtartja

B. néhány nap alatt felszívódik

C. szülés során a magzati fejbőr alatt keletkező vizenyős duzzanat

D. hiperbilirubinaemia kezelést igényel

Helyes válasz: B, C

109. Válassza ki a gestációs diabetes kockázati tényezőit!

A. obesitas

B. családi halmozódás

C. korábban 4000g-nál nagyobb gyermeket szült

D. essentialis hypertonia

Helyes válasz: A, B, C, D

110. Válassza ki az idő előtti burokpedés szövődményét:

A. felszálló méhúri fertőzés

B. koraszülés

C. korai lepényleválás

D. köldökzsínór vagy aprórész előesés

Helyes válasz: A, B, C, D

111. Melyek a citosztatikus kezelés mellékhatásai?

A. hányinger, hányás

B. székrekedés

C. csontvelő károsodás

D. megnövekedett étvágy

Helyes válasz: A, C

112. Melyek az intrauterin fertőzések leggyakoribb kórokozói?

A. Parvovírus

B. Toxoplasma

C. HIV

D. Cytomegalovírus

Helyes válasz: B, D

113. Szülési sérülés lehet:

A. cephalhaematoma

B. asphyxia

C. plexus brachialis sérülés

D. polycythaemia

Helyes válasz: A, C

114. Fenyegető eclampsia jelei

A. láz

B. szikralátás

C. fokozott reflex-ingerlékenység

D. fejfájás

Helyes válasz: B, C, D

115. Melyek lehetnek a méhen kívüli terhesség jelei?

A. pozitív menoteszt

B. kávéaljszerű vérzés

C. alhasi fájdalom

D. gyakori vizeelési inger

Helyes válasz: A, B, C

116. Mi jellemzi a chronikus hypertoniát?

A. a terhesség előtti magas vérnyomás

B. ráakódásos praeklampsia kialakulása

C. a szülés után is fennálló magasvérnyomás

D. gyakoribb koraszülés

Helyes válasz: A, B, C, D

117. Válassza ki az anyai halálozás leggyakoribb okait:

A. diabetes mellitus

B. magas vérnyomást kísérő szövődmények

C. szeptikus anyai állapot

D. elvérzés

Helyes válasz: B, C, D

118. Baby-blus jellemzői:

A. napokig, órákig tartó hangulatingadozás

B. feszültség

C. a gyermekágyas nő érzelm világát ellentétes érzések jellemzik

D. nyugtalanság

Helyes válasz: A, B, D

119. A perinatalis magzati halálozás leggyakoribb okai:

A. koraszülés

B. fejlődési rendellenesség

C. az anya diabetes mellitusa

D. magzati hipooxia

Helyes válasz: A, B, D

120. Atoniás vérzés esetén a szülésznő elsődleges teendői közé tartozik:

A. az uterus masszírozása

B. a húgyhólyag kiürítése

C. orvos értesítése

D. előkészítés transzfúzióhoz

Helyes válasz: A, B, C

121. A szülőnő észlelése során alapvető szülésznői feladat:

A. a kontrakciók gyakoriságának, intenzitásának, időtartamának megfigyelése

B. a méhszáj vizsgálata

C. az előlfekvő rész helyzetének megítélése

D. a magzati szívhangok ellenőrzése

Helyes válasz: A, B, C, D

122. Jelölje meg, hogy milyen gyógyszereket adunk a bakteriális kezelésére:

A. metrodinazol

B. fluconasol

C. clindamycin

D. mindegyiket

Helyes válasz: A, C

123. A hormonális fogamzásgátlás az alábbi módon fejti a ki a hatását, jelölje meg azokat az állításokat, melyek igazak:

A. GnRH felszabadulást gátolja, FSH és LH nem szabadul fel, az ovuláció elmarad

B. Cervicalis nyák megváltozik

C. Endometriumot alkalmatlanná teszi a beágyazódásra

D. Tuba motilitását csökkenti

Helyes válasz: A, B, C, D

124. A menstruációs ciklus proliferációs szakát az alábbiak jellemzik:

A. vastagodó méhnyálkahártya

B. a mirigyek proliferációja

C. kanyargós mirigyek

D. a stroma predeciduális átalakulása

Helyes válasz: A, B, C

125. A menstruációs ciklus szekréciós szakát az alábbiak jellemzik:

A. az endometrium vékony

B. a stroma bő és laza szerkezetű

C. a mirigyekben szekrétum jelenik meg

D. predeciduális átalakulás

Helyes válasz: A, B, C, D

126. Jelölje meg, hogy mely szereket alkalmazzuk a PCO-szindróma kezelésére:

A. metformin

B. inozitol

C. D-vitamin

D. diltiazem

Helyes válasz: A, B, C

127. Válassza ki, hogy mely tünetek, illetve elváltozások jelzik a súlyos praeeclampsziát!

A. 100000/μl alatti thrombocytaszám

B. oliguria

C. 140/90-160/110 Hgmm közötti vérnyomás

D. perzisztáló fejfájás

Helyes válasz: A, B, D

128. Terhességben akut vérnyomáscsökkentésre az alábbi gyógyszerek használhatók:

A. methyldopa

B. nifedipin

C. metoprolol

D. urapidil

Helyes válasz: B, D

129. Leiomyosarcomát az alábbiak közül melyik elváltozás jellemzi?

A. gyors növekedés

B. LFH izoenzim 3 szint növekedése

C. mindig solitaer

D. MR vizsgálattal heterogén szöveti képet mutat és szabálytalan a kontúrja

Helyes válasz: A, B, C, D

130. A méhen kívüli terhesség műtéti megoldása során az alábbi beavatkozásokat végezhetjük:

A. salpingectomy

B. salpingotomia

C. fimbriális expressio

D. vaporisatio

Helyes válasz: A, C

131. Válassza ki, hogy mikor kötelező az episiotomia elvégzése!

A. medencevégű fekvés esetén

B. koraszülés esetén

C. nagy magzat esetén

A. elhúzódtó kitolási szak esetén

Helyes válasz: A, B, C, D

132. Válassza ki mikor kötelező a gátmetszés!

A. vacuum extractio során

B. kitolási szakban jelentkező magzati hipoxia jelei esetén

C. elhúzódtó kitolási szakban

D. medencevégű fekvés esetén csak akkor, ha koraszülés áll fenn

Helyes válasz: A, B, C

133. Válassza ki a tokolítikumként is használatos gyógyszereket:

A. nifedipin

B. labetalol

C. atosiban

D. metoprolol

Helyes válasz: A, C

134. Jelölje meg a várandósság alatti kötelező szűrővizsgálatokat!

A. toxoplasma ellenanyag szűrés

B. HBsAg szűrés

C. lues szűrés

D. CMV ellenanyag szűrés

Helyes válasz: B, C

135. Válassza ki, hogy mi jellemző hyperemesis gravidarumra!

A. testsúly csökkenése

B. a szérum májenzim értékeinek emelkedése

C. kiszáradás

D. hemokoncentráció

Helyes válasz: A, B, C, D

136. Jelölje meg, hogy mely tünetek igazak mola hydatidosa esetén!

A. alhasi görcsös fájdalom

B. praeclampsiaával társulhat

C. gyakran fordul elő hyperemesis

D. lázas állapot

Helyes válasz: A, B, C

137. Mely tényezők okozhatnak magzati tachycardiát?

A. chorioamnionitis

B. magzati anaemia

C. az anya lázas állapota

D. magzati hypoxia

Helyes válasz: A, B, C, D

138. Jelölje meg a terhességmegszakítás szövődményeit!

A. uterus perforatio

B. endometritis

C. Ashermann-syndroma

D. vérzés

Helyes válasz: A, B, C, D

139. Válassza ki a polyhydramnion potenciális szövődményeit!

- A. köldökzsinór előesése**
- B. beilleszkedési rendellenesség**
- C. aprórészek előesése**
- D. fájásgyengeség**

Helyes válasz: A, B, C, D

140. Rh negatív vércsoportú várandós szenzibilizációja az alábbi esetek közül, melyekben jöhet létre?

- A. terhességmegszakítás során**
- B. genetikai amniocentesis során**
- C. fetomaternalis transzfúzió során**
- D. terhesség alatti vérzés esetén**

Helyes válasz: A, B, C, D

141. Válassza ki, hogy mely eljárások alkalmazhatók anyai Rh izoimmunizáció során a magzati anaemia kezelésére!

- A. a magzat hasüregében vörösvértest koncentrátumot juttatunk**
- B. a magzat mellkasába vörösvértest koncentrátumot juttatunk
- C. köldökzsinór transzfúziót végzünk**
- D. a magzatvízbe vörösvértest koncentrátumot juttatunk

Helyes válasz: A, C

142. Súlyos oligohydramnion következménye lehet:

- A. bronchopulmonalis hypoplasia
- B. bronchopulmonalis hyperplasia
- C. magzati kényszertartás**
- D. bronchopulmonalis dysplasia**

Helyes válasz: C, D

143. Milyen tapintási tünet észlelhető méhen kívüli terhesség esetén?

- A. ledomborított, fájdalmas Douglas-üreg**
- B. fájdalmas adnexképlet**

C. a spatium rectovaginaleban kemény tapintató rezisztencia

D. az uterus fundusán érzékeny tömött tapintató képlet

Helyes válasz: A, B

144. Válassza ki, hogy praeeclampsziában az alábbiak közül mikor indokolt a terhesség lezárása.

A. terápiarezisztens hypertónia

B. 50000/μl alatti thrombocytaszám

C. perzisztáló fejfájás

D. fekvés utáni oedema

Helyes válasz: A, B, C

145. Válassza ki azokat az állításokat és tüneteket melyek Down-syndromára jellemzőek!

A. a tenyéren négyujjas harántredő (majombarázda)

B. ferde (mongoloid) szemrések

C. gyakori omphalokele

D. mélyen ülő fülkagyló

Helyes válasz: A, B, D

146. Válassza ki azokat az állításokat melyek igazak!

A. gastroschisis esetén a az elülső hasfal veleszületett hiányáról van szó, a

köldökgyűrű mellett a belek előtüremkednek. A beleket nem borítja amnioperitoneális hártya.

B. gastroschisis esetén az elülső hasfal veleszületett hiányáról van szó, a köldökgyűrű mellett a belek előtüremkednek. A beleket amnioperitoneális hártya borítja

C. omphalokele a köldökgyűrűn keresztül herniálódott hasúri zsigereket tartalmazza, melyeket amnioperitoneális hártya borít

D. omphalokele a köldökgyűrűn keresztül herniálódott hasúri zsigereket tartalmazza, melyeket nem borít amnioperitoneális hártya

Helyes válasz: A, C

147. Válassza ki a diabetes gestationis kockázati tényezőit!

A. elsőfokú rokonságban diabetes mellitus fordul elő

B. 35 év feletti életkor

C. obesitas

D. chronicus hypertonia

Helyes válasz: A, B, C, D

148. Válassza ki a HELLP-syndromára jellemző tüneteket és laboratóriumi eltéréseket!

A. jobb bordaív alatti fájdalom

B. magas szérum SGOT szint

C. emelkedett szérum ALP szint

D. csökkent szérum haptoglobinszint

Helyes válasz: A, B, D

149. Válassza ki az eclampsiára jellemző tüneteket!

A. eszméletvesztéssel járó tónusos-klónusos görcsroham jellemzi

- B. a szabad légutak biztosítása és a nyelv védelme céljából Mayo-tubust kell a szájba helyezni**
- C. eclamsziás roham alatt agyvérzés léphet fel**
- D. gyakran HELLP-syndroma kíséri**

Helyes válasz: A, B, C, D

150. Válassza ki a tartási rendellenességekre jellemző helyes állításokat!

- A. fejtetőtartás esetén a kopony nem végzi el az első forgást**
- B. arctartásról beszélünk, ha a koponya a medencebemenetben teljes deflexióban észlelhető**
- C. homloktartás esetén a koponya frontosuboccipitalis átmérőben nyúlik meg**
- D. arctartásban levő magzat szüléskor vezérpont az orrgyök, vezérvonal az arcél

Helyes válasz: A, B

151. A gyógyítás színtereit a következő közegek adják:

- A. Populáris szektor**
- B. Hagyományos szektor**
- C. Professzionális szektor**
- D. Humorális szektor

Helyes válasz: A, B, C

152. A biomedikális modell...

- A. a gyógyítás során holisztikus szemléletmódot alkalmaz
- B. a gyógyítás során a modern tudomány eredményeit és eszközeit alkalmazza**
- C. az emberi testet szervei és funkciói összességeként észleli**
- D. elsősorban a betegségre koncentrál, nem a betegre**

Helyes válasz: B, C, D

153. Az alábbi jelenségek közül melyek vezettek a betegség biomedikális modelljének meggyengüléséhez?

- A. Az egészségügyi szakemberek növekvő kiégése.
- B. A társadalom egyre sokszínűbbé válik, új betegcsoportok jelennek meg.**
- C. Az egészséggel és betegségekkel kapcsolatos tudás könnyebben elérhető a laikusok számára is.**
- D. A medikalizáció háttérbe szorulása

Helyes válasz: B, C

154. A bioetika olyan tudomány, amely:

- A. az alkalmazott normatív etika egyik ága**
- B. metafizikai és ismeretelméleti kérdésekkel foglalkozik
- C. a modern orvosbiológia által felvetett erkölcsi kérdések szisztematikus filozófiai vizsgálatával foglalkozik**
- D. interdiszciplináris**

Helyes válasz: A, C, D

155. Az autonóm döntéshez egyszerre szükséges az autonóm ____ jelenléte.

- A. tisztánlátás
- B. gondolkodás**
- C. akarat**
- D. cselekvés**

Helyes válasz: B, C, D

156. Az abortuszvitában a konzervatív csoport képviselői szerint ____

- A. a megtermékenyített petesejt még nem személy
- B. az újszülött már személy**

- C. a fogamzás és a születés között lehetetlen olyan nem önkényes határvonalat húzni, amely előtt a fejlődő lény még nem személy, de amely után már személy**
D. a megtermékenyített petesejt már személy

Helyes válasz: B, C, D

157. A Homo Symbolicus koncepciója egy olyan modell:

- A. amely képes értelemteni módon megjeleníteni az ember kultúrába ágyazottságát**
B. amely próbál válaszolni az ember többi fajtól való elkülönződésének problémájára
C. amely középpontba állítja a főemlősökhöz való hasonlatosságainkat
D. amely a 19. századi antropológia központi elmélete volt

Helyes válasz: A, B

158. A tudományra jellemző:

- A. holisztikus
B. reduktív
C. zárt rendszer
D. racionális

Helyes válasz: B, D

159. A kultúrák összehasonlítása:

- A. általános értelemben elméletileg és gyakorlatilag is lehetetlen**
B. hasznos feladat
C. a modern antropológia legnépszerűbb feladata
D. szükségtelen feladat

Helyes válasz: A, D

160. Ki állapíthatja meg a halál beálltát?

- A. ápoló
B. mentőtiszt

C. szülésznő

D. orvos

Helyes válasz: B, D

161. Kik jogképesek az alábbiak közül?

A. 12 éves gyermek

B. 17 éves nő, magyar férfi

C. 19 éves amerikai állampolgár

D. 26 éves kómában fekvő beteg

Helyes válasz: A, B, C, D

162. Kik cselekvőképesek az alábbiak közül?

A. a 35 éves vak

B. a 22 éves írástudatlan

C. a 42 éves kómában fekvő beteg

D. a 16 éves fogvatartott

Helyes válasz: A, B

163. Mely szempontok részei a SWOT analízisnek?

A. lehetőségek

B. jellegzetességek

C. veszélyek

D. kudarcok

Helyes válasz: A, C

164. Milyen gazdasági hatásai vannak az egészségnek az egyénre nézve?

A. hatással van a munkavállaló egyén munkaerő-piaci részvételére

B. hatással van az egyén nyugdíjazásának idejére

C. hatása jó közérzet biztosít

D. hatása van az egyén fizikai környezetére

Helyes válasz: A, B

165. Az alábbiak közül melyek tartoznak az egészségügyi szükséglet általános jellemzői közé?

A. a szükséglet nem objektív, hanem kultúrafüggő

B. pénzben könnyen kifejezhető

C. nem ismerhető meg pontosan

D. napi problémaként nem a szükséglet jelentkezik

Helyes válasz: A, C, D

166. Melyek jellemzőek a költség-haszon elemzésre?

A. az összehasonlítható eljárások hozamának és költségének különbségét mutatja

B. pénzben fejezi ki az értéket

C. az egészségügy területén ez egy hasztalan eljárás

D. kvalitatív elemzés

Helyes válasz: A, B

167. Mely területeken alkalmazzák az egészség-gazdaságtani elemzéseket?

A. a gazdasági szempontból a legjobb egészségügyi technológiák kiválasztásánál

B. az egészségügyi technológiák árának kialakítására

C. a korlátozottan rendelkezésre álló egészségügyi költségvetés elosztására

D. a támogatási (finanszírozás/biztosítás) arányok megállapítására

Helyes válasz: A, B, C, D

168. A kiszáradás tünetei lehetnek:

A. nyelve száraz, lepedékes

B. kutacsa süppedt

C. vizelete kevés, majd nincs

D. pulzusa szapora

Helyes válasz: A, B, C, D

169. Gyermek gyógyszerelésének szabályai:

- A. a gyermek életkorának megfelelően választjuk meg a gyógyszerformát**
- B. minden új gyógyszer beadása után szorosan obszerváljuk a gyermeket**
- C. mindig meggyőződünk róla, hogy a gyermek lenyelte a gyógyszert**
- D. a porított gyógyszereket 2 dl édes folyadékba keverjük

Helyes válasz: A, B, C

170. Az anyagcsereszűrésre jellemző:

- A. a szülészeti osztályokon a 48. és 72. életóra között kell elvégezni.**
- B. a 32. gesztációs hét előtt született babáknál, a vizsgálatot 2 napos, valamint 2 hetes korban meg kell ismételni.
- C. ha a vérvétel időpontjáig az újszülött nem fogyasztott min. 60 ml anyatejet vagy ha a korai hazabocsátás miatt a vérvétel 48 órás életkor előtt történt, a vizsgálatot 5-7 napos életkor között meg kell ismételni.**
- D. ha az újszülöttnél 48 órás életkora előtt parenterális táplálás alkalmazására kerül sor, a vérmintát az első enterális táplálás után kell levenni

Helyes válasz: A, C,

171. Az érett újszülött jellemzői:

- A. súlya: 2800- 4000gramm**
- B. átlagos hossz: 48- 54 cm**
- C. fej körfogat: 32,5- 36,5 cm**
- D. az újszülött feje a testéhez viszonyítva 1/3-a

Helyes válasz: A, B, C,

172. Szoptatási nehézség lehet az újszülött részéről:

- A. szájpadhasadék**
- B. galactosemia**
- C. agyvérzés**

D. icterus

Helyes válasz: A, B, C, D

173. Koraszülött ápolására jellemző:

- A. minimal-handling elv**
- B. pozitív ingerek**
- C. nyugodt környezet biztosítása**
- D. kenguru módszer alkalmazása második naptól

Helyes válasz: A, B, C

174. A koraszülött táplálására jellemző:

- A. Az anyatejjel táplált koraszülöttek túlélési aránya akkora, mint a tápszerrel táplált gyermekeké.
- B. A táplálás során biztosítani kell a megfelelő tápanyagbevitelt a makronutriensek és mikronutriensek adását egyaránt.**
- C. A koraszülött energia és tápanyag igénye arányosan kevesebb az érett újszülöttekénél.
- D. A koraszülött táplálás alapelve, hogy a bevitt tápérték és az energia bevitel biztosítsa azt az igényt, ami az azonos korú intrauterin fejlődéshez szükséges.**

Helyes válasz: B, D

175. A koraszülött bőrápolására jellemző:

- A. A koraszülött fürdetése testhőmérsékletű steril vízzel átitatott pamut törülkövel óvatosan ajánlott.**
- B. A fürdetést minden nap el kell végezni, a fertőzések elkerülése érdekében.
- C. Ragasztókat ne használjunk, ha mégis szükséges, azt 24 órán belül távolítsuk el, gondos feláztatás után.**
- D. Pelenkacsere naponta kétszer, popsi kendők alkalmazás nem ajánlott.

Helyes válasz: A, C

176. Gyermekeknél asthma esetén ápolási feladat:

- A. a légút átjárhatóságának biztosítása**
- B. folyadékszükséglet kielégítése**

C. inhalációs gyógyszerelés

D. hideg párasítás

Helyes válasz: A, B, C

177. Gyermekkorú hasfájás esetén meg kell figyelni:

A. haspuffadást

B. táplálást

C. súlygyarapodást

D. folyadék bevitelt

Helyes válasz: A, B, C

178. A hemokultúra mintavételre igaz:

A. a mintavételt az anaerob palackba kell kezdeni

B. a mintát hidegrázás alatt vagy a lázmenet kezdetén vegyük le

C. ha nem tudjuk a mintát 1 órán belül eljuttatni a laborba, akkor hűtőben 5 °C alatt kell tárolni

D. kanül infekció gyanú esetén a kanülből is és egy ép perifériás vénából is le kell venni

Helyes válasz: B, D

179. A jellemző törési helyek postmenopauzás osteoporosis következtében:

A. alkar

B. borda

C. csigolya

D. medence

Helyes válasz: A, B, C

180. A zárt rendszerű gyógyszerátviteli eszközök:

A az onkológia és az onkohematológia területein hatékonyan alkalmazhatóak

B. használatuk mellett a szennyezettség mértéke igazolhatóan jóval elmarad az ilyen rendszereket még nem használókétól

C. a toxikus készítmények ártalmainak kitett szakdolgozók körében csökkentik a kontaminációk lehetőségét

D. részei: protektor, injektor, adapter

Helyes válasz: A, B, C, D

181. A tünetes HIV pozitívítás szakaszában lévő beteg produkálhatja a következő tüneteket:

A. elhúzódó nyirokcsomó duzzanat

B. kaposi-szarkóma

C. gyorsan szaporodó vírusos szemölcsök

D. pneumocystis carinii pneumonia

Helyes válasz: A, C

182. Az újabb típusú Dcont vércukormérő eszközök jellemzői:

A a készüléket nem kell kódolni, univerzális kóddal rendelkezik

B. működési hőmérsékleti tartománya egyedülállóan széles 8-44C°

C. csíkkidobó funkcióval rendelkezik

D. a méréshez csupán 0,6 µl vérmennyiségre van szükség

Helyes válasz: A, B, C, D

183. Mastectomia műtét utáni ápolási teendők a következők:

A. érintett oldali kar pozicionálása

B. vérzés irányába szoros megfigyelés

C. korai karmozgatás, tornáztatás

D. pszichés támogatás

Helyes válasz: A, B, C, D

184. A tervezett műtét mely esetben nem végezhető el általános anesztéziában?

A. herpes megjelenése esetén

B. lázas állapot esetén

C. anaemia esetén

D. emelkedett vércukorszint esetén

Helyes válasz: A, B, C, D

185. Pulzusszámolás közben megfigyeljük:

A. a pulzus számát

B. a pulzus ritmusát

C. a pulzus teltségét

D. a diastolés vérnyomást

Helyes válasz: A, B, C

186. Az ABCDE vizsgálat „D” pontjánál ellenőrizzük:

A. a beteg vércukor-szintjét

B. a légzésszámát

C. a reflexek kiválthatóságát, kóros reflexeket

D. az ödéma elhelyezkedését

Helyes válasz: A, C

187. A kanülök bemosása indokolt:

A. vérvétel előtt

B. infúziós terápia előtt

C. gyógyszer beadások között

D. gyógyszer beadás előtt

Helyes válasz: A, B, C, D

188. Melyik tünet nem a szteroid-terápia mellékhatása?

A. Hypotonia

B. Cushingoid jellegű elhízás

C. Hypertonia

D. Osteoporosis

E. Az acrák megnagyobbodása

Helyes válasz: A, E

189. Melyik állítás helyes az alább felsoroltak közül terápiás indexről?

A. minél nagyobb, annál biztonságosabb gyógyszer

B. minél kisebb, annál biztonságosabb a gyógyszer

C. minél nagyobb annál nagyobb körültekintést igényel a használata

D. minél kisebb, annál nagyobb körültekintést igényel a használata

Helyes válasz: A, D

190. Melyik állítás nem igaz az alábbiak közül? A botulinum A toxin terápiás lehetőségei:

A. gépi lélegeztetés elősegítése

B. az egyik nyakizom görcse miatti ferde nyak kezelése (torticollis)

C. stroke-ot követő felső végtagi spazmusok kezelése

D. ráncok feltöltése (kozmetika)

Helyes válasz: B, C, D

191. Az alábbiak közül melyik állítás helytelen:

A. vastagbélrák szűrése populációs szinten 50 év felett javasolt

B. vastagbélrák szűrése ultrahang vizsgálattal történik

C. vastagbélrák szűrése történhet röntgen vizsgálattal

D. vastagbélrák szűrése történhet endoszkópos vizsgálattal

E. vastagbélrák szűrése széklet vér vizsgálattal történik

Helyes válasz: B, C

192. Az alábbiak közül melyik állítás helytelen:

A. méhnyakrák szűrése populációs szinten 25 és 65 éves korú nők között zajlik

B. méhnyakrák szűrése populációs szinten 45 és 65 éves korú nők között zajlik

C. méhnyakrák szűrése populációs szinten 10 évente szükséges

D. méhnyakrák halálozás a megelőzhető halálozás kategóriájába tartozik

Helyes válasz: B, C

193. Az alábbiak közül válassza ki a helytelen állítást:

A. az anya dohányzása befolyásolja a legkevésbé a gyermek dohányzási szokásait

B. a nőknél emelkedő jellegű a dohányzási tendencia

C. Magyarországon a lakosság 30-35 %-a dohányzik

D. a passzív dohányzás nem fokozza a tüdőrák veszélyét

Helyes válasz: A, D

194. Az alábbiak közül melyik állítás helyes:

A. tüdőszűrés segítségével csökkenthető a tüdőrák halálozás

B. méhnyakrák halálozás csökkenthető a HPV oltás tömeges alkalmazásával

C. tüdőrák halálozás csökkenthető a dohányzás csökkentésével

D. emlőkarcinóma halálozása csökkenthető az emlőszűrés alkalmazásával

Helyes válasz: B, C, D

195. A Hill féle kritériumok között nem szerepelnek:

A. konzisztencia

B. koherencia

C. időbeni összefüggés

D. egyidejűség

E. kovalencia

Helyes válasz: D, E

196. Az eset-kontroll vizsgálatra igaz:

A. ritka betegségek rizikófaktorainak vizsgálatában ideális

B. kohorsz vizsgálat előkészítésében ideális

C. pontos képet ad a betegség társadalmi jelenlétéről

D. nem mutat időbeli összefüggést

Helyes válasz: A, B

197. Glaukóma tünetei közé tartozik:

A. fejfájás

B. a szem érzettsége

C. látás csökkenés

D. száraz szem

Helyes válasz: A, B, C

198. Pneumoniára az alábbiak jellemzőek:

A. lassú kezdet

B. magas láz

C. erős hasi fájdalom

D. hallgatózással crepitatio

Helyes válasz: B, D

199. A GERD kezelésébe beletartozik:

A. esti bőséges vacsora

B. gyomornyálkahártya bevonó szerek

C. protonpumpa gátlók

D. műtét

Helyes válasz: B, C

200. A nyelőcső gyulladásának oka lehet:

A. reflux

B. besugárzás

C. fertőzés

D. gyakori étkezés

Helyes válasz: A, B, C

201. A gyomorrák kockázati tényezői közé tartozik:

A. helicobacter pylori

B. dohányzás

C. diéta

D. vashiányos vérszegénység

Helyes válasz: A, B, C

202. Az irritábilis bélszindróma diétájába nem javasolható:

A. energiaszegény diéta

B. zsírszegény diéta

C. durva rostokban gazdag diéta

D. gyakori kis étkezések

Helyes válasz: A, C

203. Melyik állítás nem igaz?

A. a gyomorfal izomrétegét elérő rák esetén vagotomia és rezekció között kell választani

B. intestinális típusú rákban mindig teljes gyomor eltávolítást kell végezni

C. diffúz típusú rák egyes, ritka és meghatározott eseteiben szubtotalis gastrectomia is megengedett

D. tumoros pylorus szűkület esetén minden esetben endoszkópos tágítás indokolt

Helyes válasz: A, B, D

204. Vékonybél Crohn betegségben a műtét abszolút indokolt, kivéve:

A. krónikus bélelzáródás

B. konglomeratum tumor

C. véres hasmenés

D. belső sipoly (bél-hólyag)

E. malabsorptio

Helyes válasz: C, E

205. Melyik állítás igaz a vékonybél daganatokra vonatkozóan?

A. szövődmenyük is tünetszegény

B. jejunumban gyakoribbak, mint az ileumban

C. a jóindulatúak nemcsak ileust, hanem masszív vérzést is okozhatnak

D. a jóindulatúakból sohasem lesz rosszindulatú

E. van hormont termelő típus is

Helyes válasz: C, E

206. A vastagbél diverticulosis jellemzői, kivéve:

A. a veleszületett valódi diverticulum ritka

B. a szerzett, áldiverticulum (csak a nyálkahártya türemkedik ki a bélfalban) gyakori.

C. sovány, hasmenéses emberek betegsége.

D. általában többszörös

E. okozhat véres székletet

Helyes válasz: C, E

207. Válassza ki a helyes állításokat:

A. Hepatitis B ellen létezik hatékony oltás

B. Hepatitis B a beteg székletével terjed

C. Hepatitis B krónikus formája cirrózist és májrákot okozhat

D. Hepatitis B kórokozója baktérium

Helyes válasz: A, C

208. Mely képlet tartozik az uterusához?

A. ampulla tubae

B. fundus uteri

C. isthmus tubae

D. isthmus uteri

Helyes válasz: B, D

209. Mely képlet nem tartozik az uterusához?

A. isthmus uteri

B. tuba uterina

C. fundus uteri

D. pars uterina

Helyes válasz: B, D

210. Hol fordul elő a szervezetben merocrin mirigy?

A. pancreas

B. illatmirigyek

C. parotis

D. prostata

Helyes válasz: A, C

211. Mely képletek tartoznak a sinus renalishez?

A. pyelon

B. tubulus contortus proximalis

C. zsírszövet

D. tubulus rectus

Helyes válasz: A, C

212. Mely képlet tartozik a vese tokjaihoz?

A. tunica serosa

B. tunica fibrosa

C. Bowmann-tok

D. capsula adiposa

Helyes válasz: B, D

213. Mely szájadékok tartoznak a tuba uterinához?

A. ostium abdominale tubae

B. ostium iliocoecale

C. ostium uterinum tubae

D. ostium aortae

Helyes válasz: A, C

214. Mely szájadék tartozik az uterusához?

A. ostium aortae

B. orificium externum uteri

C. ostium trunci pulmonalis

D. orificium internum uteri

Helyes válasz: B, D

215. Mi történik az adrenalin hatására:

A. nő a pulzusszám

B. emelkedik a vércukorszint

C. érszűkület jön létre a bőrben

D. fokozódik a gyomorsav termelés

Helyes válasz: A, B, C

216. Melyik a paraszimpatikus idegrendszer hatása:

A. a gyomor fősejtjeiben csökken a pepszinogén szekréció

- B. a m.sphincter pupillae összehúzódik
- C. a sinus csomóban negatív chronotóp hatás érvényesül**
- D. fokozódik a nyálszekréció**

Helyes válasz: B, C, D

217. Melyik jellemző a nem specifikus immunválaszra:

- A. sejtes elemei fagociták**
- B. humorális tényezői a komplementek**
- C. humorális tényezője a γ -interferon
- D. azonnal működésbe lép**

Helyes válasz: A, B, D

218. Mi jellemző az antitestekre (immunglobulinokra)?

- A. B limfociták (plazmasejtek) termelik**
- B. antigénnel való specifikus kötődésük aktiválja az immunsejtek működését**
- C. az antigén hatására 1-2 hét alatt jelennek meg**
- D. T helper limfociták termelik

Helyes válasz: A, B, C

219. Mi történik belégzés során?

- A. negatív mellkasi nyomás alakul ki**
- B. A rekeszizom lesüllyed**
- C. Az intrapleurális tér nyomása negatívvá válik**
- D. A belső bordaközi izmok összehúzódnak
- E. A sternum és a bordák előre és kifelé mozdulnak**

Helyes válasz: A, B, C, E

220. Mi igaz a jobbszívfél-elégtelenségben szenvedő betegre?

- A. megnő a nagyvérköri vénás nyomás**
- B. csökken a kisvérköri artériás nyomás**

C. megnagyobbodik a máj

D. tüdőödéma alakul ki

Helyes válasz: A, B, C

221. Melyik jellemző a szívizom kontrakciójára:

A. a minden vagy semmi válasz

B. hosszú refrakter fázisa van

C. a kontrakció nagysága függ az inger nagyságától

D. a szívizom nem tetanizálható

Helyes válasz: A, B, D

222. Melyik jellemző az inzulinra?

A. a pankreáz A (α) sejtjei termelik

B. a vércukorszint emelkedés serkenti a termelését

C. a szimpatikus aktivitás gátolja a termelését

D. hatására nő az izomsejtek glükóz felvétele

Helyes válasz: B, C, D

223. Máj funkciói:

A. epe termelés

B. a vérplazma albuminjainak szintézise

C. glikogén raktározás

D. vérképzés (felnőtt emberben)

Helyes válasz: A, B, C

224. Az epe szerepe:

A. micella képzés

B. lipáz aktiválása

C. zsírok felszívódásának elősegítése

D. fehérjék felszívódásának elősegítése

Helyes válasz: A, B, C

225. Egy prokarióta sejtnek van:

A. sejtfala

B. mitokondriuma

C. DNS-e

D. sejtmagja

Helyes válasz: A, C

226. Melyik állítások igazak a mitózisra?

A. ivarsejtek érési osztódása

B. diploid sejtől indul ki

C. testi sejtek osztódási módja

D. folyamata során kromoszómák közötti DNS kicserélődés történik

E. 4 darab haploid sejtet eredményez

Helyes válasz: B, C

227. Melyik állítások igazak a meiózisa?

A. ivarsejtek érési osztódása

B. diploid sejtől indul ki

C. eredménye 2 darab diploid sejt

D. folyamata során kromoszómák közötti DNS kicserélődés történik

E. 4 darab haploid sejtet eredményez

Helyes válasz: A, B, D, E

228. Az alábbiak közül melyek a kommunikáló típusú sejtkapcsolatok?

A. dezmoszóma

B. szinapszis

C. záróléc (tight junction)

D. réskapcsolat (gap junction)

Helyes válasz: B, D

229. Melyik sejtszervecskék vesznek részt a fehérjék szintézisében, további módosításában és szállításában?

A. SER

B. Golgi

C. DER

D. mitokondrium

Helyes válasz: B, C

230. Milyen magatartás jellemzi az ápolót a pszichiátriai betegfelvétel során?

A. empátia

B. feltétel nélküli elfogadás

C. megnyugtató, nyugodtság

D. kongruencia

Helyes válasz: A, B, C, D

231. Negatív érzelmek jelei a testbeszédben:

A. összeszorított fogak, idegesség

B. verejtékezés

C. szemkontaktus kerülése

D. elfordulás, kitérő testtartás

Helyes válasz: A, B, C, D

232. A WHO egészségdefiníciója kiemeli, hogy egészségről akkor beszélhetünk, ha a személyt jellemzi:

A. a testi egészség.

B. a lelki egészség.

C. a társadalmi jó közérzet.

D. a jó kommunikációs képesség.

Helyes válasz: A, B, C

233. Az egészségpszichológia kialakulásának hátterében a következő okok álltak:

A. az életminőséggel való foglalkozás szerepe nőtt.

B. a biomedikális modell hiányosságai.

C. az egészségügy költségeinek emelkedése.

D. a viselkedéstudományok fejlődése

Helyes válasz: A, B, C, D

234. A rizikómagatartás jellemzői:

A. addikcióra való hajlam

B. krónikus betegség megléte

C. tájékozottság

D. helytelen stresszkezelés

Helyes válasz: A, D

235. Az egészséget befolyásoló tényezők

A. értékrend

B. szociális környezet

C. életmód

D. szükségletek

Helyes válasz: A, B, C, D

236. Az egyén fejlődését meghatározó tényezők

A. nevelés

B. környezet

C. szocializáció

D. interiorizáció

Helyes válasz: A, B, C

237. Az egészségnevelés célja:

A. az egészségmagatartás fejlesztése

B. az egészségmegőrzés megtanulása

C. az ideális compliance kialakítása

D. stresszoldó coping technikák megismertetése

Helyes válasz: A, B, C, D

238. A gyermekétől elváló, majd visszatérő anya fogadtatását elemző kötődésvizsgálatok alapján a gyermek lehet:

A. zavart

B. bizonytalanul kötődő, elkerülő

C. biztosan kötődő

D. bizonytalanul kötődő, ambivalens

Helyes válasz: A, B, C, D

239. Az alábbiak közül mely jellemzők igazak a kognitív fejlődés műveletek előtti szakaszára?

A. 7-11 éves kor között jellemző

B. Megtanulja használni a nyelvet, és a tárgyakat képekkel vagy szavakkal jelölni

C. Kidolgozása Albert Bandura nevéhez fűződik

D. A gondolkodás még egocentrikus: nem képes mások nézőpontjait figyelembe venni

Helyes válasz: B, D

240. Az alábbiak közül mely képességek jellemzőek egy újszülöttre?

A. Különbséget tud tenni különböző ízek és illatok között.

B. Érzékeny az emberi nyelv sajátosságaira.

C. Hangokra való figyelem.

D. A felnőttével azonos látásélesség.

Helyes válasz: A, B, C

241. Az attitűd

A. egy értékelő viszonyulás

B. Nem mérhető pszichometriai módszerekkel

C. affektív (érzelmi), kognitív és viselkedésbeli komponensekkel rendelkezik

D. a csoportképződés alapja

Helyes válasz: A, B, C

242. A parafrázis:

A. a beszélgetőpartner által elmondottak újrafogalmazása

B. a tájékozódási kereten belüli kérdezést jelenti

C. a kulturálisan eltérő szóhasználatot jelenti

D. ismétlődő megfogalmazást jelent, hasonló tartalommal

Helyes válasz: A, D

243. Mely állítások igazak az agresszióra?

A. pozitív kapcsolat áll fenn a befogadott médiaagresszió és a gyerekek erőszakos viselkedése között

B. az agresszív válaszok megfigyelés és utánzás útján is elsajátíthatóak

C. az agresszió kifejezése csökkenti az agresszív megnyilvánulásokat

D. a negatív megerősítés növeli az agresszív viselkedés előfordulását

Helyes válasz: A, B, C

244. A minimális csoportparadigma:

- A. a legkisebb egység, a csoport létrejöttét vizsgálja.**
- B. a csoportban kimutatható legkisebb feszültséget vizsgálja.
- C. szerint minimális hasonlóság is elég lehet egy csoport kialakulásához.**
- D. szerint a legkisebb csoportnak is van normája, paradigmája.

Helyes válasz: A, C

III. Igaz – hamis kérdéstípus

A. Igaz

B. Hamis

1. Az újszülött állapotának megítélésére az APGAR pontrendszer alapján történik.

Helyes válasz: A

2. A terhesség biztos jelei a petére, a magzatra és a mellékrészeire, vagy a magzat életműködéseire vonatkoznak.

Helyes válasz: A

3. A magzatmázát a születéskor nem távolítják el, mivel sok értékes tápanyagot tartalmaz a bőr számára.

Helyes válasz: A

4. A nagykutacs a fej tetején található lágy rész, amely röviddel a szülés után záródik.

Helyes válasz: B

5. A lepény végleges formában történő kialakulása mindig a várandósság második hónapjában történik meg.

Helyes válasz: B

6. A terhesség valószínűségi jelei közé soroljuk a várandósság elején jelentkező émelygést, hányingert, hányást.

Helyes válasz: B

7. A Leopld-féle műfogásokkal a magzat elhelyezkedéséről kapunk információt, valamint, megállapíthatjuk a magzat fekvését, állását, az elől fekvő részt és annak a medencebemenethez való viszonyát.

Helyes válasz: A

8. A Leopold I. állás esetén a magzat háta az anya jobb oldala felé tekint, míg II. állás esetén, a magzat háta az anya bal oldala felé.

Helyes válasz: B

9. A várandósgondozás akkor kezdődik el, amikor a szülész-nőgyógyász szakorvos a méhen belüli várandósságot megállapítja, és egyben elvégzi a rizikó besorolást.

Helyes válasz: A

10. A 26/2014. (IV.8.) EMMI rendelet a várandósgondozásról szabályozása értelmében, a várandósság alatti ultrahangvizsgálatok számát 4 alkalomban határozta meg.

Helyes válasz: B

11. A szülés második szakasza a kitolási szak, mely a magzat megszületésétől a lepény megszületéséig tartó időszak.

Helyes válasz: B

12. Másodfokú gátrepedés alatt azt értjük, amikor a gátizomzaton túl a musculus sphincter ani externus is sérül.

Helyes válasz: B

13. A gátvédelem célja, amikor a segítségével irányítjuk a koponya kigördülését és szabályozzuk a megszületését úgy, hogy ezáltal, a gátat óvjuk a sérüléstől.

Helyes válasz: A

14. Koraszülés vezetése során mindig figyeljünk arra, hogy végezzünk kiadós gátmetszést és törekedjünk a kíméletes szülésvezetésre.

Helyes válasz: A

15. Az emlők önvizsgálatára menstruáló nők esetén havi rendszerességgel, mindig a menstruáció utáni 8-10. napán javasolt.

Helyes válasz: B

16. Csontritkulás megelőzésében fontos szerepe van a megfelelő étrendnek, különösen a fehérje és kalciumbevitelnek, valamint a rendszeres fizikai aktivitásnak.

Helyes válasz: A

17. A secunder prevenció része a nőgyógyászati szűrővizsgálat, melynek célja a még gyógyítható, szövődménymentes fázisban megtalálni a betegséget.

Helyes válasz: A

18. A nőgyógyászati szűrővizsgálat részét képezi az emlők áttapintása is.

Helyes válasz: A

19. A gumióvszer, vagy más néven kondom az egyetlen olyan védekezési módszer, amely véd bizonyos szexuális úton terjedő betegségektől is, és minden korosztály számára ajánlható megoldás.

Helyes válasz: A

20. A spirál felhelyezése negatív citológiai lelet birtokában, a menzeszt követő 5-7. napja között a legoptimálisabb.

Helyes válasz: B

21. A magzati szívfrekvencia alapvonal variabilitását 20 perces időintervallumban kell meghatározni, kizárva a decelerációkat és az akcelerációkat.

Helyes válasz: A

22. Normális a magzati szívfrekvencia variabilitása, ha az amplitúdó tartomány 6-25 bpm között található.

Helyes válasz: A

23. A korai deceleráció leggyakrabban a koponya kompressziójának a következménye.

Helyes válasz: A

24. A normális variabilitás és a normális akcelerációk észlelése kizárja a vizsgálat idejében a magzati metabolikus acidózist.

Helyes válasz: A

25. A korai decelerációk élettani jelek a kitolási szakban.

Helyes válasz: A

26. Primer fájásgyengeségről akkor beszélünk, ha a kezdetben kielégítő, jó fájások a szülés lefolyása során enyhülnek vagy megszűnnek.

Helyes válasz: B

27. A késői decelerációt az uteroplacentaris tér véráramlásának csökkenése okozza.

Helyes válasz: A

28. A lefagyasztót tejhez soha ne öntsünk frissen lefejt tejet.

Helyes válasz: A

29. A medencekimenet legrövidebb átmérője az egyenes átmérő.

Helyes válasz: B

30. A magzat negyedik forgása a külső forgás.

Helyes válasz: A

31. Az újszülött megszületését követően azonnal leszívjuk az orrüreget az aspiratio elkerülése érdekében.

Helyes válasz: B

32. Az érett szülés a 37. és 42. hét között történik.

Helyes válasz: A

33. Fejvégű hosszfekvés, I-es állás esetén a magzati szívhangok punctum maxima az anyai oldalán, a ködök felett található (37. héten).

Helyes válasz: B

34. Az AFP kötelező szűrővizsgálat a várandósság során.

Helyes válasz: B

35. A tágalási szak a burkok megrepedésekor kezdődik.

Helyes válasz: B

36. A telt hólyag a kitolási szak elhúzódásához vezethet.

Helyes válasz: A

37. Episiotomia végzése esetén nem szükséges védeni a gátat.

Helyes válasz: B

38. A prosztaglandinok hatékony uterotonicumok.

Helyes válasz: A

39. Negatív szérumbéta-HCG esetén az extrauterin graviditás kizárható.

Helyes válasz: A

40. Polyhydramnion esetén az uterus a vártnál nagyobb és a magzatrészek nehezen tapinthatók.

Helyes válasz: A

41. Aktív vajúdás esetén a magzati szívhangokat 30 percenként kell ellenőrizni.

Helyes válasz: B

42. A vajúdás folyamatában a ritmikus mozdulatok, a magzat, a medence és a gravitáció viszonyának alakítása révén, kedvező hatással vannak a szülés folyamatára.

Helyes válasz: A

43. A várandósság növeli a vénás thromboembóliák kockázatát, ami császármetszés után nagyobb, mint vaginális szülés után.

Helyes válasz: A

43. Az újszülött ajka és az ínye összenyomja az areolát.

Helyes válasz: A

44. Az újszülött eleget szopik, ha a széklet laza és sárga.

Helyes válasz: A

45. A mastitis leggyakrabban a szülés utáni 2-3.héten fordul elő.

Helyes válasz: A

46. Az anya Down szindrómával született gyermeke iránti érzelmi reakciói is gátolhatják a szoptatást.

Helyes válasz: A

47. Gestációs diabetes esetén ellenőrizni kell a HbA1c-szintet.

Helyes válasz: A

48. A szoptatás megnyújthatja a szülések között eltelt időt, de nem tekinthető biztonságos fogamzásgátlási módszernek.

Helyes válasz: A

49. A szoptatott újszülött is igényli a cumit.

Helyes válasz: B

50. A szoptatott újszülöttnak az anyatej mellett forralt vizet is mindig adhatunk.

Helyes válasz: B

51. A menopauza idején nem szükséges csontdenzitometriás vizsgálat végzése.

Helyes válasz: B

52. A szülőnő vizsgálatának a magzati szív működés ellenőrzésével kell kezdődnie, eltekintve néhány kivételes esettől (életet veszélyeztető anyai állapotok).

Helyes válasz: A

53. A nagy fejdaganat értékelhetetlenné teheti a pH- meghatározás eredményét.

Helyes válasz: A

54. Alepény leválása közben nagy mennyiségben szabadul fel proszttaglandin.

Helyes válasz: A

55. Bimanuális vizsgálatot mindig üres húgyhólyag mellett indokolt végezni.

Helyes válasz: A

56. A coitus interruptus a legősibb, férfiak által alkalmazott fogamzásgátló módszer.

Helyes válasz: A

57. A hüvelyi pesszárium megbízhatósága függ a felhelyezés pontosságától.

Helyes válasz: A

58. A családtervezés lehet pozitív és negatív.

Helyes válasz: A

59. A negatív családtervezés alatt a különböző fogamzásgátló eljárásokat értjük, melybe nem tartozik bele a nemkívánt terhesség megszakítása.

Helyes válasz: A

60. A műtét reggelén szülésznő gondosan ellenőrzi a beteg általános állapotát, és amennyiben, lázas, köhög stb. azt azonnal jelzi az orvosnak.

Helyes válasz: A

61. A gyomor kiürítésének célja, a műtét alatti és utáni hányás, aspiratio megelőzése.

Helyes válasz: A

62. A szülésznő segítséget nyújt az orvosnak a szűrővizsgálatok és a nőgyógyászati vizsgálat során, fontos, hogy megteremtse az intim és biztonságos környezetet a beteg számára.

Helyes válasz: A

63. Nőgyógyászati vizsgálat során lehetőleg ne tartózkodjon a vizsgálóban/kezelőben az asszisztensen és az orvoson kívül más személyzet.

Helyes válasz: A

64. A nőgyógyászati betegek ápolása során a szülésznő feladata a nőbeteg vizsgálatra való előkészítése, és a nőbeteg pszichés felkészítése.

Helyes válasz: A

65. Endoscopyás beavatkozás során csak terápiás beavatkozások elvégzésére van lehetőség.

Helyes válasz: B

66. A curette a leggyakrabban végzett nőgyógyászati kisműtét.

Helyes válasz: A

67. A curette-t kizárólag terápiás célzattal lehet végezni.

Helyes válasz: B

68. Marsupialisatio a Bartholin-mirigy abcessusának műtéti megoldása.

Helyes válasz: A

69. Sipoly képződhet a hüvely és a gát, valamint a rectum és a gát között is.

Helyes válasz: A

70. A decidua inaktív szövet, amely csak hormontermelésre képes.

Helyes válasz: B

71. A magzatvíz lehetőséget biztosít a magzatmozgásra.

Helyes válasz: A

72. A várandósság ideje alatt a verejték és faggyúmirigyek működése csökken.

Helyes válasz: B

73. A testsúly a várandósság ideje alatt átlag 25-30%-kal növekszik.

Helyes válasz: B

74. A várandósság ideje alatt a fogászati szűrővizsgálaton való részvétel legalább kettő alkalommal ajánlott.

Helyes válasz: A

75. Várandósság ideje alatt kerülni kell az ülőfürdőt.

Helyes válasz: A

76. Várandósság ideje alatt a ruházat legyen kényelmes, könnyű, míg a fehérnemű lehetőleg természetes alapanyagból készüljön.

Helyes válasz: A

77. Normális várandósság esetén nincs ok a szexuális élet megtiltására.

Helyes válasz: A

78. A várandósságra a passzív dohányzás nem ártalmas.

Helyes válasz: B

79. Célszerű lenne, ha a szülésfelkészítő tanfolyamokon az apák is részt vennének.

Helyes válasz: A

80. Az apák részvételével vezetett szüléseket együttszülésnek nevezzük.

Helyes válasz: A

81. Az ősi kultúrájú népek asszonyai guggolva vagy ülve szültek.

Helyes válasz: A

82. A különböző testhelyzetek váltogatása javítja a vajúdas minőségét, hatékonyságát, ezáltal a fájdalom elviselését is könnyebbé teszi.

Helyes válasz: A

83. A medencevégű fekvéses szülések hüvelyi vezetéséhez a Covjanov-Bracht-féle műfogást alkalmazzuk.

Helyes válasz: A

84. A vacuumextractor csak elő magzat esetében alkalmazható.

Helyes válasz: B

85. A vacuumextractor alkalmazásakor fokozatosan 90-100 kPa negatív szívást kell kialakítani.

Helyes válasz: B

86. Terhesség megszakítás végezhető anyai kérésre, vagy bizonyos betegségek/kórképek esetén orvosi javallatra.

Helyes válasz: A

87. A vaginoscop, egy fényforrással ellátott, vékony csőszerű endoscopos műszer.

Helyes válasz: A

88. A Trichomonasist a Trichomonas vaginalis nevű flegellata okozza.

Helyes válasz: A

89. A higiénés rendszabályok betartásával a nozokomiális fertőzések kialakulása csökkenthető.

Helyes válasz: A

90. A gonorrhoea egy asszcendáló fertőzés, melynek kimutatása, a méhnyakból lehetséges.

Helyes válasz: A

91. A luest a Treponema pallidum nevű vírus okozza.

Helyes válasz: B

92. Intézetén kívüli szülés esetén az újszülött ellátását a szülést követő negyedik naptól a házi gyermekorvos veszi át.

Helyes válasz: A

93. Intézetén kívüli szülés esetén a szülésznőnek, a szülést követően 3 órán keresztül gondoskodni kell az anya és az újszülött megfigyeléséről.

Helyes válasz: A

94. Intézetén kívüli szülés esetén az újszülött első gyermekgyógyászati vizsgálatát 24 órán belül el kell végezni.

Helyes válasz: A

95. Burokrepesztés után mindig ellenőrizni kell a magzati szívhangokat.

Helyes válasz: A

96. Másodfokú gátrepedés esetén a gát izomzata egészen a sphincter aniig bereped, de ép marad a végbél külső záróizma.

Helyes válasz: A

97. IV. fokú gátrepedés esetén, már a végbélre is ráterjed a sérülés.

Helyes válasz: A

98. A perimenopausa alatt az utolsó szabályos menstruáció előtti és utáni 1-1 hónapot értjük.

Helyes válasz: B

99. Duncan-féle leválás esetén a burokba befordítjuk be a lepényt.

Helyes válasz: A

100. Varicositas esetén rugalmas pólya,elasztikus harisnya használata szükséges.

Helyes válasz: A

101. A túl erős fájások intenzitása >1 fájás/10perc.

Helyes válasz: B

102. A Humán Papillomavírus minden típusa magas onkogén potenciállal rendelkezik.

Helyes válasz: B

103. A bakteriális vaginózis csak szexuális életet folytató nőknél lép fel.

Helyes válasz: A

104. Az exfoliatív citológiai mintavételkor az endocervixből és az ectocervixből vesznek mintát.

Helyes válasz: A

105. A C-vitamin nagy dózisban történő adagolása a várandósság alatt hányást, hasmenést okozhat.

Helyes válasz: A

106. Bármely vitamin és ásványianyag kiegészítés esetén nem szükséges tájékoztatni a várandós nőt, annak várható előnyeiről és hátrányairól.

Helyes válasz: B

107. A deflexió tartás tartási rendellenesség.

Helyes válasz: A

108. Arctartás esetén a fej hátrahajtott, deflexiós helyzetben van.

Helyes válasz: A

109. Magas burokrepedésről akkor beszélünk, ha a burok a nem a belső méhszáj feletti területen reped meg.

Helyes válasz: A

110. Burokrepedés után a magzati szívhangokat nem szükséges meghallgatni.

Helyes válasz: B

111. A köldökzsinór normális hossza 15-20 cm.

Helyes válasz: B

112. Magzati kar vagy láb előesésekor is lehetséges a spontán hüvelyi szülés.

Helyes válasz: B

113. Ikerterhességben, ha mindkét magzat fejvégű fekvésben van, a szülést spontán vezethetjük.

Helyes válasz: A

114. Ikerszülés esetén az „A” magzat megszületése után, mindig belső vizsgálatot kell végezni.

Helyes válasz: A

115. Normális körülmények között a köldökzsinór a lepény közepén vagy annak közelében tapad.

Helyes válasz: A

116. Az idő előtti burokrepedés fő veszélye az aszcendáló infekció.

Helyes válasz: A

117. Amennyiben a burok a méhszáj eltűnésekor még nem repedt meg, azt meg kell repeszteni, melynek kivitelezése a szülésznő kompetenciája.

Helyes válasz: B

118. Szekunder fájásgyengeség téraránytalanság esetén gyakrabban fordul elő.

Helyes válasz: A

119. Az egypetűjű ikrek egyetlen petesejtből származnak.

Helyes válasz: A

120. Amennyiben a várandósság ideje alatt az anyánál polyhydramnion áll fen, úgy a várandós nehezen tud kényelmesen feküdni, valamint nehézlégzés, gyomorégés ilyenkor gyakrabban jelentkezik.

Helyes válasz: A

121. Burokrepedés a várandósság bármely időpontjában előfordulhat.

Helyes válasz: A

122. Kezeletlen mastitisből tályog is kialakulhat.

Helyes válasz: A

123. A mellbimbó sebesedését, berepedését előidézheti a helytelen pozicionálás.

Helyes válasz: A

124. A toxoplasmosist a Toxoplasma gondi nevű parazita okozza.

Helyes válasz: A

125. Oxitocint szülés közben mindig infúzióban kell adni.

Helyes válasz: A

126. Fájasgyengeségre a figyelmet felhívhatja a szülés elhúzódása.

Helyes válasz: A

127. III. fokú gátrepedés esetén a repedés a hátsó commissurára terjed.

Helyes válasz: B

128. Haematoma kialakulhat az episiotomia ellátása után is.

Helyes válasz: A

129. Terhességmegszakítás végezhető anyai kérésre is a terhesség 20. hetéig.

Helyes válasz: B

130. A nemi életet élő serdülőkön a nőgyógyászati vizsgálat menete a felnőttekével megegyező.

Helyes válasz: A

131. A spermiumok 48-72 óráig maradnak a genitális tractusban életképes állapotban.

Helyes válasz: A

132. A Billings -módszer a cervicalis nyák megfigyelésén alapul.

Helyes válasz: A

133. Szülés közben gyakran lép fel hányinger, hányás, a méhkontrakciók által kiváltott reflexek és a hasúri nyomás fokozódása miatt.

Helyes válasz: A

134. A méh nagysága a 16. terhességi héten csecsemőfejnyi.
Helyes válasz: A
135. A cervix hosszát és a nyakcsatorna tágasságát négyjegyű számmal is szokták kifejezni, ez a cervicális index.
Helyes válasz: A
136. A lepény távozása után már érvényesül a prolaktin tejelválasztást fokozó hatása.
Helyes válasz: A
137. Kiszámítható a szülés várható időpontja az anya által először érzett magzatmozgás alapján is.
Helyes válasz: A
138. Többször szült nők a magzatmozgást már a 12-13. héten érzik.
Helyes válasz: B
139. A második trimesztert a jó közérzet, a felszabadultság, gyakran euforikus hangulat jellemzi.
Helyes válasz: A
140. A korai deceleráció a DIP 2, amikor szívritmuslassulás időben nem esik egybe a fájásokkal.
Helyes válasz: B
141. A meconiumürítés a bélmotilitás fokozódásának a következménye.
Helyes válasz: A
142. BPD a két os parietale közti távolságot jelenti.
Helyes válasz: A

143. A menstruációs anamnézis során mindig kérdezzünk rá a menarche időpontjára, a ciklusok hosszára, a vérzés időtartamára, a vérzés mennyiségére és jellegzetességeire.

Helyes válasz: A

144. A Leboyer – féle szülés lényege, hogy csendes, nyugodt, félhomályban szülessen meg az újszülött.

Helyes válasz: A

145. A szülésnek három szakaszát különítjük el, a tágulási, kitolási és a lepényi szakot.

Helyes válasz: B

146. A belső vizsgálatok közül a szülésznők számára a rectális vizsgálat ajánlott.

Helyes válasz: B

147. Vajúdás során a vajúdót egyetlen percre se hagyjuk magára.

Helyes válasz: A

148. Téraránytalanság esetén a megoldás mindig császármetszés.

Helyes válasz: A

149. Térdtartás esetén az egyik vagy mindkettő térd a far előtt helyezkedik el.

Helyes válasz: A

150. Császármetszés esetén a műtét után 24 órán át postoperatív megfigyelést kell végezni.

Helyes válasz: A

151. A 3.számú Leopold-féle műfogás célja, hogy megállapítsuk mi az elől fekvő magzati rész és annak milyen a viszonya a medencebemenethez.

Helyes válasz: A

152. A 3. számú Leopold-féle műfogással a magzati hátat tudjuk kitapintani.

Helyes válasz: B

153. A 3. számú Leopold-féle műfogással az aprórészeket tapintjuk ki.

Helyes válasz: B

154. A 3. számú Leopold-féle műfogással az ikerterhességet tudjuk megállapítani.

Helyes válasz: B

155. A chorion a külső magzatburok.

Helyes válasz: B

156. A lumbalis epiduralis analgészia nem alkalmas a tárgulási szak és a lepényleválásztás anesztéziájára.

Helyes válasz: B

157. A secunder ablaktáció indokolt lehet súlyos mastitisben.

Helyes válasz: A

158. A secunder ablaktáció indokolt lehet minden gyermekágyasnál.

Helyes válasz: B

159. A secunder ablaktáció indokolt lehet, ha fáradt a szülőnő.

Helyes válasz: B

160. A secunder ablaktáció indokolt lehet, a szülés utáni első napon.

Helyes válasz: B

161. A spermicid anyagok a spermiumok membránját károsítják.

Helyes válasz: A

162. Az intimitás biztosítása már attól kezdve szükséges, hogy a beteg kapcsolatba kerül a gyógyító- ápoló személyzettel.

Helyes válasz: A

163. Az intimitást csak a kezelések, illetve beavatkozások alatt kell biztosítani.

Helyes válasz: B

164. Az intimitást csak a műtét előtt szükséges biztosítani a beteg részére.

Helyes válasz: B

165. Az intimitás segít a betegeknek, hogy a szégyenérzetük, félelmük, kiszolgáltatottságuk megszűnjön.

Helyes válasz: A

166. Az oestrogén a hüvelyhám érését segíti.

Helyes válasz: A

167. HELLP szindróma súlyosbodásának jele a trombocitózis.

Helyes válasz: B

168. A lepényi szakot aktívan vezetjük iv. bolus oxytocin adásával.

Helyes válasz: A

169. A méhnyakrák szűrése hazánkban HPV szűréssel történik.

Helyes válasz: B

170. A tejbelövellést kísérő láz élettani folyamat.

Helyes válasz: A

171. A Zweifel-féle műfogás a kar kifejtésére szolgál.

Helyes válasz: B

172. Atóniánál az uterus contractioja után a vérzés megszűnik.

Helyes válasz: A

173. Az endocervicitis leggyakoribb oka az E. Coli.

Helyes válasz: B

174. Vena cava inferior syndroma esetén az RR emelkedik.

Helyes válasz: B

175. A petefészekben a tüszők az ösztrogén hormon hatására kezdenek el megélni.

Helyes válasz: B

176. A ligamentum sacrotuberale és a ligamentum sacrospinale részt vesz a kismedence bemenetének alkotásában.

Helyes válasz: B

177. Az indirekt anyai halálozás nincs összefüggésben a terhességgel. **Igaz**

Helyes válasz: A

178. Vacumm extractio csak eltűnt nméhszáj mellett végezhető. **Igaz**

Helyes válasz: A

179. A vacuum extractio kontraindikációja a deflexios tartás, a medencevégű fekvés és a koraszülés.

Helyes válasz: A

180. A vacuum extractio leggyakoribb javallata a fájásgyengeség és a magzati hipoxiára utaló CTG.

Helyes válasz: A

181. A vacuum extractio célja a kitolási szak megrövidítése.

Helyes válasz: A

182. Vacuum extractio esetén csak nagy magzat mellett szükséges gátmetszést végezni.

Helyes válasz: B

183. Vacuum extractio során a fej megszületése után azonnal eltávolítjuk a szívókorongot.

Helyes válasz: A

184. Vacuum extractio alkalmazása során neonatalógus jelenléte szükséges.

Helyes válasz: A

185. Császármetszést követően gyakoribb a mélyvénás trombózis, mint hüvelyi szülés után.

Helyes válasz: A

186. A perinatalis magzati halálozás statisztikáját 1000 születésre adjuk meg.

Helyes válasz: A

187. Hazánkban a perinatalis magzati halálozás értéke 10/1000 születésnél alacsonyabb.

Helyes válasz: A

188. A gyermekágyi tudathasadást hallucinációk (látási és hallási) jellemezhetik.

Helyes válasz: A

189. Gyermeekági tudathasadásos állapotban nő az öngyilkosság veszélye.

Helyes válasz: A

190. A császarmetszés abszolút javallata áll fen, ha nincs mód a hüvelyi szülésre.

Helyes válasz: A

191. Várandóság alatt is törekedünk a rendszeres táplálkozásra, a rendszeres zöldség és gyümölcsfogyasztásra.

Helyes válasz: A

192. Az étkezés során kerüljük az erős, fűszeres ételek fogyasztását.

Helyes válasz: A

193. A spirált a tervezett fogamzás előtt pár hónappal javasolt eltávolíttatani, hogy a méhnyálkahártya megfelelően tudjon regenerálódni.

Helyes válasz: A

194. A termékeny napok figyelembevételével növelhetjük a fogamzás esélyét.

Helyes válasz: A

195. Az évente elvégzett nőgyógyászati vizsgálat során, minden alkalommal a szeméremtestet, a hüvelyt, a méhszájat, a méhtestet és a függelékeket, valamint az emlőket is vizsgálni kell.

Helyes válasz: A

196. Az egészséges élet egyik fontos eleme a szexualitás, amely ha nem működik megfelelően, az kihat a hétköznapiakra.

Helyes válasz: A

197. A kezeletlen hüvelygyulladás, kismencedei gyulladásához vezethet.

Helyes válasz: A

198. Petefészek ciszta esetén az ultrahang vizsgálaton a petefészekben folyadéktartalmú képletet látunk.

Helyes válasz: A

199. A méh gyulladással betegségei általában bakteriális eredetűek.

Helyes válasz: A

200. Méhgyulladás esetén vérzési rendellenesség is kialakulhat.

Helyes válasz: A

201. A változókor talán az egyik leggyakoribb tünete a hőhullám, mely negatívan befolyásolja az életminőséget.

Helyes válasz: A

202. A változókori hőhullámok oka az ösztrogénszint csökkenése.

Helyes válasz: A

203. A változókor megjelenésével a petefészkek hormontermelése fokozódik.

Helyes válasz: B

205. A pesszárium ugyan úgy, mint a gumióvszer véd a nemi úton terjedő fertőzésekkel szemben.

Helyes válasz: B

206. A fogamzásgátló tabletta felírásának feltétele a nőgyógyászati vizsgálaton való részvétel.

Helyes válasz: A

207. Az esemény utáni fogamzásgátló hatása az együttlét után három napon belül érvényesül, de a legnagyobb védeettséget az együttlét utáni első napon nyújtja.

Helyes válasz: A

208. A külső forgás után jelentkező vállalakadás megoldását segítheti a McRoberts manőver és a suprapubikus nyomás egyidejű alkalmazása.

Helyes válasz: A

209. Művi burokreperesztést követően azonnal szívhangot kell hallgatni.

Helyes válasz: A

210. Magzati tachycardia esetén folyamatos CTG monitorozás szükséges.

Helyes válasz: A

211. A patellareflex kiesése magnéziumtúladagolás esetén jellemző.

Helyes válasz: A

213. A Bracht-féle szülésvezetésnél nem szükséges gátmetszést végezni.

Helyes válasz: B

214. Polyhydramnion esetén a magzatrészek könnyen kitapinthatók.

Helyes válasz: B

215. Gestációs diabetesben szenvedő vajúdo nő esetén a vajúdas során legalább óránként vércukorszintet kell néznünk.

Helyes válasz: A

216. Magzati vitális javallat alapján végezzük a császármetszést köldökzsinór előesés esetén.

Helyes válasz: A

217. A gyermekági pszichózis gyakorisága 1-2 ezrelék.

Helyes válasz: A

218. A bemenet harántátmérője a linea terminalis két legtávolabbi pontját köti össze.

Helyes válasz: A

219. A conjugata diagonalis interna a symphysis alsó szélét a promontoriummal köti össze.

Helyes válasz: A

220. Ha a medence dőlési szöge 60 foknál nagyobb, akkor nő a rendellenes beilleszkedés valószínűsége.

Helyes válasz: A

221. A medence bemeneti síkja linea terminalis magasságában halad.

Helyes válasz: A

222. A két homlokcsont között található a koszorúvarrat.

Helyes válasz: B

223. A nagykutacs háromszög alakú.

Helyes válasz: B

224. A cephalhaematoma néhány órán belül eltűnik.

Helyes válasz: B

225. A kiskutacs háromszög alakú.

Helyes válasz: A

226. A kiskutacs rombuszalakú.

Helyes válasz: B

227. A gombás hüvelyi fertőzéseket 85%-ban *Candida albicans* okozza.

Helyes válasz: A

228. A Herpes genitalis kezelésére acyclovirt használunk.

Helyes válasz: A

229. Bakteriális vaginózisban a hüvely pH értéke 4,5 alatti.

Helyes válasz: B

230. A változó kor magas FSH és LH szint jellemzi.

Helyes válasz: A

231. Ovulatio után a granulosa és theca sejtek luteinizálódnak, proliferációjuk zajlik és kapillárisok nőnek a területbe, amely bevérzik, kialakul a corpus haemorrhagicum.

Helyes válasz: A

232. A PCOS egy metabolikus és endokrin eltérésekkel járó tünetegyüttes. Jellemzője az anovuláció és az ovarialis androgéntúlermelés.

Helyes válasz: A

233. Krónikus hyperetonia mellett kb. 25%-ban várható a ráakódásos praeeclampsia kialakulása.

Helyes válasz: A

234. Corpus carcinoma I stadiuma esetén az 5 éves túlélés 85-90%.

Helyes válasz: A

235. Corpus carcinoma IV stadiuma esetén az 5 éves túlélés 25%.

Helyes válasz: B

236. A speciális aspirációs eszközzel vett endometriumminták csak 50-60%-ban jelzik a méhnyálkahártya kóros elváltozását.

Helyes válasz: A

237. A méhtestrák kialakulásában a tartós ösztrogénhatás szerepet játszik, főleg akkor, ha azt a progeszteron nem ellensúlyozza.

Helyes válasz: A

238. IV. stadiumú corpus carcinomában szenvedő beteg 5 éves túlélési esélye 5-10%.

Helyes válasz: A

239. Az acardia monochorialis ikerterhességben fordul elő.

Helyes válasz: A

240. Ha a magzat növekedési retardatioja áll fenn és az AFI (magzatvíz index) értéke 2 cm alatti a terhesség lezárása javasolt.

Helyes válasz: A

241. Ha a magzat növekedési retardatioja áll fenn és az AFI (magzatvíz index) értéke 4 cm a terhesség lezárása javasolt.

Helyes válasz: B

242. Orális cukorterheléses teszt előtt 12 óras éhezés szükséges.

Helyes válasz: A

243. Episiotómia előtt kötelező az érzéstelenítés.

Helyes válasz: A

244. Vajódás során minél nagyobb a szorongás és a feszültség annál nagyobb a fájdalomérzet.

Helyes válasz: A

245. Praeclampsziában fennálló nehézlégzés hátterében leggyakrabban tüdőoedema áll.

Helyes válasz: A

246. Alacsony trombocytaszám mellett az epiduralis analgészia kontraindikált.

Helyes válasz: A

247. Megfelelő légzéstechnika alkalmazásával a fájdalom csökkenthető.

Helyes válasz: A

248. Gyógyszeres szülési fájdalomcsillapítás céljából kábító fájdalomcsillapítót is lehet alkalmazni, azonban az újszülöttnél légzési depressziót okozhat.

Helyes válasz: A

249. A nitrogénoxidult intramuscularis injekció formájában alkalmazzuk szülési fájdalomcsillapítás céljából.

Helyes válasz: B

250. Az epidural analgészia és a spinal anesztézia egyaránt alkalmazható császármetszés során.

Helyes válasz: A

251. Praeclampsziában gyakrabban fordul elő a méhlepény leválása.

Helyes válasz: A

252. A folsav velőcső záródási rendellenességet megelőző hatása dózisfüggő. Nagyobb mennyiségű folsav hatékonyabban előzi meg ezt a fejlődési rendellenességet.

Helyes válasz: A

253. Idő előtti burokrepedés esetén azonnal a terhesség lezárása javasolt.

Helyes válasz: B

254. Primer fájásgyengeségről beszélünk, ha a fájástevékenység kezdetétől renyhe fájásokkal rendelkezik a vajúdó.

Helyes válasz: A

255. Epiduralis analgészia csökkenti a vérnyomást.

Helyes válasz: A

256. Ha egy várandósnak a terhesség második felében gyomortáji fájdalma, hányingere van és magas a vérnyomása HELLP-syndromára kell gondolni.

Helyes válasz: A

257. Terhesség alatti akut vérnyomáscsökkentés esetén mindig CTG vizsgálattal ellenőrizni kell a magzat állapotát.

Helyes válasz: A

258. Nagy magzat koponyavégű fekvéses szülése során a kar felcsapódhat és karkifejtés alkalmazására lehet szükség.

Helyes válasz: B

259. Várandósság korai szakában mindig el kell végezni a rizikófelmerést.

Helyes válasz: A

260. Ikorszülés vezetésekor az „A” magzat megszületése után belső vizsgálatot kell végezni, hogy megállapítsuk a „B” magzat előlfekvő részét és annak viszonyát a medence bemenetéhez.

Helyes válasz: A

261. Ikermagzatok fejének összeakadása következhet be, ha az „A” magzat medencevégű fekvésben, a „B” magzat koponyavégű fekvésben helyezkedik el.

Helyes válasz: A

262. A vomitus matutinus a terhesség gyanújele.

Helyes válasz: A

263. Diabeteses anya újszülöttjében gyakrabban fordul elő hyperbilirubinaemia.

Helyes válasz: A

264. A cervix feltágítását laminaria pálcával (tengeri növényből készült) végezzük, mely a környező szövetekből a nedvességet magába szívja, ezáltal megduzzad és a nyakcsatornát kitágítja.

Helyes válasz: A

265. A Chlamydia fertőzés késői tünete lehet a méhkürt elzáródása.

Helyes válasz: A

266. Gyógyszeres ablactatio csak gesztogénnel végezhető.

Helyes válasz: B

267. Gyermekágyi pszichózisban ablactatio indokolt, amit bromocriptinnel is végezhetünk.

Helyes válasz: A

268. A fiatalkori vulva laphámrák hátterében általában HPV fertőzés áll.

Helyes válasz: A

269. Az időskori vulva laphámrák hátterében általában HPV fertőzés áll.

Helyes válasz: B

270. A spermium találkozása az uterus üregében történik, ezért innen már nem szükséges vándorolnia a megtermékenyített petesejtnek, hanem könnyen megtörténhet a beágyazódás.

Helyes válasz: B

271. A CTG görbe értékelésénél figyelembe kell venni az oszcillációt, aminek jellemzője az amplitudó. Ez a paraméter a szívfrekvencia-változás legmagasabb és legalacsonyabb értéke közötti különbség. Normális értéke 5-15/min.

Helyes válasz: A

272. A köldökszinór erőteljes húzása a méhlepény leválása előtt az uterus kifordulását okozhatja.

Helyes válasz: A

273. Descensus uteri esetén a portio uteri az introitus előtt van.

Helyes válasz: B

274. Amikor a portio a hüvelybemenet elé kerül prolapsus uteriról beszélünk.

Helyes válasz: A

275. A hCG-t a vérből és a vizeletből is kimutathatjuk.

Helyes válasz: A

276. A szülésindítás sikerességét a méhszáj érettsége és a méhizomzat oxytocin iránti érzékenysége befolyásolja.

Helyes válasz: A

277. A Down-syndroma előfordulása az anyai életkorral nő, 45 éves kor felett 200 várandós nő közül várhatóan egy Down-syndromás gyermeket szülne, ha a kórképet nem szűrnénk.

Helyes válasz: B

278. A Down-syndroma szűrése céljából amniocentezist végzünk és a magzatvízből kariotipizálással mutatjuk ki a kromoszómarendellenességet.

Helyes válasz: B

279. A magzati szívultrahangvizsgálat ideális időpontja a 19-20.gesztációs hét.

Helyes válasz: A

280. Anyai szenzibilizáció jöhet létre, ha Rh negatív vércsoportú várandós magzata Rh pozitív vércsoporttal rendelkezik és vérzés lép fel a terhesség során.

Helyes válasz: A

281. Rh negatív vércsoportú várandós nőnek vérzése esetén anti D IgG-t kell adni a szenzibilizáció megelőzése céljából.

Helyes válasz: A

282. Rh negatív vércsoportú nőnél a terhesség során csak az I. és III. trimeszterben kell anti D titer meghatározást végezni.

Helyes válasz: B

283. A magzati arteria cerebri media véráramlási sebessége alapján a magzati anaemia mértékére következtethetünk.

Helyes válasz: A

284. Iker-iker transzfúzió következményeként előfordulhat oligohydramnion.

Helyes válasz: A

285. Szülés utáni HELLP-syndroma esetében a plazmaferézis fontos szerepet játszik a kezelésben.

Helyes válasz: A

286. Szülés utáni HELLP-syndroma esetében a hemodialízis fontos szerepet játszik a kezelésben.

Helyes válasz: B

287. A magnézium intoxicatio (mérgezés) első klinikai jele a fokozott reflexingerlékenység.

Helyes válasz: B

288. HELLP-syndroma fennállásakor a terhességet le kell zárni.

Helyes válasz: A

289. Harmadfokú gátrepedés során sérül a m. sphincter ani.

Helyes válasz: A

290. Elsőfokú gátrepedés során sérül a commissura posterior bőre és az izom feletti felület szövet.

Helyes válasz: A

291. Másodfokú gátrepedés esetén nem szakadnak át a gát izmai.

Helyes válasz: B

292. Negyedfokú gátrepedés esetén a rectum mellső fala is átszakad.

Helyes válasz: A

293. Normális koponyatartásban levő magzat megszületésekor a vezérpont a nagykutacs.

Helyes válasz: B

294. Fejtetőtartásban levő magzat születése során a vezérvonal a nyílvarrat.

Helyes válasz: B

295. Homloktartásban levő magzat születése során a vezérpont a homlokdudor, a vezérvonal a homlokvarrat.

Helyes válasz: A

296. Normális koponyatartásban levő magzat születése során a vezérvonal a nyílvarrat, a vezérpont a kiskutacs.

Helyes válasz: A

297. Mentoposterior arctartás esetén a vezérpont hátrafelé forog, a magzat spontán megszületése lehetetlen.

Helyes válasz: A

298. Arctarás esetén a vezérpont az orrgyök, mellfelé forog, a vezérvonal az arcél.

Helyes válasz: B

299. Fejtetőtartásban levő magzat megszületésekor a fej kigördülése kétszakaszos.

Helyes válasz: A

300. Klasszikus karkifejtés során a jobb kart jobb kézzel simítjuk le az arc előtt.

Helyes válasz: A

301. A telemedicina egészségügyi szolgáltatás.

Helyes válasz: A

302. A társadalom elvárja a betegről, hogy együttműködjön az orvossal, és hogy törekedjen egészsége helyreállítására.

Helyes válasz: A

303. A gender jelentése: biológiai nem.

Helyes válasz: B

304. A potencialitás argumentuma szerint a zigótát nem kell védelmeznünk.

Helyes válasz: B

305. Az életképességi kritérium értelmében, aki nem életképes, azzal szemben morálisan megengedhető módon végezhető eutanázia.

Helyes válasz: B

306. A „Ratkó korszak” elnevezés a Ratkó Emília által jegyzett anakronisztikus eutanázia törvény tervezetre utal.

Helyes válasz: **B**

307. Valamely egész mindig csak ahhoz a részhez viszonyítva érthető helyesen, melyet tartalmaz - a holisztikus szemlélet szerint.

Helyes válasz: **B**

308. A filozófiában a deskriptív jelleg mellett etikai mozzanat is rejlik.

Helyes válasz: **A**

309. A biológiai tudományok és az orvosi technológia robbanásszerű fejlődése maga után vonta a hivatás egyre fokozódó specializálódását.

Helyes válasz: **A**

310. Az elítéltek cselekvőképtelenek, helyettük a büntetés-végrehajtási intézet vezetője nyilatkozik.

Helyes válasz: **B**

311. A gazdasági társaságok jogi személyiséggel rendelkeznek.

Helyes válasz: **A**

312. Magyarországon az első átfogó egészségügyi törvény a Generale Normativum in Re Sanitatis volt.

Helyes válasz: **B**

313. Az egészségügyi piacra jellemző az ár meghatározó szerepe.

Helyes válasz: **B**

314. A közjavak fogyasztásából nem zárható ki senki.

Helyes válasz: **A**

315. Az árrugalmasság azt mutatja meg, hogy egy adott termék kereslete mennyivel változik egységnyi árváltozás hatására.

Helyes válasz: A

316. A nagykutacs a nyakszirtesont és a és a két falcsont között található.

Helyes válasz: B

317. Az érett újszülött obligát orrlégző.

Helyes válasz: A

318. Az újszülött székletét az első napokban magzatszuroknak (meconium) nevezzük.

Helyes válasz: A

319. Az újszülött megszületése után a váladék leszívását minden esetben el kell végezni.

Helyes válasz: B

320. Köhögési, tüsszentési, pislogó, fogó és szopóreflex a megszületés után kiváltható.

Helyes válasz: A

321. Gyűjtött női tej adása indikált lehet koraszülöttség esetén.

Helyes válasz: A

322. Az újszülöttre jellemző, hogy súlyához képest nagy a testfelszíne, vékony a bőre, kevés a bőr alatti zsírpárna.

Helyes válasz: A

323. Az Apgar felmérés szempontjai a szívverés, bőrszín, izomtónus, légzés.

Helyes válasz: B

324. Tápszerrel táplált csecsemők esetén már 3 hónapos kórtól meg lehet kezdeni a hozzátáplálást.

Helyes válasz: B

325. A csecsemő születési súlyát egy éves korára megháromszorozza.

Helyes válasz: A

326. Transzfúziós szövődmény jeleinek észlelésekor a transzfúziót a vénakanül egyidejű megszüntetése mellett azonnal meg kell szakítani, és értesíteni kell a transzfúziót felügyelő orvost.

Helyes válasz: B

327. Hemokultúra mintavétele esetén a mintavételt mindig az anerob feliratú palackkal kezdjük.

Helyes válasz: B

328. OGTT vizsgálatot nem javasolt lázas állapotban és menstruáció alatt végezni.

Helyes válasz: A

329. A HIV kimutatására alkalmazható orális gyorseszteszt torokváladékból történő mintavételezésen alapul.

Helyes válasz: B

330. Ha a csontdenzitometriás vizsgálat során a T-score érték $-1,0$ ÉS $-2,5$ SD közötti, osteoporosisról beszélünk.

Helyes válasz: B

331. Appendicitis akuta során amennyiben a beteg antibiotikumot kap megelőzhető a perforáció.

Helyes válasz: B

332. Varicectomy esetén a kórházi bent tartózkodás akár 5-7 nap is lehet.

Helyes válasz: B

333. Minden szeptikus seb krónikusnak tekintendő.

Helyes válasz: B

334. Az injekciózás helyi szövődménye közé tartozik az anaphilaxiás reakció.

Helyes válasz: B

335. A tűszúrásos balesetek megelőzése céljából javasolt az aktív vagy passzív biztonsági rendszerrel ellátott kanülök alkalmazása.

Helyes válasz: A

336. A korhoz kötött kötelező védőoltások a szekunder prevencióhoz tartoznak.

Helyes válasz: B

337. A korai halálozás kategóriája azért jött létre, hogy meghatározható legyen az az életkor, amely felett már a nagyon drága beavatkozásokat már nem kell elvégezni.

Helyes válasz: B

338. Az elkerülhető halálozás és a gazdasági helyzet között nincs összefüggés.

Helyes válasz: B

339. Azokban az országokban, ahol nagy a társadalmi egyenlőtlenség, a Preston görbe összefüggése korlátozottan teljesül.

Helyes válasz: A

340. Egészségünket a legnagyobb arányban az egészségügy fejlettsége befolyásolja.

Helyes válasz: B

341. A Diabetes mellitus egyik legfőbb oka az alsó végtag amputációknak.

Helyes válasz: A

342. A Diabetes mellitus veseelégtelenség kialakulásának leggyakoribb oka.

Helyes válasz: A

343. A tartás hibák okozta gerincbetegségek primer prevenciója nem ismert.

Helyes válasz: B

345. A demenciának nem rizikófaktora a dohányzás.

Helyes válasz: B

346. A világ főbb halálozási statisztikájában az első helyen szerepel a daganatos halálozás.

Helyes válasz: B

347. Koraszülöttnek tekintjük az újszülöttet 2500 gr születési súly alatt.

Helyes válasz: A

348. 1000 gr születési súly alatt éretlen kis súlyú koraszülöttről beszélünk.

Helyes válasz: A

349. 35 hét után született csecsemő érett újszülött.

Helyes válasz: B

350. 41 hét után beszélünk túlhordásról.

Helyes válasz: A

351. Az érett fiú újszülött heréi a scrotumban tapinthatók.

Helyes válasz: A

352. Érett leány újszülött nagyajkai nem fedik a kisajkakát.

Helyes válasz: B

353. Érett újszülött testét magzatmáz borítja.

Helyes válasz: A

354. Érett újszülött fejkörfogata 33-35 cm.

Helyes válasz: A

355. Apgar 6 esetén nem kell megkezdeni az újraélesztést.

Helyes válasz: B

356. Az Apgar vizsgálat része a bőrszín, tonus légzés és szív frekvencia.

Helyes válasz: A

357. A köhögés és megfázás kezelésére használt kodein-tartalmú gyógyszereket a 12 év alatti gyermekeknél nem szabad, a 12 és 18 év közötti, légzési problémáktól szenvedő serdülők esetében pedig nem javasolt alkalmazni.

Helyes válasz: A

358. A calciumnak a csontképzésben, izom-összehúzóásban, véralvadásnál, a membrán permeabilitásban van szerepe, a szívre pozitív inotrop hatású.

Helyes válasz: A

359. A Ca és P anyagcseréjét a B- vitamin és a parathormon szabályozza.

Helyes válasz: B

360. Az 1-es típusú cukorbetegség alapvető oka az inzulintermelés fokozódása.

Helyes válasz: B

361. A morfinnak szorongást növelő hatása van, egyik mellékhatása a hasmenés.

Helyes válasz: B

362. A nők húgyúti gyulladásának leggyakoribb kórokozója az E coli.

Helyes válasz: A

363. A Hypertoniás betegeknél 40%-ban lehet találni valamilyen kiváltó alapbetegséget.

Helyes válasz: B

364. A 160/100Hgmm felett sürgősen csillapítanunk kell a magas vérnyomást.

Helyes válasz: B

365. A vastagbélrákot elegendő akkor kezelni, amikor tünetet ad, hiszen a korai kezelés nem változtat a prognózison.

Helyes válasz: B

366. Az I. típusú Diabetes Mellitus korai kezelése diétával történik.

Helyes válasz:

367. pars horisontalis inferior a duodenum része.

Helyes válasz: A

368. A coecum a duodenum része.

Helyes válasz: B

369. A Vater papilla a duodenumban helyezkedik el.

Helyes válasz: A

370. A pars descendens az ileum része.

Helyes válasz: B

371. A papilla duodenimajoron nyílik a ductus venosus Arantii.

Helyes válasz: B

372. A papilla duodeni majoron nyílik a ductus arteriosus Botalli.

Helyes válasz: B

373. A papilla duodeni majoron nyílik a ductus choledochus.
Helyes válasz: A
374. A portalis trias tagja az arteria interlobularis.
Helyes válasz: A
375. A porta hepatis tagja a vena hepatica.
Helyes válasz: B
376. A nervus facialis idegzi be a mimikai izmokat.
Helyes válasz: A
377. A TH⁺ sejtek CD4-es markert hordoznak.
Helyes válasz: A
378. A hemoglobin vastartalmú HEM része a májban szintetizálódik.
Helyes válasz: B
379. Az ösztrogének fokozzák az acinussejtek proliferációját és gátolják a tejtermelést.
Helyes válasz: B
380. Paraszimpatikus hatásra fokozódik a gasztrin és a gyomornedv termelés.
Helyes válasz: A
381. Az agytörzs érző, mozgató és vegetatív funkciói mellett a tudat éberségi állapotának szabályozásában is részt vesz.
Helyes válasz: A
382. Fényreflex során az egyik szem megvilágítása pupillaszűkületet vált ki mindkét szemben.
Helyes válasz: A
383. Az asthma bronchiale esetek 2/3-a allergiás reakció.
Helyes válasz: A
384. A Cushing-szindróma tünete a törzsön megjelenő stria.
Helyes válasz: A
385. Az acromegália gyermekkorban kialakuló hGH hiány.
Helyes válasz: B
386. Sclerosis multiplex shubokban jelentkező bakteriális eredetű betegség.
Helyes válasz: B

387. Az oxitocin a hipofízisben termelődik.

Helyes válasz: B

388. A heterozigóta egyedek egy gén két egyforma allélját hordozzák.

Helyes válasz: B

389. Az ikerképződés minden esetben azért történik, mert egy ciklusban egynél több petesejt érik meg.

Helyes válasz: B

390. Az őscsigolyák (somiták) az endoderma feltagolódásával jönnek létre.

Helyes válasz: B

391. A fejlődési rendellenességek hátterében mindig genetikai rendellenesség áll.

Helyes válasz: B

392. Környezeti hatások önmagukban, genetikai hiba nélkül is okozhatnak fejlődési rendellenességet.

Helyes válasz: A

393. A szuggesztív üzenetek lényege a befogadóra önkéntelenül hatnak.

Helyes válasz: A

394. Félelem, kiszolgáltatottság, fokozott érzelmi igénybevétel esetén, szokatlan helyzetekben szinte mindenkinél megnő a szuggesztív üzenetekre való fogékonyság.

Helyes válasz: A

395. A szuggesztív kérdés olyan kérdés, amely nem sugallja a kérdező által elvárt választ.

Helyes válasz: B

396. A betegséggel összefüggő észlelt kontroll befolyásolja a betegség kimenetelét.

Helyes válasz: A

397. A betegséggel összefüggő észlelt kontroll csökkenése csökkenti a betegség során megnövekedett stresszt.

Helyes válasz: B

398. A tanult tehetetlenség elmélete szerint befolyásolhatatlan negatív események fásultsághoz, depresszióhoz vezethetnek.

Helyes válasz: A

399. A placebo azt jelenti, hogy a beteg állapotában olyan javulás következik be, amely nem tulajdonítható a kezelésnek.

Helyes válasz: A

400. Amit tudunk, gondolunk, érzünk a betegségünkkel kapcsolatban, azok nincsenek hatással a terápia sikerességére.

Helyes válasz: B

401. A gyógyító-beteg kapcsolat minősége, az interakciók jellege nem befolyásolja a tünetek alakulását és a kezelés sikerességét.

Helyes válasz: B

402. Az érzelem összetett, többkomponensű epizód, amely cselekvésre sarkall.

Helyes válasz: A

403. A nemhez igazodás a társadalom által az adott nem számára megfelelőnek tartott viselkedések és tulajdonságok elsajátítása.

Helyes válasz: A

404. A szociális tanuláselmélet a nemnek megfelelő és az azzal ellentétes viselkedésért kapott jutalmazások és büntetések szerepét hangsúlyozza.

Helyes válasz: A

405. A filmben látott agresszív modellek nem növelik az azt néző gyermekekben az agresszivitás megjelenésének valószínűségét.

Helyes válasz: B

406. Az énsémák nem csak irányítják a percepciónkat és információ-feldolgozó folyamatainkat, hanem az információk szervezésében és tárolásában is részt vesznek.

Helyes válasz: A

407. A reális én és az ideális én között nem tartható egészségesnek, ha teljes összeillés jött létre.

Helyes válasz: A

408. Az alapvető attribúciós hiba az, amikor egy személy viselkedésében a külső (szituációs) okoknak nagyobb súlyt tulajdonítunk a valóságosnál.

Helyes válasz: B

409. Milgram engedelmisséget vizsgáló kísérlete, a vezetői funkciók sikerességét tanulmányozza egy erős normákkal rendelkező csoportban.

Helyes válasz: B

410. Milgram engedelmisséget vizsgáló kísérlete, az állatok kondicionálhatóságát mutatja be.

Helyes válasz: B

411. Milgram engedelmisséget vizsgáló kísérlete, azt mutatja be, hogy tekintélyszemély hatására nagyfokú engedelmisség jellemző az emberek nagy részére.

Helyes válasz: A

412. Az egészségnevelés mindig bipoláris tevékenység.

Helyes válasz: A

413. Az egészségfejlesztő kommunikációban a passzív figyelem a helyes stratégia.

Helyes válasz: B

414. A helyes egészségmagatartás elemei között szerepel az időben történő szakemberhez fordulás. IGAZ

Helyes válasz: A

415. A családi minta az egészségmagatartás kialakulásában a szocializáció során vésődik be.

Helyes válasz: A

416. A kommunikációt akkor nevezzük kongruensnek:

- ha a verbális csatorna dominál a kommunikációban

Helyes válasz: B

- ha a nem verbális elemek határozzák meg a jelentést a verbálissal szemben

Helyes válasz: B

- ha a verbális és nem verbális közlések összhangban vannak

Helyes válasz: A

- ha a verbális és nem verbális csatorna üzenete ellentmond egymásnak

Helyes válasz: B

417. Az átkeretezés olyan kommunikációs stratégia, amikor:

- az adott helyzetnek más közeget, értelmezési keretet adunk

Helyes válasz: A

- tudatosan torzítjuk a rendelkezésünkre álló információt

Helyes válasz: B

- kérdésekkel más irányba tereljük a kommunikációt

Helyes válasz: B

- egymás után olyan kérdéseket teszünk fel, amikre „igen” választ kapunk

Helyes válasz: B

418. Az agresszió szociális tanuláselmélete kinek a nevéhez fűződik?

- Sigmund Freud

Helyes válasz: B

- Abraham Maslow

Helyes válasz: B

– Albert Bandura

Helyes válasz: A

– Erik Erikson

Helyes válasz: B

419. Az attribúció:

– a rokonszenvi választások közösségen belüli eloszlását jelöli

Helyes válasz: B

– Albert Bandura

Helyes válasz: A

– a sztereotípiák egyik típusa

Helyes válasz: B

– az én és a másik közötti egyensúlyt jelenti.

Helyes válasz: B

IV. Reláció analízis

A – Mindkét tagmondat igaz, és van összefüggés közöttük.

B – Mindkét tagmondat igaz, de nincs összefüggés közöttük.

C – Az első tagmondat igaz, a második hamis.

D – Az első tagmondat hamis, a második igaz.

E – Mindkét állítás hamis.

1. Az átmeneti bradycardia hátterében leggyakrabban a véna cava kompressziós szindrómája áll, ezért célszerű először a várandóست bal oldalára fordítani, mely által a probléma megoldódik. – „A”

Helyes válasz: A

2. A várandósgondozás első alkalmával nagy hangsúlyt helyezünk a kórelőzmény pontos felvételére, mert ezáltal adott esetben elősegíthetjük a helyes kórisme megállapítását.

Helyes válasz: A

3. A tágulási szak kezdetén a magzati koponya elvégzi az első forgását a flexiót, azaz a magzati áll a szegycsonttól távolodik.

Helyes válasz: C

4. A lepényi szakban a telt húgyhólyag nem gátolhatja a méhösszehúzódásokat, feleslegesen nem célszerű csapolást végezni.

Helyes válasz: D

5. A lepényi szak során fontos a lepény és a burok vizsgálata, mert ezáltal a gyermekágyban súlyos szövődmények keletkezhetnek.

Helyes válasz: C

6. Gyermekágyas időszaknak a szülést követő egy hetet értjük, ezen időszak alatt a reprodukív szervek a terhességet megelőző állapotba visszafejlődnek.

Helyes válasz: B

7. A szülés után a méh involúciója lassú ütemű, mert a szülés után a méh fundusa a köldök magasságában tapintható.

Helyes válasz: B

8. Méhrepedésen a méh falának átszakadását értjük a hüvelyboltozat feletti szakaszon, vagyis a méhrepedés a legsúlyosabb szülési szövődmények közé tartozik.

Helyes válasz: B

9. A húgycsőkatéter bevezetése esetén műtői sterilitást kell betartani, mert a nozokómiális fertőzés lehetősége igen magas.

Helyes válasz: A

10. Egyes veszélyeztetett várandósoknál, a szokásosnál is nagyobb a vitamin és ásványi anyag igény, így ez legkönnyebben multi vitamin készítménnyel oldható meg a WHO ajánlását figyelembe véve.

Helyes válasz: A

11. Obesitas esetén a macrosomia előfordulása gyakoribb, mivel a háttérben általában gestációs diabetes áll.

Helyes válasz: A

12. A mellbimbó myelinhüvely nélküli idegvégződéseket is tartalmaz, ezért extrém fájdalmat okozhat egy helytelen pózban szopó újszülött.

Helyes válasz: A

13. A Humán Papilloma Vírus egyes típusai magas, mások alacsony onkogén potenciállal rendelkeznek.

Helyes válasz: B

14. Atóniás vérzés esetén fontos a húgyhólyag kiürítése, mert a katéter használatával megelőzhető az infekció kialakulása.

Helyes válasz: C

15. Szoptatáskor fontos az emlők teljes kiürítése, mert ennek hiányában mastitis alakulhat ki.

Helyes válasz: A

16. A Turner szindrómára jellemző alacsony termet már kisgyermekkorban feltűnő, mert szabályos ováriumszövet nem mutatható ki.

Helyes válasz: D

17. Minden hüvelyfertőzés legsúlyosabb szövődménye az ascensio, ezért azonnali antibiotikum kezelést igényelnek.

Helyes válasz: E

18. Jelenleg a legeredményesebben szűrhető nőgyógyászati daganat a méhnyakrák, mert a CA-125 nem elég specifikus petefészekrák esetén.

Helyes válasz: B

19. A HPV szerepet játszik a vulvarák etiológiájában, mert a vulvarák elsősorban az idősebb kor betegsége.

Helyes válasz: B

20. A méhnyakrák etiológiájában a HPV alapvető szerepet játszik, mert az, a HPV-t hordozó nőkben minden esetben kialakul.

Helyes válasz: C

21. A mélyvénás thrombosis kockázata négyszer nagyobb a fogamzásgátló tablettát szedő nőknél, mert a thrombosis kialakulásáért a gesztagén komponens a felelős.

Helyes válasz: C

22. Az IUD tényleges fogamzásgátló hatást fejt ki, mivel a méhürbe helyezett eszköz többek közt gátolja a spermiumok feljutását a tubába.

Helyes válasz: E

23. Az Asherman –syndroma egyik vezető tünete a sterilitás lehet, mert kialakulásában szerepet játszhat az endometrium basalis rétegének megsértése, egy nem kellő kíméletességgel végrehajtott abrasio vagy interruptio során.

Helyes válasz: A

24. Asherman –syndroma secunder amenorrhoeát okozhat, mert összenövések képződnek a petevezetőkben.

Helyes válasz: C

25. A menopausa időszakában indokolt elvégezni a szérum lipoproteinek meghatározását is, mert a menopausában a cardiovascularis megbetegedések aránya nő.

Helyes válasz: A

26. Cink suplementáció javasolt krónikus alkoholfogyasztó és dohányzó várandósnál, mert cinkhiányban fejlődési rendellenességek, intrauterin retardáció, koraszülés fordulhat elő.

Helyes válasz: A

27. A speciális tornagyakorlatokkal kedvezően befolyásolható a várandós testi-lelki állapota, így jó hatással van a szülés kimenetelére és csökkenti a szülés alatt átélt fájdalmat.

Helyes válasz: A

28. A várandósság alatt az alsó végtagokból nehezített a vénás visszaáramlás, ezért gyakori a vulván és az alsó végtagon a varicositas.

Helyes válasz: A

29. A várandósság során a hemoglobin tartalom csökken, aminek egyik oka a haemodilutio.

Helyes válasz: A

30. A fogszuvasodás terhességben gyakoribb, mert a nyál összetétele megváltozik.

Helyes válasz: A

31. A gyomrot a növekvő méh balra és felfelé nyomja, így a cardia tónusa nő.

Helyes válasz: C

32. Várandósnál az alapanyagcsere csökken, mivel a pajzsmirigy csökkent működése jellemző.

Helyes válasz: D

33. Várandóság alatt a bélműködés renyhül, mert a progeszteron simaizom-ellazító hatása érvényesül.

Helyes válasz: A

34. A várandósság alatt a húgyhólyag vizeletretenciós készsége miatt gyakoribb lehet a hólyaghurut, mivel jellemző a bővebb hüvelyi folyás is.

Helyes válasz: C

35. A várandós testtartása megváltozik, mivel az arcon acromegaloid tünetek is jelentkezhetnek.

Helyes válasz: B

36. Külső vizsgálattal, a tágulási szak végén, a magzati koponyának csak egy része tapintható, mivel a tágulás folyamán már mélyen rögzül a koponya a csontos medence bemenetébe.

Helyes válasz: A

37. A várandósság alatti vérzések mindig a placenta tapadási rendellenessége miatt jönnek létre, mert a méhlepény részt vesz az intrauterin steroidszintézisben.

Helyes válasz: D

38. Diabeteszes anyák macrosom újszülötteinél gyakran fordul elő hypoglykaemia, ezért alapvető fontosságú orális antidiabetikumokkal normoglykaemiás szintet biztosítani a terheseknél, különösen az organogenesis idején.

Helyes válasz: C

39. A várandósság alatti tünetmentes bakteriuriát bakteriológiai tenyésztéses vizsgálat eredménye alapján célzottan kezelik, mert az aszimptómás bakteriuriához gyakran társul koraszülés és intrauterin retardáció.

Helyes válasz: B

40. Amennyiben gestációs diabetesnél a normoglykaemia diétával nem tartható fenn, akkor inzulinkezelést alkalmaznak, mivel ezzel előzhető meg a macrosomia és az ebből adódó szülészeti szövődmények.

Helyes válasz: A

41. Az appendicitis okozta fájdalom tisztán zsigeri eredetű, és így mindig a megfelelő Head - zónába is vetül, ezért terhességben a McBurney-pont fájdalma értékelhető jel, annak ellenére, hogy a féregnyúlvány a szokásosnál magasabbra kerül.

Helyes válasz: A

42. Az utolsó évtizedben a gyermekágyban jelentkező thromboembóliás megbetegedések gyakorisága csökkent, mert a szülés utáni korai mobilizálás és az anticoaguláns profilaxis gyakorlattá vál

Helyes válasz: A

43. A vetélés mechanizmusa a 16.terhességi hét után kétszakaszos, ezért ilyenkor a vetélések műszeres befejezése indokolt.

Helyes válasz: A

44. A terhesség alatt fellépő thromboembóliát kis dózisú heparinnal kell kezelni, mert a Sycumarnak magzatkárosító hatása van.

Helyes válasz: D

45. 40-60% a valószínűsége, hogy a magzat fejlődési rendellenességgel születik, ha a friss rubeolafertőzés az anyánál a terhesség 8.hete előtt zajlik le, mert pozitív összefüggés van az anyánál koraterhességben lezajlott friss rubeolafertőzés és a magzati fejlődési rendellenességek között.

Helyes válasz: A

46. Jól szopó csecsemő esetén is szükséges a rendszeres teáztatás, mert az egészséges csecsemőnek az anyatejen felül is van folyadékigénye.

Helyes válasz: E

47. Az anyatejjel táplált csecsemő súlyfejlődése mindig gyorsabb, mint a tápszerrel tápláltaké, mert a laktáció ideje alatt az anyatej összetétele változik.

Helyes válasz: D

48. A női tej és a tehéntej tápanyag összetétele sokban különbözik, mert a női tej fehérjetartalma többszöröse a tehéntejének.

Helyes válasz: C

49. Az egészséges terhességben gyakran figyelhető meg emelkedett fehérvérsejtszám, mert a terhességben a fehérvérsejtek élettartama megnő.

Helyes válasz: C

50. A terhesség első felében a vérnyomás jelentősen emelkedik, mert már az első trimeszter végén a perctérfogat közel 20%-al nagyobb a terhesség előtti értékhez viszonyítva.

Helyes válasz: D

51. Várandósság alatt gyakrabban figyelhető meg a jobb oldali vese pyelectasiája, mert a méh jobbra dől és gyakran komprimálja az uretert.

Helyes válasz: A

52. Várandósság alatt a belek renyhe perisztaltikája gyakran tapasztalható, mert a lassúbb passage következtében fokozott a vízfelszívódás.

Helyes válasz: B

53. Súlyos praeeclampsziában szenvedő várandóst mindig meg kell operálni, mert soha sincs esélye a hüvelyi szülésre.

Helyes válasz: E

54. Praeeclampsziás nőnek csak metildopa vagy nifedipin adható vérnyomáscsökkentőként, mert minden már vérnyomáscsökkentő szer fejlődési rendellenességet okoz.

Helyes válasz: E

55. Terhesség alatti súlyos hypertonia kezelésére gyakran alkalmazunk nifedipint, mert nem okoz drasztikus vérnyomáscsökkenést és nem befolyásolja az uteroplacentaris vérkeringést.

Helyes válasz: A

56. A nifedipin növelheti az anyai pulzusszámot ezért egyidejűleg mindig metoprololt is adunk.

Helyes válasz: C

57. Down-szindróma diagnosztizálása ma már anyai vérből történik, a magzati kariotipoizálás az anyai vérből is elvégezhető.

Helyes válasz: E

58. Gesztációs diabetes terápiájának ellenőrzése céljából vércukor-profil vizsgálatot végzünk, mert így tudunk meggyőződni a szénhidrát-anyagcsere egyensúlyáról.

Helyes válasz: A

59. A lochiapangás leggyakoribb oka a méhszáj korai záródása, ezért ennek gyanúja esetén ellenőrizni kell a méhszáj tágasságát.

Helyes válasz: A

60. Súlyos praeeclamsiában mindig kell convulsio-profilaxist (iv. magnézium adása) alkalmazni, mert a magnézium csökkenti a görckésztséget.

Helyes válasz: A

61. A gyermekágyas anyák részére indokolt a rostdús étrend, mert a növényi rostok segítik a székletképződést.

Helyes válasz: A

62. A hüvelyi vizsgálat tilos placenta praevia esetén, mert fokozza a lepény leválását és a vérzést.

Helyes válasz: A

63. A kissúlyú újszülött születési súlya kevesebb, mint 2500g, mert általában a 39.gestációs hét előtt született újszülöttek tartoznak a kissúlyú kategóriába

Helyes válasz: C

64. Fenyegető koraszülés esetén a szteroid prophylaxist alkalmazunk, mert a szteroid megelőzi a koraszülést

Helyes válasz: C

65. Idő előtti burokrepedés esetén antibiotikum prophylaxist alkalmazunk, mert IEBR-t mindig chorioamnionitis okoz.

Helyes válasz: C

66. Partialis abruptio placentae esetén feltétlen a terhesség befejezésére kell törekedni, mert az abruptio placentae mind a magzat, mind az anya szempontjából életveszélyes állapot lehet.

Helyes válasz: D

67. Praeclampsia esetén MgSo₄ adása jótékony hatású, mert csökkenti a görcskészséget és a vérnyomásra is kedvező

Helyes válasz: A

68. Az embrionális korszak során jönnek létre a legfontosabb belső szervek kezdeményei, ezért ebben a fejlődési korszakban a külső ártalmak gyakran súlyos fejlődési rendellenességeket hoznak létre.

Helyes válasz: A

69. A születendő gyerek nemét a hímivarsejt határozza meg, mert a petesejtben biztosan X kromoszóma van.

Helyes válasz: A

70. A postplacentáris szakban fontos a szülő két órán keresztül tartó, szoros megfigyelése, mert, ebben az időszakban a legnagyobb a postpartum vérzés kialakulásának a kockázata.

Helyes válasz: A

71. Császármetszés során ha corporális (longitudinális) metszést végzünk, akkor a magzat kiemelése könnyebb, ezért harántfekvésben elhelyezkedő magzat esetén, ha elfolyt a magzatvíz és az uterus fala a magzatra ráhúzódik előnyben részesítjük.

Helyes válasz: A

72. Az incret lepeny lehetősége color Doppler ultrahangvizsgálattal valószínűsíthető, ezért előzetes császármetszés után, ha placenta praevia áll fenn color Doppler ultrahangvizsgálatot kell végezni.

Helyes válasz: A

73. A gyermekágyas időszakban a székürítési nehézséget leggyakrabban az aranyér okozza, amit célszerű a szülés utáni napokban megoperálni.

Helyes válasz: C

74. Terhességi hipertóniában az atenolol adása nem javasolt, mert a magzat növekedési retardációját okozza.

Helyes válasz: A

75. PCO-szindróma kezelésére metformint adhatunk, mert ez a gyógyszer az inzulinérzékenységet növeli.

Helyes válasz: A

76. A Trichomonas vaginalis kezelésére tetracyclint adunk, mert ez a gyógyszer helyreállítja a hüvely flóráját.

Helyes válasz: E

77. A hüvely gombás fertőzése csak lokálisan kezelhető, mert a szájon át adott gombaellenes gyógyszerek tönkreteszik a hüvely flóráját.

Helyes válasz: E

78. Az anti - Müllerian hormonszint a petefészek petesejt tartalékát jelzi, ezért a meddőségi kivizsgálásban fontos a meghatározása.

Helyes válasz: A

79. Bakterialis vaginózis oka a lactobacillusok túlszaporodása a hüvelyben, ezért kezelésére metrodinazolt adunk.

Helyes válasz: D

80. A praeeclampsia degfinitív terápiája a terhesség befejezése, ezért praeeclamposia esetén mindig császármetszést kell végezni.

Helyes válasz: C

81. Praeclampsziás várandósnál felesleges szteroid-profilaxist alkalmazni, mert a rossz placenta vérkeringés miatt a szteroid nem jut át a magzatba.

Helyes válasz: E

82. Az I típusú méhtestrák rosszabb prognózisú, mint a II típusú, mert a II típusú korán betör a nyirokerekbe és az érhalózatba.

Helyes válasz: D

83. A corpus carcinoma szűrésére hatékony eljárással nem rendelkezünk ezért vastag endometrium esetén sem érdemes frakcionált abrasiót végezni.

Helyes válasz: C

84. A vastag endometrium postmenopausában levő nőnél frakcionált abrasio javallatát képezi,

mert a megvastagodott endometrium háttérében méhnyálkahártya rák lehet.

Helyes válasz: A

85. A myoma subserosum növeli a meddőség esélyét, mert deformálja az uterus üregét, és megakadályozza a beágyazódást.

Helyes válasz: E

86. Episiotómia előtt nem kötelező a gát érzéstelenítése, mert a gát már annyira elvékonyodott a koponya nyomásának köszönhetően, hogy az anya úgysem érzi a vágást.

Helyes válasz: E

87. Az atosiban oxitocin antagonistá gyógyszer, ezért hatékony tokolítikum.

Helyes válasz: A

88. A nifedipin hatékony vérnyomáscsökkentő terhességben, ezért ajánlott használata a várandósságban atenolollal való kombinációban.

Helyes válasz: C

89. A methyldopa nem adható vérnyomáscsökkentő az I. trimeszterben, mert számos fejlődési rendellenességet okoz.

Helyes válasz: E

90. Az epidural analgészia leggyakoribb mellékhatása a fájásgyengeség, ezért mellette mindig Oxytocint tartalmazó infúziót is alkalmazunk.

Helyes válasz: A

91. A durapunctio után fejfájás jelentkezhet, ezért a betegnek bőséges mennyiségű folyadékot kell fogyasztania és vízszintesen kell feküdnie.

Helyes válasz: A

92. Az color Doppler ultrahangvizsgálat során észlelt korai diasztolés kimélyülés (NOTCH) kóros uteroplacentaris vérkeringésre utal, ezért ennek jelentkezésekor a terhességet azonnal le kell zárni.

Helyes válasz: C

93. Az uterus üregében levő IUD egyszerű ultrahangvizsgálattal nem mutatható ki, mert csak kontrasztanyag alkalmazásával észlelhető echodús képletként.

Helyes válasz: E

94. A magzat hydrocephalusa születési akadályt okozhat, ezért fennállása esetén mindig császármetszést kell végezni.

Helyes válasz: C

95. A várandósság alatt az előzetes császármetszés hege spontán szétválhat, ezért a III. trimeszterében kötelező a hegvastagság mérése.

Helyes válasz: C

96. A szülés után nem alakul ki HELLP-syndroma, mivel csak terhességben fejlődhet ki.

Helyes válasz: E

97. A betöltött 42. terhességi hét után beszélünk túlhordásról, mely a magzat szempontjából veszélyes mert gyakrabban fordulnak elő perinatalis szövődmények.

Helyes válasz: A

98. Az idő előtti burokrepedés hátterében gyakran chorioamnionitis áll, ezért különösen fontos a gyulladásos paraméterek (fehérvérsejt szám, CRP, hőmérséklet ellenőrzése).

Helyes válasz: A

99. Spinalis érzéstelenítés egyik leggyakoribb szövődménye a fejfájás, aminek oka a durapunctiót követő liquorcsorgás.

Helyes válasz: A

100. A praeeclampia lefolyása megjósolhatatlan, ezért fontos a beteg körültekintő megfigyelése.

Helyes válasz: A

101. Alapesetben a tizenöt éves beteg mellett a kórházban bent tartózkodhat az édesanyja, mert a tizenöt éves beteg kiskorúnak számít.

Helyes válasz: A

102. A csekély kockázatú invazív ellátások esetében nem szükséges írásbeli beleegyezés, mert a beteg közvetlen életveszélye esetében a beteg beleegyezésére nincs szükség.

Helyes válasz: B

103. A kóros elmeállapot büntethetőséget kizáró vagy korlátozó ok, mert bűncselekményt csak szándékosan lehet elkövetni.

Helyes válasz: C

104. A különböző személyek ugyanazt a szituációt különböző módon értelmezik, mert a megfigyelt emberek személyisége más hatással van a megfigyelő személyekre.

Helyes válasz: A

105. Az attribúciós torzítás a rokonszenvi választások erejét növeli a csoportban, mert az attribúció azonosulást vált ki.

Helyes válasz: E

106. A benyomások kialakulásánál az elsőbbségi hatást a másokról alkotott vélemény alakulásánál nem tudták kimutatni, mert a sztereotípiák alapján is vonunk le következtetéseket másokról.

Helyes válasz: B

107. Az alapérzelmeket kísérő arckifejezéseket egyetemesnek tekinthetjük mivel a még nagyon távoli kultúrákból származó emberek is ugyanúgy értelmezik a fényképen látott arcok érzelmeit.

Helyes válasz: A

108. A fejlődés tekintetében beszélhetünk kritikus vagy szenzitív periódusokról, mivel ezekben a kritikus vagy szenzitív periódusokban be kell következnie.

Helyes válasz: A

109. Piaget szerint a gyermek a világ működésére vonatkozó sémákat alkot, ezért az új információt a már meglevő sémái segítségével kísérli meg megérteni.

Helyes válasz: A

110. A sztereotípiák önfenntartó jellegűek, mert a séma alapú feldolgozásból erednek és a sémákat nehezen változtatjuk meg.

Helyes válasz: A

111. Thomas és Chess temperamentumvizsgálata alapján 4 csoportba sorolhatók a csecsemők mert ezek a következők: Könnyű temperamentumú, nehéz temperamentumú, lassan felmelegedő temperamentumú, bizonytalan temperamentumú.

Helyes válasz: E

112. Mary Ainsworth „Idegen helyzet teszt” módszerrel demonstrálta a gyermekek már születésükkor kiütöző temperamentum különbségeit, aki az idegen helyzet módszerrel 12-18 hónapos gyermekeknél megmutatkozó 4 kötődési mintázatot figyelt meg az elsődleges gondozó iránt.

Helyes válasz: D

113. A pedagógia társadalomtudományok közé tartozik, mert magyarul a szó neveléstudományt jelöl.

Helyes válasz: B

114. Az egészségmagatartásban nagy szerepe van az egyéni felelősségnek, mert csak az egyén döntéseitől függ az egészségmegőrzés minősége.

Helyes válasz: C

115. A prevenció másodlagos szintje a rehabilitációt is magában foglalja, mert a prevenciós szintek egymással szoros kapcsolatban állnak.

Helyes válasz: D

116. A kongruens egészségfejlesztő kommunikáció a legeredményesebb, mert a segítő szakember verbális és nonverbális jelzései között összhangnak kell lennie.

Helyes válasz: A

117. A betegedukációnak nem lehet része az empátia, mert a segítő kiégésének prevenciója a beleélés mértékén is múlik.

Helyes válasz: D

118. A legoptimálisabb egészségnevelési eljárás kiválasztása több tényezőn múlik, mert a módszerválasztás függ a célcsoporttól, infrastruktúrától, célkitűzéstől.

Helyes válasz: A

119. Az anyatejjel táplált koraszülöttek túlélési esélye nagyobb, mert alacsonyabb a fertőzések és a NEC előfordulási aránya a tápszerrel táplált babákhoz képest.

Helyes válasz: A

120. Koraszülöttek esetében a köldökzsinór késleltetett (legalább 30-45 sec) lefogása indokolt, mert a placentó-fetális transzfúzió az újszülött édesanya alatti helyzetével segíthető elő.

Helyes válasz: B

121. A koraszülöttek bőre vékony és sérülékeny, ezért emolliensek használata javasolt, melyek mechanikai barriert képeznek a bőrön.

Helyes válasz: A

122. Ha az újszülött légzése elégtelen vagy hiányzik pozitív nyomású lélegeztetést kell kezdeni, a pozitív nyomású lélegeztetést hatékonyan csak öntelődő ballonnal lehet végezni.

Helyes válasz: C

123. Crupos állapot esetén kerülni kell az orális folyadék adását, ezért Crupos gyermek kórházi felvételénél meg kell határozni a kiszáradás súlyosságát.

Helyes válasz: D

124. Hemokultúra elrendelése esetén a mintát a lázas epizód legkorábbi szakaszában kell venni, mert a mikroorganizmusok a hidegrázás és a láz fellépése előtt 60-90 perccel árasztják el a vérpályát.

Helyes válasz: A

125. Az előre gyártott LMWH fecskendőket légtelenített állapotban forgalmazzák, ezért azokat nem szükséges légteleníteni.

Helyes válasz: D

126. Az alacsony glikémiás indexű élelmiszerek gyorsan bomlanak le, ezért a vércukorszintet lassabban, egyenletesebben emelik.

Helyes válasz: D

127. A post-expozíciós profilaxist (PEP-et) azonnal el kell indítani a lehetséges expozíció után, legfeljebb 72 óra után, mert annak hatékonysága csak így biztosítható.

Helyes válasz: A

128. Csontritkulás esetén a csont felületi sűrűségének értéke az adott népességre jellemző fiatalkori csúcscsontsűrűségtől az ehhez az értékhez tartozó szórás legalább 2,5-szeresével negatív irányban tér el, ezért ezt az értéket Z-score-nak nevezzük.

Helyes válasz: C

129. Műtéten áteset beteg esetében elengedhetetlen a magas fehérje bevitel, mert a magas fehérjeszint elősegíti a mihamarabbi sebgyógyulást.

Helyes válasz: A

130. Peritonitis műtéti ellátása során a hasüregből mikrobiológiai tenyésztésekre mintákat kell venni, és a tenyésztés alapján kell célzott antibiotikumot adni a betegnek.

Helyes válasz: A

131. Műtét után, ha betegnél láz jelentkezik, azt a kezelőorvosnak jelenteni kell, mert a láz műtéti szövődményre utalhat.

Helyes válasz: A

132. Kontraindikált az LMWH beadása hasi műtétek esetében a hasba, mert a keletkezett haematoma nem ítéltető meg hogy műtéti szövődmény vagy az injekció miatt alakult ki.

Helyes válasz: A

133. Műtét előtt a beteget tájékoztatni kell, hogy műtét utáni ápolás során mi vár rá, mert ezzel a beteg szorongása nagy mértékben csökkenthető.

Helyes válasz: A

134. Lázas beteg ápolásánál fontos a megfelelő folyadékbevitel biztosítása, **mert** a testhőmérséklet napi ingadozása fízológias körülmények között is megfigyelhető.

Helyes válasz: B

135. Az aszepszis a fertőzéseket, különösen a sebfertőzést kiküszöbölni, megelőzni hivatott munkamódszer, **mert** minden, ami testüregekbe kerül sterilnek kell lennie.

Helyes válasz: A

136. A fájdalom egy szubjektív tünet, mert fontos hogy GCS skálával objektivizáljuk.

Helyes válasz: C

137. Katéterezés előtt elvégzendő a genitáliák szappanos, meleg vizes, tisztító lemosása, mert ezzel is csökkentjük az uroinfekciók rizikóját.

Helyes válasz: A

138. Vervétel során be kell tartani az ajánlott cső sorrendet mert így csökkenthető a preanalitikus hiba.

Helyes válasz: A

139. Az I. típusú diabetes mellitus autoimmun betegség, ezért a patomechanizmusa inzulin rezisztencián alapul.

Helyes válasz: C

140. Az idős betegek csípőtáji töréseinek kezelésekor előtérbe helyezzük a műtét nélküli konzervatív kezelést, mert számukra döntő jelentőségű a minél gyorsabb mobilizás.

Helyes válasz: D

141. A sérvек abszolút műtéti indikációt jelentenek, mert műtét nélkül a sérvkapu záródására nincs esély felnőtt korban.

Helyes válasz: D

142. A duodenalis ulcusok terápiájában antibiotikum kombinációk is szerepet kapnak, mert az ulcusok kialakulásában a savtermelés rendellenes volta is közrejátszik.

Helyes válasz: B

143. A daganatok kezelésében a műtét utáni kemoterápiának is nagy jelentősége van mert a citosztatikumok az egészséges szövetekben is csökkentik a sejtosztódások számát.

Helyes válasz: B

144. Az akut hasi katasztrófa leggyakoribb oka a mechanikus bélelzáródás, mert a kialakuló peritonitis mindig paralitikus ileust okoz.

Helyes válasz: D

145. A glaucoma sok esetben tünetmentesen halad előre, a beteg csak jelentősebb látótérkieséssel, későn kerül orvoshoz, ezért fontos a szűrése.

Helyes válasz: A

146. A bevérvzéses bőrelváltóások súlyos belgyógyászati betegség bőrtűnetei is lehetnek, ezért elklűlőnítésűk űveg felűlet rányomásaával tőrténik

Helyes válasz: B

147. A cataracta kezelése műtėti, mert a szemnyomás csőkkentése a leghatékonyabban műtéttel lehetséges

Helyes válasz: C

148. A győgyyszerkipróbálásban való részvétel önkéntes, mert a kísérletben résztvevő személy bármikor felfűggesztheti az ebben való részvételét

Helyes válasz: A

149. Győgyyszerkombinációk alkalmazása minden esetben előnyös, mert kisebb dózisban alkalmazva a győgyszerspecialitásokat kevesebb mellékhatással kell számolnunk

Helyes válasz: D

150. A digitalisok szívelégtelenségben alkalmazandó széles terápiás indexű szerek, mert a terápiás dózisuk és halálos dózisuk közti különbség nagy.

Helyes válasz: E

151. Az aszpirin hatásosan csőkkenti a lázat, a reumatikus ízületi gyulladást, az izom- és fejfájást, mert az aszpirin thrombocyta-aggregáció gátló hatású 100mg-os dózisban.

Helyes válasz: B

152. Ha a terápiás index kicsi, a dózis kismértékű növelése is már toxikus hatást vált ki, mert a terápiás index LD50/EC50.

Helyes válasz: C

153. A NSAID-ok antiinflammatorikus, analgetikus és antipiretikus hatással rendelkeznek, a NSAID-ok hematológiai mellékhatásként agranulocitózis, aplasticus anaemia jelentkezhethet.

Helyes válasz: B

154. Az ismétlődő sigmabél diverticulitis illetve szövődményei miatt általában sigmabél rezekciót végeznek. Mechanikus ileus esetében nem készítene azonnali anastomosist rezekció után (Hartmann műtét).

Helyes válasz: A

155. A gastrointestinalis vérzések közül legmagasabb a halálozás nyelőcsővisszér ruptura után, mert májelégtelenséget okoz

Helyes válasz: C

156. A subtotalis oesophagectomia esetén az anastomosist a rekesz felett, a mellkasban végzik, mert ott jobb a sebgyógyulás.

Helyes válasz: E

157. Hiatus hernia esetén a nyelőcső alsó sphincterének működése megtartott, ezért a műtéti kezelése lehet funduplicatio.

Helyes válasz: D

158. Enterostomia készíthető anastomosis tehermentesítésére, mert az enterostoma lehet kétnyílásos is.

Helyes válasz: B

159. Nagy pajzsmirigy göb akkor is abszolút műréti indikáció, ha nem okoz kompressziós tüneteket, mert a göb változhat, és ennek folyamatát observálni kell.

Helyes válasz: D

160. Thromboprophilaxis nélkül a mélyvénás thrombosis az általános sebészetben a leggyakoribb szövődmények közé tartozik, ezért a fél óránál tovább tartó műtétek esetében mindenképpen javasolt K vitamin antagonistá kezelés beállítása.

Helyes válasz: C

161. Az aneurysma érfal hiány következtében kialakult körülírt értágulat, mert az aneurysma kialakulásának leggyakoribb oka az arteriosclerosis és magasvérnyomás.

Helyes válasz: D

162. Artériák krónikus elzáródásában jól alkalmazható a thrombectomy, mert a thrombendarterectomy nem elég hatásos

Helyes válasz: E

163. A tüdőrák szűrése mellkas átvilágítással történik, ezért a tüdőrák halálozás beletartozik a megelőzhető halálokok közé.

Helyes válasz: D

164. Magyarországon az egészségügyi ellátás állampolgári jogon jár, mert Magyarországon az egészségbiztosító finanszírozza az egészségügyi ellátást.

Helyes válasz: D

165. Az autoimmun betegségek laboratóriumi diagnózisában az autoimmuntestek szerepet játszanak, és az antitestek bizonyos tünetek kiválasztásáért felelősek.

Helyes válasz: A

166. Az aorta szűkület gyanújakor meg kell mérni az alsó végtagon is a vérnyomást, mert, ha aortaszűkülete van a betegnek az alsó végtagon magas a vérnyomás.

Helyes válasz: C

167. A NYHA stádiumok a szívelégtelenség súlyosságát ítélik meg, és fontos szerepet játszanak a betegség prognózisának a halálos szövődmény valószínűségének megítélésében is.

Helyes válasz: A

168. Mindennapi rendszeres alkoholfogyasztásnak is lehet egészségkárosító hatása, mert a dél európai népességben nagyobb az alkoholfogyasztás mint az észak európai népességben.

Helyes válasz: C

169. A thalamus a III. agykamra oldalfala, mert a thalamus felett húzódik a hypothalamus.

Helyes válasz: C

170. A III. agykamra alapja a hypothalamus, mert a hypothalamus a somaticus idegrendszer központja.

Helyes válasz: C

171. A III. agykamra alapja a corpus fornicis, mert a corpus fornicis a fornix része.

Helyes válasz: D

172. Az oldalkamra pars centralisának alapja a hypothalamus, mert a hypothalamus a vegetatív idegrendszer központja.

Helyes válasz: D

173. Az oldalkamra pars centralisának alapja a thalamus, mert a thalamus elnevezése magyarul a nyoszolya.

Helyes válasz: B

174. A nervus facialis vegetatív magja a nucleus salivatorius superior, mert a glandula submandibularis idegzi be secretorosan.

Helyes válasz: A

175. A nervus facialis viscerosensoros magja a nucleus tractus solitarius, mert a nervus facialis beidegzi secretorosan a parotist.

Helyes válasz: C

176. A nervus facialis beidegzi a mimikai izmokat, mert a platysmát a VIII. agyideg idegzi be.

Helyes válasz: C

177. Az articulatio radiocarpeae tojás ízület, mert az ízfelszín cipőtalp alakú.

Helyes válasz: A

178. Az articulatio intercarpea feszes ízület, mert az az articulatio sacroiliaca is az.

Helyes válasz: B

179. A vörösvértestekben csak anaerob glükóz bontás történik, mert sejtplazmájuk nem tartalmaz mitokondriumokat.

Helyes válasz: A

180. A szülés után gestációs diabetes alakulhat ki, mert a megváltozott hormonháztartás növeli a sejtek glükóztoleranciáját.

Helyes válasz: E

181. A vas felszívódásának feltétele, hogy a Fe^{3+} (ferri vas) Fe^{2+} (ferro vas)-vé redukálódjon, mert csak így tud átmenni a gyomor-bél lumenből a bélhámsejtek belsejébe.

Helyes válasz: A

182. A surfactant nélkülözhetetlen az alveolusok nyitva tartásához, mert csökkenti az alveolusokon belüli felületi feszültséget.

Helyes válasz: A

183. A szenzitizáció során nő a receptor ingerküszöbe, mert preszinaptikusan több neurotranszmitter szabadul fel.

Helyes válasz: D

184. Az előregedett vörösvértestek a lépben membránstruktúrájuk alapján szelektálódnak ki, mert az előregedett vvt-ek gömb alakjuk miatt nem jutnak át a lép sinusaiba.

Helyes válasz: A

185. Hipermetróp szem korrigálása szórólencsével történik, mert a távollátó szem +D-s lencsével korrigálható.

Helyes válasz: D

186. A reumás láz Streptococcus pyogenes fertőzés utáni, autoimmun eredetű kórkép, mert a kórokozó felszíni antigénjei ellen termelődő antitest lép keresztreakcióban a szívizomsejtekkel és ízületi fehérjékkel.

Helyes válasz: A

187. Az arteria renalis szűkülete vérnyomásemelkedést okoz, mert a vesében hypoxia hatására fokozódik az erythropoetin termelés.

Helyes válasz: B

188. A születendő gyermek nemét a hímvarsejt határozza meg, mert a petesejtben csak X kromoszóma lehet.

Helyes válasz: A

189. A kiegyensúlyozott kromoszómarendellenességek általában nem okoznak fenotípus változást, mert nincs információ hiány- vagy többlet.

Helyes válasz: A

190. A cisztás fibrózis autoszomális recesszív módon öröklődik, mert egy hibás iontranszport fehérje okozza.

Helyes válasz: B

191. A megtermékenyítéskor egyesülő ivarsejtek diploidok, ezért a keletkező zigóta kromoszóma száma a fajra jellemző lesz.

Helyes válasz: D

192. A meiózis során a homológ kromoszómák párosodnak, ezért lehetővé válik a kromoszómák közötti DNS kicserélődés.

Helyes válasz: A

193. Az egészséget tekinthetjük egyfajta tőkének, mert döntő részben közös (társadalmi) forrásból finanszírozzák.

Helyes válasz: B

194. A szerepkiterjesztés-modell szerint a nők kettős társadalmi szerepe gazdagítja szociális identitásukat, ezért kedvezően befolyásolja jól-létüket és egészségi állapotukat.

Helyes válasz: A

195. A posztadoleszcencia példája, amikor a középkorú szülők fiatal felnőtt gyermekeiket és idős szüleiket is támogatják, mert a társadalom nem rendelkezik időseket ellátó intézményrendszerrel.

Helyes válasz: E

196. Az abortuszt a pro-choice támogatja, mert szerintünk a magzat csak egy genetikai lény, nem személy.

Helyes válasz: A

197. Az aktív eutanázia csak direkt lehet, mert az aktív eutanázia során lehet az orvos szándéka a beteg halála.

Helyes válasz: D

198. A preskriptív etika tárgy a normaadás, mert elsősorban a létező erkölcsről beszél.

Helyes válasz: C

199. A fejlődés akkor fenntartható, ha az emberiség betartja a természet törvényeit, mert a korlátlan növekedésbe vetett hit segíti ennek elérését.

Helyes válasz: C

200. A betegségek kezdettől fogva szerves részei a mitológiának, ugyanis az emberek gyakran hiába törekedtek közösleges eszközökkel a gyógyításra.

Helyes válasz: B

