

Belgyógyászati balesetek

- Áramütés
- Félrenyelés
- Vízbe fulladás
- Lehűlés
- Túlmelegedés

Áramütés

- Fogászáton is előfordul
- A sérült érzi, hogy megrázza az áram
- Izomgörcs, a készüléket nem tudja elengedni
- Teendő: áramkör megszakítása: biztosíték, száraz fanyelű szerszám – gereblye
- Légy óvatos !!
- Betegvizsgálat: él/nem él, eszméleténél van/nincs,
- Rövid eszméletvesztés gyakori
- Reanimáció az áramkör megszakítása után
- Áramjegy, égési sérülések
- Megelőzés: Fi relé

Idegentest aspiráció

- Fogászaton (is) előfordulhat
- Tünetei: evés közben, fogászati beavatkozás közben hirtelen köhögés, légszomj
- Súlyos esetben eszméletvesztés rövid idő alatt
- Diagnosztika nem nehéz, gondolni kell rá
- Bizonytalan esetben a gége hallgatása segít
- Eltávolítás: hátba verés 5x, Heimlich fogás 5x
- Fogászati kezelés felfüggesztendő
- Hospitalizálás a sikeres eltávolítás után is !
- Mentők: 104



Vízbe fulladás

- Első a kimentés
- A vizet kiönteni nem lehet/nem kell
- Jégen a nyomás elosztása nagy felületen – létra a jégre fektetve
- A parton reanimáció – ha nincsenek életjelenségek
- Lehűlés elleni védelem – vizes ruha levétele
- Jeges vízbe esett sérült reanimációs ideje jelentősen megnő – 15-20 perc

Lehűlés

- Már plusz 4-5 foknál is előfordul
- Ha magánál van – mintha ittas lenne
- Melegítés
- Veszélye a nehezen befolyásolható kamrafibrilláció

Túlmelegedés

- **Napon felejtett csecsemő/gyermek**
- **Bezárt autóban soha ne hagyjál gyereket !**
- **Lombos fa alatt napozzon**
- **Folyadékpótlás orálisan**
- **Minél kisebb, annál könnyebben kiszárad**
- **Láz – lázcsillapító gyógyszerek alkalmazása**
- **Fizikális hűtés – hűtőborogatás**
- **Hospitalizáció**

Köszönöm
megtisztelő
figyelmüket



Dr. Sirák András

angelika@t-online.hu

+36309461394