

Kezelési lehetőségek:

- Helyi kezelés csak bőrre lokalizált esetekben: fényterápia
- Rendszerbetegség esetén (csontvelő is érintett a felnőttek 90%-ban):
- C-kit gátlók adása
- Hisztamin receptor- gátló kezelés
- Chromolinok
- Darázs csípés allergiában: deszenzibilizálás
- Roham megelőzés: noradrenalin injectió

Bővebben a nemzetközi masztocitózis hálózat (www.Ecnm.eu european competence network on mastocytosis) honlapján

A kiadvány a **Novartis** támogatásával készült

MASZTOCITÓZIS

BETEGTÁJÉKOZTATÓ



Tudja ön mi az a masztocitózis?

– Hízósejt betegség

Mikor kell gyanakodnunk a betegségre?

– Ha a bőrön viszkető, apró barnás-vörös szemölcsök keletkeznek, melyek helyén megdörzsölésre csalánkiütés képződik (Darrier tünet)



- Ha nem múló hasmenése van hetek, hónapok óta
- Ha minden ok nélkül kipirul
- Ha ájulásának nem találják az okát
- Ha kínzó fejfájásának nem találják az okát
- Ha mellkasi folyadék felszaporodásnak nem találják az okát
- Ha darázscsípés allergiája van

Mi az oka?

- Hízósejtek „fokozott ingerlékenysége” folytán belőlük hisztamin és egyéb nagyhatású bioamin szabadul ki.

- A hízósejtek kóros mértékben történő elszaporodása az érintett szervek (csontvelő, máj, csontok) működés kiesését eredményezi: következményes vérképeltérések, májműködési zavarok, csontritkulás jelentkezik

A háttérben a sejtek normális működéséhez nélkülözhetetlen fontos jelátviteli fehérje szerzett genetikai hibája áll (c-kit mutáció).

Hogyan kerülhet ez a hiba felismerésre?

- A jellemző bőrelváltozásból és a csontvelőből történt mintavétel útján, szövettani és genetikai vizsgálat révén

Hova fordulhat? Van segítség? -Igen!

Budapesten keresse a Semmelweis Egyetem Masztocitózis Hálózatát:

- Bőrgyógyászati Klinika (elérhetőség: beutalóval az ambulanciára, VIII. Ker. Mária u.)
- III.Sz. Belgyógyászati Klinika (elérhetőség: 325-11-00/5431 mellék, vagy varkonyi.Judit@hotmail.hu)

A minták az i. Sz. Pathológiai intézetben kerülnek feldolgozásra