

		BETEGTÁJÉKOZTATÓ DINAMIKUS CHOLESZCINTIGRÁFIA VIZSGÁLATRÓL		SE OKK-NMED-7.1
Készítette: Scheidl Ágota	Ellenőrizte: Dr. Györke Tamás	Jóváhagyta: Dr. Maurovich Horvat Pál	Dátum: 2022.03.01	

A vizsgálat előkészítése

A vizsgálat előtt minimum 6 órás időtartamban nem étkezhet, nem ihat, teljes éhomi állapot szükséges, ill. nem dohányozhat, gyógyszereit hozza magával.

A vizsgálat

Ezt a vizsgálatot az Ön alapbetegségétől függően kétféle módon végezhetjük.

A vizsgálat kezdetekor radiofarmakont (izotóppal jelzett anyagot) vénásan juttatunk a szervezetébe. Ez az injekció megkötődik az Ön epéjében, illetve a széklettel kiválasztódik.

Egyik eljárásnál a vizsgálat az injekció beadásával egy időpontban kezdődik. Az injekció beadása után 60 percig tart a vizsgálat első szakasza, amely idő alatt folyamatos a leképezés. A vizsgálat ideje alatt Önnek nyugodtan kell feküdnie. A látott képtől függően szükség lehet egy gyógyszer bevitelére, aminek a hatásában tovább i felvételek készülnek, további 15 percig.

A másik eljárásnál az injekció beadása után 5 perc várakozási időre van szükség. A vizsgálat során meghatározott időközönként képet készítünk az eperégióról, az időt az asszisztencia figyeli. A vizsgálat ideje alatt Önnek mindaddig éhgyomorral kell maradnia, amíg az étkezést az asszisztensek nem engedélyezik. A magával hozott zsíros étel, vagy csokoládé elfogyasztása után – várakozási idő eltelte után – szükség lehet további felvételekre. A vizsgálat maga maximum 3 órát vesz igénybe.

A megfelelő orvosi javaslat alapján végzett izotópvizsgálatok sugárterhelése alacsony, szövődménymentesen végezhető.

Az injekció beadása után az Izotóplaboratóriumi részleg területe csak abban az esetben hagyható el, amennyiben erre a laboratórium valamelyik dolgozójától utasítást vagy engedélyt kap.

Laboratóriumunkban egyszerre többféle vizsgálat is folyik, melyek várakozási ideje nem egységes. Ne tévessze meg Önt az, hogy más beteg később jön, és előbb távozik. A vizsgálatokat vizsgálat típus szerint csoportosítva, azon belül az előjegyzési időpont szerinti sorrendben végezzük.

Kérjük, türelmesen várjon a vizsgálatra!

Van-e valamilyen kockázata az izotópos vizsgálatnak?

A sugárzás diagnosztikai és terápiás hatásait már évtizedek óta használják az orvosi gyakorlatban. Kezelőorvosa a vizsgálatkérés előtt mérlegelte, hogy az izotópos vizsgálat eredménye a kezelésének lehető legjobb megválasztását szolgálja. Amennyiben gondja van a vizsgálattal kapcsolatban, forduljon bizalommal a nukleáris medicina szakembereihez!

Nőbetegeinknek!

Nem ajánlott az izotópos vizsgálat elvégzése, amennyiben Ön terhes vagy valószínűleg terhes! Kérjük, a vizsgálat előtt tájékoztassa kollégáinkat, hogy terhes-e vagy szoptat-e csecsemőt! Amennyiben a kezelőorvosa mégis szükségesnek tartja a vizsgálatot annak elvégzése nem egyértelműen ellenjavallt (hivatalosan relatív ellenjavallat a várandósság).

A vizsgálat után!

Ön ehét és ihat, mint máskor. A bő folyadékfogyasztás segíti a szervezetbe juttatott izotóp kiürülését.

A vizsgálat napján tartsa magát távol a közvetlen környezetében tartózkodó kisgyermektől és állapotos hozzátartozójától, a felesleges sugárzás elkerülése érdekében.

Kérjük, amennyiben a megjelölt napon, a vizsgálaton nem tud megjelenni, hívja a **+36 1 459 1500 /61969** telefonszámot vagy írjon a **vizsgalat.nmt@semmelweis-univ.hu** email címre.