

 <p>ORVOSI KÉPZŐKÖZPONT KLINIKA</p>		<p><b>BETEGTÁJÉKOZTATÓ DINAMIKUS CHOLESZCINTIGRÁFIA VIZSGÁLATRÓL</b></p>		<p>SE OKK-NMED-28.1</p>
<p>Készítette: Scheidl Ágota</p>	<p>Ellenőrizte: Dr. Györke Tamás</p>	<p>Jóváhagyta: Dr. Maurovich Horvat Pál</p>	<p>Dátum: 2022.03.01</p>	

### **A vizsgálat előkészítése**

A vizsgálat előtt nem étkezhet, nem ihat, teljes éhomi állapot szükséges.  
Egy db citromot hozzon magával.

### **A vizsgálat**

A vizsgálat kezdetekor radiofarmakont (izotóppal jelzett anyagot) vénásan juttatunk a szervezetébe. A vizsgálat az injekció beadásával egy időpontban kezdődik. A leképezés ideje 30 perc. A vizsgálat ideje alatt Önnek nyugodtan kell feküdnie.

A megfelelő orvosi javaslat alapján végzett izotópvizsgálatok sugárterhelése alacsony, szövödménymentesen végezhető.

Az injekció beadása után az Izotóplaboratóriumi részleg területe csak abban az esetben hagyható el, amennyiben erre a laboratórium valamelyik dolgozójától utasítást vagy engedélyt kap.

Laboratóriumunkban egyszerre többféle vizsgálat is folyik, melyek várakozási ideje nem egységes. Ne tévessze meg Önt az, hogy más beteg később jön, és előbb távozik. A vizsgálatokat vizsgálat típus szerint csoportosítva, azon belül az előjegyzési időpont szerinti sorrendben végezzük.

### **Kérjük, türelmesen várjon a vizsgálatra!**

#### **Van-e valamilyen kockázata az izotópos vizsgálatnak?**

A sugárzás diagnosztikai és terápiás hatásait már évtizedek óta használják az orvosi gyakorlatban. Kezelőorvosa a vizsgálatkérés előtt mérlegelte, hogy az izotópos vizsgálat eredménye a kezelésének lehető legjobb megválasztását szolgálja. Amennyiben gondja van a vizsgálattal kapcsolatban, forduljon bizalommal a nukleáris medicina szakembereihez!

#### **Nőbetegeinknek!**

Nem ajánlott az izotópos vizsgálat elvégzése, amennyiben Ön terhes vagy valószínűleg terhes! Kérjük, a vizsgálat előtt tájékoztassa kollégáinkat, hogy terhes-e vagy szoptat-e csecsemőt! Amennyiben a kezelőorvosa mégis szükségesnek tartja a vizsgálatot annak elvégzése nem egyértelműen ellenjavalt (hivatalosan relatív ellenjavallat a várandósság).

#### **A vizsgálat után!**

Ön ehet és ihat, mint máskor. A bő folyadékfogyasztás segíti a szervezetbe juttatott izotóp kiürülését.

A vizsgálat napján tartsa magát távol a közvetlen környezetében tartózkodó kisgyermekektől és állapotos hozzátartozójától, a felesleges sugárzás elkerülése érdekében.

Kérjük, amennyiben a megjelölt napon, a vizsgálaton nem tud megjelenni, hívja a **+36 1 459 1500 /61969** telefonszámot vagy írjon a **vizsgalat.nmt@semmelweis-univ.hu** email címre.