

 <p>ORVOSI KÉPZŐ KÓRHÁZ KLINIKA</p>		<p>BETEGTÁJÉKOZTATÓ GA 67 SZCINTIGRÁFIA TELJES TEST VIZSGÁLATRÓL</p>		<p>SE OKK-NMED 10.1</p>
<p>Készítette: Scheidl Ágota</p>	<p>Ellenőrizte: Dr. Györke Tamás</p>	<p>Jóváhagyta: Dr. Maurovich Horvat Pál</p>	<p>Dátum: 2022.03.01</p>	

A vizsgálat előkészítése

A vizsgálat előtt étkezhet, gyógyszereit beveheti. A vizsgálatot megelőző napokban, az injekció beadása után gyenge hashajtásra lehet szükség.

A vizsgálat

A vizsgálat kezdetekor izotópot tartalmazó fiziológiás sóoldatot vénásan juttatunk a szervezetébe, mely döntően a lágyrészekben halmozódik. Ez az injekció megkötődik az Ön szervezetében, illetve a széklettel kiválasztódik. Az injekció lágyrészekbe történő beépüléshez várakozási időre van szükség, az injekció beadása után ez több nap is lehet. A betegségétől függően injekció beadás után 4, 24, 48, 72, 96 óra múlva is szükség lehet felvételre. A vizsgálat maga minimum 40 percet vesz igénybe. Az izotópos leképezésen kívül még szükség lehet kiegészítő CT vizsgálatra (SPECT/CT). Az alacsony sugár dózisu CT felvétel minimálisan növeli az ön sugárterhelését és a leképezési időt. A megfelelő orvosi javaslat alapján végzett izotópvizsgálatok sugárterhelése alacsony, szövödménymentesen végezhető.

Laboratóriumunkban egyszerre többféle vizsgálat is folyik, melyek várakozási ideje nem egységes. Ne tévessze meg Önt az, hogy más beteg később jön és előbb távozik. A vizsgálatokat vizsgálat típus szerint csoportosítva, azon belül az előjegyzési időpont szerinti sorrendben végezzük.

Kérjük, türelmesen várjon a vizsgálatra!

A vizsgálat alatt Önnek nyugodtan kell feküdni!

Az injekció beadása után az Izotóplaboratóriumi részleg területe csak abban az esetben hagyható el, amennyiben erre a laboratórium valamelyik dolgozójától utasítást vagy engedélyt kap.

Van-e valamilyen kockázata az izotópos vizsgálatnak?

A sugárzás diagnosztikai és terápiás hatásait már évtizedek óta használják az orvosi gyakorlatban. Kezelőorvosa a vizsgálatkérés előtt mérlegelte, hogy az izotópos vizsgálat eredménye a kezelésének lehető legjobb megválasztását szolgálja. Amennyiben gondja van a vizsgálattal kapcsolatban, forduljon bizalommal a nukleáris medicina szakembereihez!

Nőbetegeinknek!

Nem ajánlott az izotópos vizsgálat elvégzése, amennyiben Ön terhes vagy valószínűleg terhes! Kérjük, a vizsgálat előtt tájékoztassa kollégáinkat, hogy terhes-e vagy szoptat-e csecsemőt! Amennyiben Ön szoptat a szoptatást 3 hétre fel kell függeszteni. Amennyiben a kezelőorvosa mégis szükségesnek tartja a vizsgálatot annak elvégzése nem ellenjavallt (hivatalosan relatív ellenjavallat a várandósság)..

A vizsgálat után!

Ön ehet és ihat, mint máskor. A bő folyadékfogyasztás segíti a szervezetbe juttatott izotóp kiürülését. Az injekció beadás után legalább egy hétig tartsa magától távol kisgyermekait és állapotos hozzátartozóit, a felesleges sugárzás elkerülése érdekében.

Kérjük, amennyiben a megjelölt napon, a vizsgálaton nem tud megjelenni, hívja a **+36 1 459 1500 /61969 telefonszámot** vagy írjon a **vizsgalat.nmt@semmelweis-univ.hu** email címre.