

 <p>ORVOSI KÉPALKOTÓ KLINIKA</p>		<p>BETEGTÁJÉKOZTATÓ MELLÉKVESE I131 EGÉSZTEST VIZSGÁLATRÓL</p>		<p>SE OKK-NMED 15.1- 2</p>
<p>Készítette: Scheidl Ágota</p>	<p>Ellenőrizte: Dr. Györke Tamás</p>	<p>Jóváhagyta: Dr. Maurovich Horvat Pál</p>	<p>Dátum: 2022.03.01</p>	

A vizsgálat előkészítése

Éhgyomorrra kell jönni a vizsgálatra.

A vizsgálat

A I131 izotóp kapszulában van, amit per os kell beszedni vízzel. Az egésztest leképezése a kapszula bevétele után 72 óra múlva kezdődik.

A kérdéses területről SPECT és alacsony sugár dózisu CT felvétel is készül, amely minimálisan növeli az ön sugárterhelését és a leképezési időt. A megfelelő orvosi javaslat alapján végzett izotópvizsgálatok sugárterhelése alacsony, szövődménymentesen végezhető.

Az beadott radiofarmakon a vizelettel kiválasztódik.

A vizsgálat alatt Önnek nyugodtan kell feküdnie!

Laboratóriumunkban egyszerre többféle vizsgálat is folyik, melyek várakozási ideje nem egységes. Ne tévessze meg Önt az, hogy más beteg később jön, és előbb távozik. A vizsgálatokat vizsgálat típus szerint csoportosítva, azon belül az előjegyzési időpont szerinti sorrendben végezzük.

Kérjük, türelmesen várjon a vizsgálatra!

Van-e valamilyen kockázata az izotópos vizsgálatnak?

A sugárzás diagnosztikai és terápiás hatásait már évtizedek óta használják az orvosi gyakorlatban. Kezelőorvosa a vizsgálatkérés előtt mérlegelte, hogy az izotópos vizsgálat eredménye a kezelésének lehető legjobb megválasztását szolgálja. Amennyiben gondja van a vizsgálat kapcsolatban, forduljon bizalommal a nukleáris medicina szakembereihez!

Nőbetegeinknek!

Nem ajánlott az izotópos vizsgálat elvégzése, amennyiben Ön terhes vagy valószínűleg terhes! Kérjük, a vizsgálat előtt tájékoztassa kollégáinkat, hogy terhes-e vagy szoptat-e csecsemőt! Amennyiben a kezelőorvosa mégis szükségesnek tartja a vizsgálatot annak elvégzése nem egyértelműen ellenjavallt (hivatalosan relatív ellenjavallat a várandósság).

A vizsgálat után!

Ön ehet és ihat, mint máskor. A bő folyadékfogyasztás segíti a szervezetbe juttatott izotóp kiürülését.

Az izotóp beadását követő 1,5 napig tartsa magát távol a közvetlen környezetében tartózkodó kisgyermektől és állapotos hozzátartozójától, a felesleges sugárzás elkerülése érdekében.

A kapszula beadása során munkatársunktól bővebb tájékoztatást kap a sugárvédelmi szabályok betartásáról.

Kérjük, amennyiben a megjelölt napon, a vizsgálaton nem tud megjelenni, hívja a **+36 11 459 1500/61969 telefonszámot** vagy írjon a **vizsgalat.nmt@semmelweis-univ.hu** email címre