

 <p>ORVOSI KÉPZŐ KÓRHÁZ KLINIKA</p>		<p>BETEGTÁJÉKOZTATÓ LYMPHOSZCINTIGRÁFIÁS VIZSGÁLATRÓL</p>		<p>SE OKK-NMED-18.1</p>
<p>Készítette: Scheidl Ágota</p>	<p>Ellenőrizte: Dr. Györke Tamás</p>	<p>Jóváhagyta: Dr. Maurovich Horvat Pál</p>	<p>Dátum: 2022.03.01</p>	

A vizsgálat előkészítése

A vizsgálat előtt étkezhet.

A vizsgálat

Az injekció beadása a bőrbe/alá történik, mely után 1 és esetenként 4 óra várakozási idő elteltével planáris felvételeket készítünk és a sentinel nyirokcsomók megjelenési helyét megjelöljük. Az izotópos leképezésen kívül még szükség lehet kiegészítő CT vizsgálatra (SPECT/CT). Az alacsony sugár dózisu CT felvétel minimálisan növeli az ön sugárterhelését és a leképezési időt. A megfelelő orvosi javaslat alapján végzett izotópvizsgálatok sugárterhelése alacsony, szövődménymentesen végezhető.

Az Izotóplaboratóriumi részleg területe csak abban az esetben hagyható el, amennyiben erre a laboratórium valamelyik dolgozójától utasítást vagy engedélyt kap.

Laboratóriumunkban egyszerre többféle vizsgálat is folyik, melyek várakozási ideje nem egységes. Ne tévessze meg Önt az, hogy más beteg később jön, és előbb távozik. A vizsgálatokat vizsgálat típus szerint csoportosítva, azon belül az előjegyzési időpont szerinti sorrendben végezzük.

Kérjük, türelmesen várjon a vizsgálatra!

Van-e valamilyen kockázata az izotópos vizsgálatnak?

A sugárzás diagnosztikai és terápiás hatásait már évtizedek óta használják az orvosi gyakorlatban. Kezelőorvosa a vizsgálatkérés előtt mérlegelte, hogy az izotópos vizsgálat eredménye a kezelésének lehető legjobb megválasztását szolgálja. Amennyiben gondja van a vizsgálattal kapcsolatban, forduljon bizalommal a nukleáris medicina szakembereihez!

Nőbetegeinknek!

Nem ajánlott az izotópos vizsgálat elvégzése, amennyiben Ön terhes vagy valószínűleg terhes! Kérjük, a vizsgálat előtt tájékoztassa kollégáinkat, hogy terhes-e vagy szoptat-e csecsemőt! Amennyiben a kezelőorvosa mégis szükségesnek tartja a vizsgálatot, annak elvégzése nem ellenjavallt (hivatalosan relatív ellenjavallat a várandósság).

A vizsgálat után!

Ön ehet és ihat, mint máskor. A bő folyadékfogyasztás segíti a szervezetbe juttatott izotóp kiürülését.

A vizsgálat napján tartsa magától távol a közvetlen környezetében tartózkodó kisgyermekektől és állapotos hozzátartozóitól, a felesleges sugárzás elkerülése érdekében.

Kérjük, amennyiben a megjelölt napon, a vizsgálaton nem tud megjelenni, hívja a **+36 11 459 1500/61969 telefonszámot** vagy írjon a **vizsgalat.nmt@semmelweis-univ.hu** email címre