

 <p>ORVOSI KÉPZŐ KÓRHÁZ KLINIKA</p>		BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÁJ-LÉPSZCINTIGRÁFIA VIZSGÁLATRÓL		SE OKK-NMED 12.1
Készítette: Scheidl Ágota	Ellenőrizte: Dr. Györke Tamás	Jóváhagyta: Dr. Maurovich Horvat Pál	Dátum: 2022.03.01	

A vizsgálat előkészítése

A vizsgálat előtt étkezhet, gyógyszereit beveheti.

A vizsgálat

A vizsgálat kezdetekor radiofarmakont (izotóppal jelzett anyagot) vénásan juttatunk a szervezetébe, mely a májban halmozódó anyagot is tartalmazza. Ez az injekció megkötődik az Ön májában, illetve a széklettel kiválasztódik. Az injekció májba történő beépüléshez várakozási időre van szükség – minimum 20 percre. A vizsgálat maga kb. 15-30 percet vesz igénybe. Az izotópos leképezésen kívül még szükség lehet kiegészítő CT vizsgálatra (SPECT/CT). Az alacsony sugár dózisu CT felvétel minimálisan növeli az ön sugárterhelését és a leképezési időt. A megfelelő orvosi javaslat alapján végzett izotópvizsgálatok sugárterhelése alacsony, szövődménymentesen végezhető.

A vizsgálat alatt Önnek nyugodtan kell feküdnie!

Az injekció beadása után az Izotóplaboratóriumi részleg területe csak abban az esetben hagyható el, amennyiben erre a laboratórium valamelyik dolgozójától utasítást vagy engedélyt kap.

Laboratóriumunkban egyszerre többféle vizsgálat is folyik, melyek várakozási ideje nem egységes. Ne tévessze meg Önt az, hogy más beteg később jön és előbb távozik. A vizsgálatokat vizsgálat típus szerint csoportosítva, azon belül az előjegyzési időpont szerinti sorrendben végezzük.

Kérjük, türelmesen várjon a vizsgálatra!

Az injekció beadása után az Izotóplaboratóriumi részleg területe csak abban az esetben hagyható el, amennyiben erre a laboratórium valamelyik dolgozójától utasítást kap.

Van-e valamilyen kockázata az izotópos vizsgálatnak?

A sugárzás diagnosztikai és terápiás hatásait már évtizedek óta használják az orvosi gyakorlatban. Kezelőorvosa a vizsgálatkérés előtt mérlegelte, hogy az izotópos vizsgálat eredménye a kezelésének lehető legjobb megválasztását szolgálja. Amennyiben gondja van a vizsgálattal kapcsolatban, forduljon bizalommal a nukleáris medicina szakembereihez!

Nőbetegeinknek!

Nem ajánlott az izotópos vizsgálat elvégzése, amennyiben Ön terhes vagy valószínűleg terhes! Kérjük, a vizsgálat előtt tájékoztassa kollégáinkat, hogy terhes-e vagy szoptat-e csecsemőt! Amennyiben a kezelőorvosa mégis szükségesnek tartja a vizsgálatot annak elvégzése nem ellenjavallt (hivatalosan relatív ellenjavallat a várandósság)..

A vizsgálat után!

Ön ehét és ihat, mint máskor. A bő folyadékfogyasztás segíti a szervezetbe juttatott izotóp kiürülését.

A vizsgálat napján tartsa magától távol a közvetlen környezetében tartózkodó kisgyermekektől és állapotos hozzátartozóitól, a felesleges sugárzás elkerülése érdekében.

Kérjük, amennyiben a megjelölt napon, a vizsgálaton nem tud megjelenni, hívja a **+36 11 459 1500/61969** telefonszámot vagy írjon a **vizsgalat.nmt@semmelweis-univ.hu** email címre.