

 <p>ORVOSI KÉPZŐ KÓRHÁZ KLINIKA</p>		<p>BETEGTÁJÉKOZTATÓ MELLÉKPÁJZSMIRIGY SZCINTIGRÁFIA VIZSGÁLATRÓL</p>		SE OKK-NMED 14.1
Készítette: Scheidl Ágota	Ellenőrizte: Dr. Györke Tamás	Jóváhagyta: Dr. Maurovich Horvat Pál	Dátum: 2022.03.01	

A vizsgálat előkészítése

A vizsgálat előtt étkezhet. A gyógyszereit beveheti.

A vizsgálat

A vizsgálat első részében radiofarmakont (izotóppal jelzett anyagot) vénásan juttatunk a szervezetébe, amely a pajzsmirigyben halmozódik. 15 perc várakozási idő után készítünk egy 15 perces statikus felvételt a pajzsmirigyéről.

Miután elkészült a felvétel a mellékpajzsmirigyébe halmozódó radiofarmakont (izotóppal jelzett anyagot) vénás injekcióval juttatunk a szervezetébe.

A beadást követően 5 perc várakozás után készítünk egy 15 perces statikus felvételt a mellékpajzsmirigyéről. A mellékpajzsmirigyről egy másik vizsgáló helyiségben egy két modalitású berendezéssel további statikus és SPECT/CT felvételeket készítünk. Az injekció beadásától számított 2 óra múlva még készül késői statikus felvétel a mellékpajzsmirigyéről (szintén 15 perces). A beadott radiofarmakon a vizelettel kiválasztódik.

A megfelelő orvosi javaslat alapján végzett izotópvizsgálatok sugárterhelése alacsony, szövődménymentesen végezhető.

Önnek a leképezés ideje alatt nyugodtan, mozdulatlanul kell feküdnie!

Az injekció beadása után az Izotóplaboratóriumi részleg területére csak abban az esetben hagyható el, amennyiben erre a laboratórium valamelyik dolgozójától utasítást vagy engedélyt kap.

Laboratóriumunkban egyszerre többféle vizsgálat is folyik, melyek várakozási ideje nem egységes. Ne tévessze meg Önt az, hogy más beteg később jön, és előbb távozik. A vizsgálatokat vizsgálat típus szerint csoportosítva, azon belül az előjegyzési időpont szerinti sorrendben végezzük.

Kérjük, türelmesen várjon a vizsgálatra!

Van-e valamilyen kockázata az izotópos vizsgálatnak?

A sugárzás diagnosztikai és terápiás hatásait már évtizedek óta használják az orvosi gyakorlatban. Kezelőorvosa a vizsgálatkérés előtt mérlegelte, hogy az izotópos vizsgálat eredménye a kezelésének lehető legjobb megválasztását szolgálja. Amennyiben gondja van a vizsgálat kapcsolatban, forduljon bizalommal a nukleáris medicina szakembereihez!

Nőbetegeinknek!

Nem ajánlott az izotópos vizsgálat elvégzése, amennyiben Ön terhes vagy valószínűleg terhes! Kérjük, a vizsgálat előtt tájékoztassa kollégáinkat, hogy terhes-e vagy szoptat-e csecsemőt! Amennyiben a kezelőorvosa mégis szükségesnek tartja a vizsgálatot annak elvégzése nem egyértelműen ellenjavallt (hivatalosan relatív ellenjavallat a várandósság).

A vizsgálat után!

Ön ehét és ihat, mint máskor. A bő folyadékfogyasztás segíti a szervezetbe juttatott izotóp kiürülését.

A vizsgálat napján tartsa magától távol a közvetlen környezetében tartózkodó kisgyermektől és állapotos hozzátartozóitól, a felesleges sugárzás elkerülése érdekében.

Kérjük, amennyiben a megjelölt napon, a vizsgálaton nem tud megjelenni, hívja a **+36 1 459 1500 /61969** telefonszámot vagy írjon a **vizsgalat.nmt@semmelweis-univ.hu** email címre