

 <p>ORVOSI KÉPZŐ KLINIKA</p>		<p>BETEGTÁJÉKOZTATÓ MELLÉKVESEVELŐ /I123MIBG/SZCINTIGRÁFIA VIZSGÁLATRÓL</p>		<p>SE OKK-NMED 15.1</p>
<p>Készítette: Scheidl Ágota</p>	<p>Ellenőrizte: Dr. Györke Tamás</p>	<p>Jóváhagyta: Dr. Maurovich Horvat Pál</p>	<p>Dátum: 2022.03.01</p>	

A vizsgálat előkészítése

A vizsgálat előtt a pajzsmirigyét Lugol oldattal vagy perkloráttal blokkolni kell, melynek adagolását a kezelőorvossal kell egyeztetni. Amennyiben szed alfa-receptor blokkolót, szimpatomimetikumot vagy bizonyos antidepresszánsokat, ezeket vizsgálat előtt fel kell függeszteni, a kezelőorvos jóváhagyásával.

A vizsgálat

A radiofarmakont tartalmazó (izotóppal jelzett anyagot) injekciót vénásan juttatjuk a szervezetébe.

Az injekció beadása után a diagnózistól függően 4 és 24 óra múlva készíthetünk egésztet, planáris és SPECT felvételeket. Az izotópos leképezésen kívül még szükség lehet kiegészítő alacsony dózisu CT vizsgálatra (SPECT/CT), amely minimálisan növeli az ön sugárterhelését és a leképezési időt. A megfelelő orvosi javaslat alapján végzett izotópvizsgálatok sugárterhelése alacsony, szövődménymentesen végezhető.

A vizsgálat alatt mozdulatlanul kell feküdni.

Laboratóriumunkban egyszerre többféle vizsgálat is folyik, melyek várakozási ideje nem egységes. Ne tévessze meg Önt az, hogy más beteg később jön, és előbb távozik. A vizsgálatokat vizsgálat típus szerint csoportosítva, azon belül az előjegyzési időpont szerinti sorrendben végezzük.

Kérjük, türelmesen várjon a vizsgálatra!

Van-e valamilyen kockázata az izotópos vizsgálatnak?

A sugárzás diagnosztikai és terápiás hatásait már évtizedek óta használják az orvosi gyakorlatban. Kezelőorvosa a vizsgálatkérés előtt mérlegelte, hogy az izotópos vizsgálat eredménye a kezelésének lehető legjobb megválasztását szolgálja. Amennyiben gondja van a vizsgálattal kapcsolatban, forduljon bizalommal a nukleáris medicina szakembereihez!

Nőbetegeinknek!

Nem ajánlott az izotópos vizsgálat elvégzése, amennyiben Ön terhes vagy valószínűleg terhes! Kérjük, a vizsgálat előtt tájékoztassa kollégáinkat, hogy terhes-e vagy szoptat-e csecsemőt! Amennyiben a kezelőorvosa mégis szükségesnek tartja a vizsgálatot annak elvégzése nem egyértelműen ellenjavalt (hivatalosan relatív ellenjavallat a várandósság).

A vizsgálat után!

Ön ehet és ihat, mint máskor. A bő folyadékfogyasztás segíti a szervezetbe juttatott izotóp kiürülését. A vizsgálat napján tartsa magától távol a közvetlen környezetében tartózkodó kisgyermekektől és állapotos hozzátartozóitól, a felesleges sugárzás elkerülése érdekében.

Kérjük, amennyiben a megjelölt napon, a vizsgálaton nem tud megjelenni, hívja a

+36 1 459 1500 /61969 telefonszámot vagy írjon a **vizsgalat.nmt@semmelweis-univ.hu** email címre