

  ORVOSI KÉPZŐKÖZPONT KLINIKA	BETEGTÁJÉKOZTATÓ EMLŐ VÁKUUM CORE BIOPSZIA VIZSGÁLATHOZ		SE OKK-MA 7.2
Készítette: Mátrai-Molnár Andrea	Ellenőrizte: Dr. Tóth Mónika	Jóváhagyta: Dr. Maurovich Horvat Pál	Dátum: 2025.11.18.

Érvényes: visszavonásig

Tudnivalók emlő vákuum-asszisztált core biopszia után

Önnél vákuum-asszisztált core biopsziát (szövettani mintavételt) végeztünk az emlőben észlelt elváltozás okának pontosabb tisztázására.

1. A felhelyezett kötések eltávolításának sorrendje:
 - Fásli (1 nap múlva)
 - Nyomó kötés (3 nap múlva)
 - Steril védő kötés (5 nap múlva)
 - Sebészi összehúzó barna ragasztó (7 nap múlva)
2. A helyi érzéstelenítő hatása néhány óra múlva elmúlik, ezután enyhe fájdalmat érezhet. Ha ez fokozódik, bármilyen fájdalomcsillapítót (pl. Donalgin, Algopyrin, Demalgon, paracetamol) bevehet. Szalicilát tartalmú gyógyszert (Aspirin, Kalmopyrin) egy napig ne szedjen, mert ezek a véralvadást gátolják. Hideg vízzel borogathatja az emlőt.
3. A biopszia után nyugodtan dolgozhat, de javasoljuk, hogy 24 órán belül ne végezzen semmilyen megerőltető tevékenységet, pl. tornát, nehéz tárgyak emelését.
4. Előfordulhat, hogy a biopszia helye az elkövetkező napokban is érzékeny lesz, sőt, tapintható csomó is képződhet – ezek a panaszok az elkövetkező hetekben fokozatosan, maguktól elmúlnak. A biopszia helyén lila véraláfutás keletkezhet, ez a későbbiekben felszívódik. Ha nagyfokú duzzadást, fájdalmat vagy vérzést tapasztal, hívja rendelésünket, vagy forduljon a beküldő orvosához.
5. Vákuum-asszisztált mintavétel során apró, kb. 2 mm-es jelölő klip kerülhet az emlőbe. Ez nem jelent problémát sem a későbbiekben végzendő MR vizsgálatoknál, sem a repülőtéri kapuknál.
6. Miután megkapjuk a szövettani leletet a patológustól, az általunk végzett radiológiai vizsgálattal együttesen értékeljük, és végleges, írásos véleményt, összefoglaló leletet adunk. Ez összesen kb. 15 munkanapot vesz igénybe.
7. Amennyiben allergiás reakciót tapasztal valamelyik kötéstől (bőrpír, duzzanat, váladékozás, égő érzés) távolítsa el a kötést. Esetleg fertőtlenítés után felhelyezhet olyat, amire tudottan nem lép fel allergiás reakció.