

 ORVOSI KÉPZŐ KÓRHÁZ KLINIKA		BETEGTÁJÉKOZTATÓ KONTRASZTANYAGOS ULTRAHANG VIZSGÁLAT VÉGZÉSÉHEZ		SE OKK-UH 10.1
Készítette: Dr. Futácsi Balázs	Ellenőrizte: Dr. Győri Gabriella	Jóváhagyta: Dr. Maurovich Horvat Pál	Dátum: 2022.03.01	

Az Ön kezelőorvosai ultrahang kontrasztanyag (SonoVue) intravénás adásával egybekötött ultrahang vizsgálat elvégzését tartják szükségesnek azért, hogy meghatározhassuk az előzetesen felismert betegség pontosabb természetét és a lehetséges kezelési lehetőségek közül a legmegfelelőbbet javasolhassuk.

Hogyan történik a vizsgálat?

A vizsgálat során egy perifériás vénájába adjuk be a kontrasztanyagot. A SonoVue egy olyan több millió apró buborékot tartalmazó kontrasztanyag, amely megkönnyíti az orvos számára a vizsgált eltérés tulajdonságainak, keringési viszonyainak, viselkedésének pontosabb megítélését. A SonoVue segítségével vizsgálhatóak a szívüregek, a nagy véredények, erek, valamint a legtöbb szerv szerkezete, erezettsége, vérellátása. A vizsgálat segítségével bizonyos terápiás eljárások — mint például a rádiófrekvenciás kezelés (RFA), szelektív chemoembolisatio (TACE), angioplastica — eredményessége is jól feltérképezhető.

Mellékhatások:

Mint minden gyógyszer, így a Sonovue is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nagyon ritkák. A SonoVue klinikai vizsgálataiban tapasztalt legtöbb mellékhatása enyhe és átmeneti volt. Ilyenek lehetnek a következők: fejfájás, zibbadás, szédülés, furcsa íz érzése a szájban, kipirulás, torokirritáció, hányinger, viszketés, bőrkiütés, hátfájás, forróságérzet, mellkasi fájdalom vagy kellemetlen érzés a mellkasban, gyengeség, az injekció beadásának a helyén jelentkező helyi reakciók. Súlyos mellékhatások (arc, az ajkak, a száj vagy a garat feldagadása, amely nyelési vagy légzési nehézséget okozhat; bőrkiütés; csalánkiütés; a kezek, a lábak vagy a boka feldagadása) csak extrém ritkán fordultak eddig elő a világon.

Ön nem kaphat SonoVue-t, amennyiben az alábbi állapotok bármelyike fennáll Önnél:

- ismert a kén-hexafluoriddal vagy a SonoVue más összetevőjével szembeni túlérzékenysége,
- a közelmúltban akut koronária szindrómája vagy klinikailag instabil ischaemias szívbetegsége volt, beleértve a kialakulóban lévő vagy zajló myocardialis infarctust, -ill. ha az elmúlt 7 napon belül szívpanaszokat észlelt,
- közelmúltbeli szív koszorúsér (coronaria) intervenciót végeztek vagy egyéb olyan tényezőt (például EKG, laboratóriumi vagy klinikai paraméterek rosszabbodása) találtak, melyek klinikai instabilitásra utalnak,
- akut vagy III/IV típusú szívelégtelensége, súlyos ritmuszavara, ill. jobb-bal shuntje van, _ beállítatlan magas vérnyomása van,
- súlyos mértékben emelkedett a tüdőartériák nyomása (pulmonalis hipertóniája van), - felnőttkori légzési distressz szindrómában szenved.

Terhesség és szoptatás:

A SonoVue biztonságosságát nem igazolták terheseknél és szoptató anyáknál, ezért a SonoVue terhesség és szoptatás alatt nem adható.

Gépjárművezetés:

A SonoVue farmakokinetikai és farmakodinámiás tulajdonságai alapján várhatóan nincs vagy elhanyagolható a hatása a gépjárművezetéshez szükséges képességekre.

Kezelés ideje alatt alkalmazott gyógyszerek:

A SonoVue és a leggyakrabban szedett különböző gyógyszercsoportok között nem jeleztek kölcsönhatást. Mégis arra kérjük, hogy tájékoztassa kezelőorvosát a jelenleg szedett gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható gyógyszereket is.

További információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2004/200409278482/anx_8482_hu.pdf A betegtájékoztató érvényességi ideje: visszavonásig.