

		BETEGTÁJÉKOZTATÓ PERCUTAN TRANSHEPATIKUS DRAINAGE/STENT VÉGZÉSÉHEZ		SE OKK-UH 6.1
Készítette: Dr. Futácsi Balázs	Ellenőrizte: Dr. Győri Gabriella	Jóváhagyta: Dr. Maurovich Horvat Pál	Dátum: 2022.03.01	

Az Ön kezelőorvosai az elvégzett vizsgálatok és rendelkezésre álló klinikai adatok alapján — intervenciós radiológussal történt konzultáció után — az Önnél fennálló epe elfolyási akadályozottság percután, intervenciós radiológiai megszüntetését kérik és javasolják.

A beavatkozás célja:

Minimális invazivitással és a nyitott sebészi beavatkozás terheinek és komplikációjának elkerülésével szabadíthatjuk fel az Ön egészségi állapotát, esetenként az életét közvetlenül veszélyeztető epe pangást okozó akadályt.

A beavatkozás menete:

A beavatkozás során UH vezérlés segítségével a májban látható kiszélesedett, pangó epét tartalmazó epeutak egyikét vékony tűvel megsúrjuk érzéstelenítést követően. Ha sikerül innen vezetődróttal az eperendszerbe bejutni, akkor a járat feltágítása után megkíséreljük az elzáródott szakaszon a vezetődróttal majd katéterrel történő átjutást.

Ennek sikere esetén a bélrendszerbe jutva olyan speciális csövet (draint) ültetünk be az eperendszerbe (2 vagy 3 vagy 4 mm) ami képes a májban pangó epét az elzáródáson át annak fiziológiás helyére, a patkóbélbe vezetni.

A tartós drainage külső vége a bőrön át a külvilágban lesz (itt lezárjuk és fedőkötéssel fedjük), míg belső vége a patkóbélben horgonyzódik le.

A drainen át napi 500-800ml epe tud a bélbe jutni, ezzel tehermentesül a máj, és megszűnik az életveszélyes állapot.

A drain akár 6-12 hónapon át is használható gondos ápolás és rendszeres draincsere esetén.

A beavatkozás kockázata:

A beavatkozás képkalkotó eljárás vezérlésével (UH +RTG, CT) történik, így a drain bevezetésének kockázata viszonylag alacsony, a pangó májban a szűrési út gondos kiválasztásával és megfelelő technika alkalmazásával vérzés, érsérülés csak 1-2 %-ban fordul elő. Ez azonban csak igen ritkán igényel vérzés embolizációs beavatkozást.

A tartós drain okozta kellemetlenség jól tolerálható. A drainnel a fürdés nem megengedett, de megfelelően vízhatlan fedőkötés mellett a zuhanyozás lehetséges.

Fontos, hogy a bőrfertőtlenítést és a drain rendszeres kötözését otthon is végezze el, valamint vigyázzon a drain pozíciójára. Kockázatot jelent a drain elmozdulása, vagy felülfertőződése, de ez gondos ápolással elkerülhető.

A beteg tájékoztató érvényességi ideje: visszavonásig.