

		BETEGTÁJÉKOZTATÓ TESTÜREGI, TARTÓS, VÁKUUM ASSZISZTÁLT FOLYADÉKLEBOCSÁJTÁS (DRAINAGE) VÉGZÉSHEZ		SE OKK-UH 5.1
Készítette: Dr. Futácsi Balázs	Ellenőrizte: Dr. Győri Gabriella	Jóváhagyta: Dr. Maurovich Horvat Pál	Dátum: 2022.03.01	

Az Ön kezelőorvosai az elvégzett vizsgálatok és rendelkezésre álló klinikai adatok alapján — intervenciós radiológussal történt konzultáció után — az Önnél fennálló kóros gyülem nem-sebési, percután, intervenciós radiológiai eltávolítását kérik és javasolják.

A beavatkozás célja:

Minimális invazivitással és a nyitott sebési beavatkozás terheinek és komplikációjának elkerülésével távolíthatjuk el az Ön egészségi állapotát, esetenként az életét közvetlenül veszélyeztető folyadékgyülemet.

A vizsgálat menete:

A beavatkozás során vékony 2,7-3,3-4 mm átmérőjű (8 vagy 10 vagy 12Fr) műanyag csövet (draint) vezetünk képzővezélve (UH, CT, RTG) a kóros gyülembe érzéstelenítés alatt.

A drainen át 2-20 napon át folyamatos vákuum asszisztált szívás történik mindaddig, amíg a kóros gyülem teljesen és véglegesen meg nem szűnik. Ezt az eredményt a drain eltávolítása előtt képzővizsgálattal fogjuk bizonyítani. Az általános állapottól függően a szívás történhet otthon, kórházi bennfekvés során és nappali bejárás mellett is.

Az eredményes terápia kulcseleme a szívás jó minősége és a drain jó pozíciója.

A drain eredményes használata után, annak eltávolítását intervenciós radiológus végzi képző ellenőrzése mellett. A drain eltávolítása után a szűrőcsatorna 1-2 hét alatt nyomtalanul begyógyul. A drainage elmaradásának veszélye a kóros gyülem progressziója és visszafordíthatatlan folyamatok (pl. sepsis) beindulása.

A beavatkozás kockázata:

A beavatkozás képző eljárás vezérlésével (UH vagy CT) történik, így a drain bevezetésének kockázata elenyésző. A szűrési út gondos kiválasztásával és megfelelő technika alkalmazásával vérzés nem szokott előfordulni.

A tartós drain okozta kellemetlenség jól tolerálható. A drainnal a fürdés nem megengedett, de megfelelően vízhatlan fedőkötés mellett a zuhanyozás lehetséges.

Fontos, hogy a bőrfertőtlenítést és a drain rendszeres kötözését otthon is végezze el, valamint vigyázzon a drain pozíciójára. Kockázatot jelent a drain elmozdulása, vagy felülfertőződése, de ez gondos ápolással elkerülhető.

A beteg tájékoztató érvényességi ideje: visszavonásig