

# **Szexuális és nemi identitás zavarok tünettana és diagnosztikája**

**Dr. Lukács Eszter**

**2020**

# Szexuális diszfunkció

**Definíció:** a szexuális érdeklődés vagy válaszkészség normális mintázatának tartós, vagy visszatérő zavara

**DSM-5 szerinti felosztás (APA, 2013):**

**Férfi szexuális diszfunkciók:**

1. Férfi hipoaktív szexuális vágy zavar
2. Erekción zavar
3. Idő előtti (korai) ejakuláció
4. Késői ejakuláció

**Női szexuális diszfunkciók:**

1. Női szexuális érdeklődés/készenlét zavar (korábban hipoaktív szexuális vágy zavar és szexuális készenlét zavar)
2. Női orgazmus zavar
3. Genitális-medencei fájdalom/behatólási zavar (korábban diszpareunia és vaginizmus)

# Nemi szerep diszfória (DSM-5)

(korábban Nemi identitás zavar, Transzszexualitás)

„Gender dysphoria” elnevezés (Fisk, 1973), egy spektrumot jelöl mindazok számára akiknek valamilyen mértékben, egyszer vagy többször inkongruens élményeik vannak saját biológiai nemükkel kapcsolatban.

*Biológiai nem* (sex): nemi szervek alapján

*Társadalmi nem* (gender): nemi identitás és nemi szerep egymáshoz kapcsolódó tényezőiből áll

## A nemi (gender) identitás fő komponensei

1. Gender kategóriába tartozás tudata
2. Gender tipikalitás
3. Gender elégedettség
4. Gender konformitásra való nyomás érzékelése
5. Elfogultság valamelyik nem irányában

## Nemi szerep diszfória gyermekeknél

A. Kifejezett össze nem illés a személy megtapasztalt/megnyilvánuló neme és a biológiai neme között, legalább 6 hónapon át, ami az alábbiak közül **legalább 6** tünetben nyilvánul meg: (az egyik mindenképpen az **A1** kritérium legyen)

## Nemi szerep diszfória gyermekeknél (DSM-5)

A. Kifejezett össze nem illés a személy megtapasztalt/megnyilvánuló neme és a biológiai neme között, legalább 6 hónapon át, ami az alábbiak közül **legalább 6** tünetben nyilvánul meg: (az egyik mindenképpen az **A1** kritérium legyen)

1. **Erős vágy arra, hogy más nemű legyen** vagy ahhoz való ragaszkodás, hogy ő a másik nemhez tartozik (vagy valamilyen egyéb, alternatív nemhez)
2. Fiúknál erős preferencia arra, hogy női ruhákba **öltözzenek** vagy utánozzák a női öltözködést; lányoknál erős preferencia arra, hogy csak tipikusan férfias ruhákat hordjanak, és erőteljesen ellenállnak annak, hogy tipikusan nőies ruhákat viseljenek
3. **Szerepjáték** vagy fantáziálás során erőteljes preferencia a másik nemi szerep felvételére
4. Erős preferencia olyan játékok vagy **tevékenységek** iránt, amelyek tipikusan a másik nemre jellemzőek
5. Erős preferencia a másik nembeli **játszótársak** iránt
6. Fiúknál a tipikusan fiús **játékok** és tevékenységek erőteljes **elutasítása** és a mozgalmas, vad játékok kerülése; lányoknál a tipikusan lányos játékok és tevékenységek erőteljes elutasítása
7. Kifejezetten **nem szereti a saját nemi jellegzetességeit**
8. Erős vágy arra, hogy olyan **külső/belső nemi jegyei** legyenek, amelyek megfelelnek annak, amilyen nemű szeretne lenni

B. Az állapot klinikai **jelentős szenvedést**, társas, foglalkozásbeli és egyéb károsodást okoz.

# Nemi szerep diszfória kamaszoknál és felnőtteknél

- A. Kifejezett **össze nem illés** a személy megtapasztalt/megnyilvánuló neme és biológiai neme között legalább hat hónapon át, mely az alábbiak közül legalább kettőben nyilvánul:
1. Kifejezett össze nem illés... elsődleges és/vagy másodlagos nemi jellege között
  2. Erős vágy arra, hogy a személy **megszabaduljon** elsődleges és/vagy másodlagos nemi jegyeitől, mivel ezek kifejezetten ütköznek megtapasztalt (kamaszoknál várt) nemi jegyeivel
  3. Erős vágy a másik nem elsődleges és/vagy másodlagos **nemi jellegei** iránt
  4. Erős vágy arra, hogy a személy **a másik nemhez tartozzon** (vagy valamilyen más nemhez, mint a biológiai neme)
  5. Erős vágy arra, hogy **úgy kezeljék**, mintha a másik nemhez tartozna
  6. Erős **meggyőződés**, hogy a személy a másik nemre jellemző **tipikus** érzelmeket és reakciókat birtokolja
- B. Az állapot klinikailag jelentős szenvedéssel és működési zavarral jár

Külön jelölni ha Poszttranzíciós (legalább egy nem-váltási kezelésen már átesett) eset

# A nemi szerep diszfória etiológiája, gyakorisága, diagnosztikája

- Felnőttkorban 0,3-05 % -os előfordulás a teljes populációban
- **Oka:** egyértelmű, átfogó magyarázat egyelőre nincs, **biológiai** (genetika: egypetűjű ikrek között nagyobb konkordancia, hormonális: pl. androgén hatás az agy fejlődés során), **pszichoszociális** (pl. szociális tanulás) és **kognitív-fejlődési modell** : pl. fejlődési lemaradás elmélete: a gender konzisztencia kialakulásában jön létre ismeretlen okból „lag”, vagy gender rigiditás elmélet : „rózsaszín fodros ruha jelenség”, ami normatív (Halim, 2013) kontra gender flexibilitás.
- **„Harmonikus nem”**: a nemi identitás alakulásában minden tényező megfelelő kölcsönhatásban működik
- Genetikai nem: a fogantatás pillanatában eldől, 6. héttől kezdődik az embrió nemi differenciálódása (testikuláris determináló faktor), majd Leydig sejtek , tesztoszteron ...
- Az agy maszkulinizációját a perinatális kori androgén hatások teszik visszavonhatatlanná
- A **nemhez tartozás felismerése** 2,5-3 éves kortól kezdődik, a **gender konzisztencia** 6-7 éves korra alakul ki, szex-szegregáció, csoportközi folyamatok, identitás validáló mechanizmusok segítségével.

# A nemi szerep diszfória felmérése

- **Felmérés:** diagnosztikai interjú, adolescensek és felnőttek esetén MMPI-2 gender skálái, Nemi identitás/nemi diszfória kérdőív adolescensek és felnőttek számára (Deogracias és mtsai, 2007)
- **GD-s gyermekek:** követéses tanulmányok: nagyrészüik nem válik felnőtt GD-vé (50-98%), Kisebb részük, akiknél nem perzisztál tovább, azonos neműekhez vonzódnak, de ezt szubjektíve heteroszexualitásként élik meg. Nagyobb részük (főleg férfiak) az azonos nemhez fognak vonzódni, és homoszexuálisként azonosítják magukat felnőttként.
- Autizmus spektrum zavarral való összefüggés!
- **GD-s adolescensek** : holland kutatók és klinikusok által képviselt kezdeményezés: biomedikális kezelés, a nem-átalakító beavatkozásra való felkészítés elkezdése már 18 éves kor előtt. Feltevések: kevés az esély arra, hogy pszichológiai intervenciók eredményesek legyenek, medikális beavatkozással pl. gátló hormonok segítségével csökkenteni lehet a pubertással megjelenő másodlagos nemi jegyek okozta fokozott inkongruenciát, csökkenthető a stressz és egyéb pszichopatológiai jelenségek. (pl. szuic.)
- **Rapid kezdetű** adolescens korú nemi dysphoria az elmúlt évtizedben
- ság.

## BNO-11 (2019, WHO)

- **S1 Text. The ICD-11 draft criteria of ‘Gender Incongruence of Adolescence and Adulthood’ of the WGSDSH criteria used in this study.**
- **Definition:**
- Gender Incongruence of Adolescence and Adulthood is characterized by a marked and
- persistent incongruence between an individual’s experienced gender and the assigned
- sex, which often leads to a desire to ‘transition’, in order to live and be accepted as a person of the experienced gender, through hormonal treatment, surgery or other healthcare services to make the individual’s body align, as much as desired and to the extent possible, with the experienced gender. The diagnosis cannot be assigned prior to the onset of puberty.
- 
- **Essential (Required) Features:**
- In adolescents and adults, a marked incongruence between the individual’s experienced gender and the assigned sex, as manifested by at least two of the following:
  - A strong dislike or discomfort with the one’s primary and/or secondary sex characteristics (in adolescents, anticipated secondary sex characteristics) due to their incongruity with the experienced gender.
  - A strong desire to get rid of some or all of one’s primary and/or secondary sex characteristics (in adolescents, anticipated secondary sex characteristics) due to their incongruity with the experienced gender.
  - A strong desire to have the primary and/or secondary sex characteristics of the experienced gender.
  - A strong desire to be treated (to live and be accepted) as a person of the
- experienced gender.
- The experienced gender incongruence must have been continuously present for at least several months.



# Felnőttkori nemi szerep diszfória (FTM) esete

- 21 éves, nem-váltási folyamat alatt álló (születési neme szerint) nő, egyetemista.
- **Külső:** filigrán, fiús hajviseletű, bizonytalan nemű megjelenés
- **Viselkedés** kissé gátlásos, bizonytalan, beszéd halk, stílus „köztes” –egyszerre nőies, férfias.
- **Panaszai:** érzelmi és hangulati labilitás, időszakos elbizonytalanodás, új nemi szerepének való fizikai és pszichológiai megfelelés problémái, kapcsolati problémák (család, barátok), korábbi partner elvesztése, diplomázás, munkába állás problémái.
- **Gyakorlati problémák:** hivatali eljárások, új név, személyi iratok cseréje

**Háttér:** vidéki kisváros, 12 é. szülők elválnak, egyedüli gyerek, apjától eltávolodott, anyja gondoskodó

- **Nemi identitás alakulása:** óvodás kortól nemi diszfória, inkongruencia; hangoztatta, hogy ő fiú akar lenni, autókkal játszott, nem érdekelte a babázás. Sokat csúfolták az óvodásban és az iskolában is fiús külleme miatt. Fiúkkal játszott, de ott is kapott „cikizést”. Gyermekpszichológus vizsgálta 7 éves korában, nem talált problémát. (?) Pubertás: menstruáció, és másodlagos nemi jegyek - fokozódó distressz! Testépítés!
- Kamaszkorában „rocker” lett, mert így kevésbé lógott ki a sorból, jobban elfogadták. Randevúztatás fiúkkal, csak kézfogás, szakítások, nem tudott önmaga lenni. Leszbikus próbálkozások: nem azonosult a női szereppel.
- 16 éves kora körül depressziós időszak, szuicid gondolatok, „vagdosás”
- Jó iskolai teljesítmény, egyetem, nagyvárosba kerülés. Csoporttársak között barátnők, kollégiumi szobatársak, jó adaptáció.
- **9 hónapos párkapcsolat** egy lesbikus nővel, aki támogatta, sőt forszírozta a nem-átalakítást. Érzelmileg és szexuálisan harmonikus kapcsolat, de a partner dominált, esetenként túlzó elvárásokat fogalmazott meg.(pl. férfiasság területén).
- Partner elvesztése után szűkebb családi körben „coming out”. Bár támogatást kap, ugyanakkor ellentmondásos, elbizonytalanító közléseket is. Barátnőinek is felfedte terveit, hasonló reakció, nyíltan támogatás, de halódik a kapcsolat velük. Transzneműekkel való kapcsolat –internetes fórumok- ellentmondásos tapasztalatok.

## A szexuális zavarok osztályozása DSM-5

| A szexuális válasz-ciklus érintett fázisa | Férfiak   | Nők  |
|---|---|--|
| Vágy fázis                                | Hypoaktív szexuális vágy zavar                  | Szexuális érdeklődés/  |
| Izgalmi fázis                             | Erekciós zavar                                  | készenlét zavar<br>(vágy és izgalmi fázis zavar összevonása) |
| Orgazmus                                  | Késleltetett ejakuláció<br>Időelőtti ejakuláció | Női orgazmus zavar   |
| Fájdalom                                  |   | Genitális-medencei fájdalom/behatólási zavar                 |

# Férfi hipoaktív szexuális vágyzavar DSM-5


- A.** A szexuális/erotikus **gondolatok vagy fantáziák** és a szexuális tevékenység iránti **vágy** tartós, vagy visszatérő deficienciája (vagy hiánya). A deficienciát a klinikus ítéli meg az életkor és egyéb tényezők alapján.
- B.** Az A kritériumban szereplő tünetek legalább 6 hónapja fennállnak
- C.** Klinikailag jelentős szenvedést okoz
- D.** Nem magyarázható más mentális zavarral
  - Jelölni az alábbiakat: egész életen át tartó, vagy szerzett, generalizált, vagy helyzeti, valamint, hogy enyhe, mérsékelt, vagy súlyos.
  - **Gyakoriság:** 14-18 %, gyakran rejtve marad, sokszor a partner sem forszírozza a probléma feltárását!
  - **Nagy egyéni variabilitás**, mi számít csökkentnek? „C” kritérium fontos!
  - Háttérben: biol., pszichol., kapcsolati és szociokulturális hatások komplex interakciója  
Életkor előrehaladtával nő a rizikó, de ez nemcsak fiziológiai folyamat, holisztikus megközelítés szükséges! (attitűdök, szkriptek, szerepelvárások)
  - Gyakran egyéb szexuális zavar (pl. erektilis diszfunkció) a háttérben, esetenként **szorongás**( intimitástól, kontrollvesztéstől, kudarctól) **depresszió**, szexuális bántalmazás, a szokványos szexuális ingerekhez való habituáció, **partner vonzerejének csökkenése**

# Férfi hipoaktív szexuális vágyzavar kialakulásának tényezői

- **Kapcsolati tényezők** ( főképp elkötelezett kapcsolatokban lép fel, kommunikációs zavarok, intimitáshiány, hosztilitás, domináns vagy kontrolláló partner), **partner komplementer diszfunkciója gyakori** (pl. diszpareunia, orgazmuszavar)
- **Kognitív tényezők:** kognitív elterelődés, interferencia, „should-izmus”, szexuális szkriptek szerepe (merev, maszkulin szkriptek)  
Erotikus gondolatok hiánya szex közben: ez a legjobb prediktora a szexuális vágyzavarnak! (Carvalho és Nobre, 2011)
- **Szociokulturális tényezők:** szexuális ingerekhez való könnyű, anonim hozzáférés (internetes pornó)
- Férfiasság ábrázolás, nők tárgyiasítása - vulnerabilis egyéneknél szexuális elégtelenség érzés
- **Eset:** túlkontrolláló, követelő feleség, maszturbáción „rajtakapott” férj, aki csak hetente kétszer kezdeményez, ezt a feleség nehezményezi. Feleség nem kezdeményez, úgy gondolja a férje kell, hogy izgalomba jöjjön spontán, pusztán az ő jelenlététől!

# A női szexuális válaszciklus cirkuláris modellje

(R. Basson)



# Női szexuális érdeklődés/készenlét zavar DSM-5

- A. A szexuális érdeklődés/készenlét jelentős csökkenése vagy hiánya, az alábbiak közül **legalább 3**:
  1. A szexuális tevékenység iránti **érdeklődés** csökk. v.h.
  2. Szexuális/erotikus **gondolatok, vagy fantáziák** csökk. v. h.
  3. A szexuális tevékenység **kezdeményezésének** csökk. v.h. és a partner kezdeményezéseire adott **reakció** hiánya
  4. A szexuális tevékenység során a szexuális **izgalom/öröm** csökkenése v. h. minden v. csaknem minden szexuális együttlét során
  5. Csökkent/hiányzó szexuális érdeklődés/készenlét bármilyen **külső szexuális kulcsingerre**
  6. Csökkent/hiányzó genitális vagy nem genitális **érzetek** szexuális tevékenység során
- B. A tünetek legalább 6 hónapja fennállnak
- C. Klinikailag jelentős szenvedést okoznak
- D. Nem magyarázható jobban más mentális zavarral, súlyos kapcsolati problémával, más jelentős stresszorzal stb.

# Női szexuális érdeklődés/készenlét zavar előfordulása, háttértényezői

- Gyakoriság: korábbi vizsgálatok: 20-30 % az átlag populációban! DSM-5 utáni kritériumok alapján alacsonyabb prevalencia-adatok
- *A nők szexuális motivációja komplex*; a szexuális öröm átélésének vágya mellett számos párkapcsolati, és egyéb pszichológiai tényező alakítja.
- A zavar létrejöttében és fennmaradásában szerepet játszó faktorok:
- **Pszichológiai tényezők**: depresszió, szorongás, szexuális unalom, a szokásos ingerek egyre kevésbé váltják ki önmagukban a vágyat, önértékelési zavar, negatív érzések, indulatok, stresszhatások szexuális traumák
- **Kognitív-affektív faktorok**: negatív szexuális attitűd, szexuális önértékelés zavara, teljesítményszorongás, szexuális bűntudat, maszturbációs bűntudat, szorongás ellentmondásos szerepe: kísérletileg kiváltott szorongást követően fokozott genitális válaszreakció, de kisebb szubjektív izgalom, kognitív disztrakció (nem-szexuális témák, negatív testkép)
- **Interperszonális tényezők**: negatív szkriptek, szexuális non-asszertivitás, partner szexuális kompetenciájának problémái, ill. diszfunkciói, ellentmondásos női szerepelvárások

# Női szexuális érdeklődés / készenlét zavar háttértényezői

- ▶ **Negatív érzelmi, hangulati állapot (state emotions)**
- ▶ Szorongás, depresszió, szexuális bántalmazás, szexuális bűntudat
- ▶ Kapcsolati tényezők: **formalizált kapcsolatokban** a szeretet, biztonság, elkötelezettség, érzelmi közelség érzése **kevésbé** vezet szexuális vágy létrejöttéhez!(McCall, Meston, 2006)  
Házasság számára a kapcsolat intézményesítettsége, és a **deszexualizált szerepek** (pl. anyai) kevésbé táplálják az erotikus vágyat.
- ▶ **Adekvát szexuális ingerlés** problémái, partner szexuális igényei, attitűdje, diszfunkciója
- ▶ **Kognitív tényezők** :  
negatív attitűd szerepe, szexuális szkriptek (női szkriptek: passzivitás, monogámia, férfiak: magas szintű nemi vágy, és aktivitás), figyelmi disztrakció, szexuális önkép problémái  
női szexualitás cirkuláris modellje (Basson, 2002) - reszponzív szexuális vágy jelentősége  
„incentive motivation theory” - integratív modell, melyben a biológiai, pszichológiai és kontextuális faktorok interakciója alapozza meg az aktuális szexuális érdeklődést és készenlétet (Laan, 2008)
- ▶ **Tanulási tényezők**: habituáció, szexuális unalom, operáns tanulási tényezők



# Női szexuális vágy/készenlét zavar esete

17 éves középiskolás lány, szexuális érdeklődés, vágy elvesztése panasszal

**Háttér:** elvált szülők, elhanyagoló apa, majd a válási krízisben súlyosan leértékelődő anya („nem tudok felnézni rá, mint nőre vagy anyára, undorodom tőle”)

- 10 éves a válási krízis idején, ekkortájt talál pornó irodalmat, agresszív szex, melyben a nő szexuális tárgy, személytelen, erős maszturbációs készlet, speciális fantázia repertoár.
- Iskolai **beilleszkedési nehézségek**, kortárs csoport felé extrém elfogadási igény
- 14 é.: deviáns magatartásformák felvétele, „különlegesség” státusz iránti vágy, szerhasználat, kontrollvesztett állapotok, promiszkuus szexuális kapcsolatok, **uralom szerzés a férfiak felett**, kihívó öltözködéssel, csábítással.
- Szexuális viselkedés: eleinte rövidebb, vagy csak alkalmi kapcsolatok, melyekben a partner igényeinek való megfelelés vezet, saját szexuális élvezetet nem él meg azt **megjátssza**. Néha valós orgazmus, ha a maszturbációs fantáziáit mozgósítja.
- Disszociált szexuális élménymód, a testét „használatba adja” a másoknak, ő maga, mint személy nem vesz részt az együttlétben.
- Egy éve absztinens, szeretne kölcsönösségen alapuló, számára is élvezettet nyújtó kapcsolatot, de **nem érez vágyat, nem jön izgalomba**.
- Új partneréhez érzelmileg közel került, vele el tudná engedni magát.

# Erekciós zavar

## DSM-5

- A. Az alábbiak közül legalább egy tapasztalható:
1. Az erekció **elérésének** kifejezett nehézsége a szexuális tevékenység során
  2. Az erekció **fenntartásának** kifejezett nehézsége a szexuális tevékenység befejezéséig
  3. Az erekciós **merevség** kifejezett **csökkenése**

B. Legalább 6 hónapja ...stb.

Jelölni: - egész életen át tartó, vagy szerzett  
- generalizált, vagy helyzeti  
- súlyosság: enyhe, közepes, súlyos

**Prevalencia:** 30-as korosztály: 2-16%, 40-esek: 9-39%, 70-esek: 37-83 %

**Pszichológiai rizikótényezők:** életstílus!!! (alkohol, drogok, elhízás)

- Teljesítményszorongás
- Negatív szexuális attitűd
- Alulinformáltság, vallási előírások diszfunkcionális értelmezése,
- Interakcionális tényezők (státusz, dominancia, intimitás, szexuális szkriptek, vágy kémiaja)
- Kognitív elméletek (**kognitív elterelődés**, **interferencia**, pozitív feed-back helyett **nem releváns ingerek a fókuszbán**, ez a megemelkedett fiziológiai aktivitás révén megerősítődik, **latin machó attitűd**, szexuális **kudarc katasztrófizálása**, nők kielégülési igényeivel kapcsolatos, **túlbecslő attitűd**)

# Erekciós zavar esete

- 23 éves fiatalember, egyetemet végzett, 1 éves párkapcsolat.
- Panaszai: **kiszámíthatatlan erekció**, gyakran a behatolástól számított 3 perc múlva megszűnik, máskor eleve lehetetlen a behatolás.
- **Pszichoszexuális fejlődés**: bizonytalan önértékelésű apa, szorongó anya, intimitást nélkülöző kapcsolat.

7 éves korában fitymaszűkület- miatt „körülmetelés”, **szégyen**, fájdalmak a műtét előtt és után. Rejtegetés a zuhanyzóban. Kissé megkésett pubertás, gúnyolódás a fiúk részéről. **Péniszével és küllemével is elégedetlen**, gátlásos a lányokkal, noha amúgy nyitott, humoros. Barátainak már vannak szexuális kalandjai, (megint cikizés.)”Mire kiszőrösödtem, a srácok közölték, hogy azt a lányok nem szeretik, borotváljam le”. Első próbálkozások **ittasan**: erektilis diszfunkció, fokozódó szorongás: „kétségbe voltam esve, ha volt esély a szexre”. Első sikeres aktus: 20 éves korában, majd ismét változó erekciós stabilitás.

- Bizonytalan szexuális énkép, fokozott kudarcérzékenység, félelem a leértékelődéstől („ha nincs erekcióm, elhagy a partnerem, sőt nem lesz feleségem, nem lesznek gyerekeim...”)
- Jelen kapcsolatában is hullámzó „teljesítmény”, vannak „jó szériák”, főleg ha spontán alakul az együttlét.
- Partner introvertált, kritikus, a szexben passzív, előre konstruált forgatókönyv szerint várja az orgazmust. A terápiára már a kapcsolatot végóráiban miatt kerül sor.

# Női orgazmus zavar

- A. Az alábbiak közül bármelyik:
1. Az orgazmus tartós vagy ismétlődően előforduló **késése, ritkasága** vagy **hiánya**
  2. Az orgazmussal kapcsolatos **érzetek jelentős csökkenése**
- B. Legalább 6 hónapja fennáll, az esetek 75%-ban...

**A női orgazmust nagyfokú variabilitás jellemzi!**

**Típusa, kiváltási módja (genitális, nem-genitális, képzeleti) időtartama, és konzisztenciája valamint a hozzá fűzött jelentések és kapcsolódó érzelmek egyaránt igen változatosak lehetnek.**

**WHO orgazmus meghatározása:** ...”csúcsélmény, intenzív élvezet, módosult tudatállapot, akaratlan, ritmikus izomösszehúzódások a medencei és vaginális izmokban, gyakran az uterusban és az anusban is .. oldódás, elégedettség, jóllét”

Prevalencia: DSM-5 kritériumok alapján 3-10 %, korábbi vizsgálatok: 3-34%

Fiatal nők körében gyakoribb!

## **Pszichológiai tényezők:**

- Személyiségtényezők: introverzió, új élményekre való nyitottság hiánya, neuroticizmus
- Szorongásos tünetek, hangulatzavarok, stressz, szexuális traumák, múltbeli negatív szexuális élmények
- Kognitív elterelődés jelentősége, kudarcral kapcsolatos kogníciók jelenléte, erotikus gondolatok hiánya, az élményben való elmerülés nehézségei (frontális kéreg bizonyos területeinek.deaktivációja szükséges!)
- Kontroll-vesztéstől való félelem
- Szociokulturális tényezők (vallás, edukáció jó kislány szkript, teljesítménykövetelmények, tettetett orgazmus)
- Kapcsolati tényezők: a kapcsolati elégedettség, boldogság szorosan összefügg az orgazmus konzisztenciával, minőséggel, elégedettséggel. Fontos az orgazmus érzelmi minősége! Kommunikáció szerepe!

# Késői ejakuláció

A. Az alábbi tünetek valamelyike tapasztalható a partnerrel kapcsolatos szexuális tevékenység során majdnem minden vagy minden esetben, anélkül, hogy a személy vágya a késleltetésre

1. jelentősen **késleltetett ejakuláció**
2. igen ritka, vagy **hiányzó ejakuláció**

B.,C.,D: 6 hónapja fennáll, klinikailag jelentős szenvedést okoz, nem magyarázható jobban más...

Jelölni: egész életen át tartó vagy szerzett; generalizált vagy helyzeti; jelen súlyosság

- Relatív ritka (0-3 %) SSRI-ok , 5 alfa reduktáz inhibitorok (hajhullás kezelésben) szedésének szerepe!
- Egyéb ejakulációs zavaroktól elkülönítendő: anejakuláció, fájdalmas e., retrográd e., az ejakuláció érzetével, mennyiségével, erejével kapcsolatos problémák

**Tünetek:** megfelelő vágy és izgalom valamint adekvát stimuláció (maszturbáció, partner általi, közösülési, anális) ellenére az ejakuláció késése, elmaradása. Csökkent közösülési aktivitás, **csökkent szubjektív izgalmi szint**, teljesítményszorongás, szexuális elégedetlenség, kapcsolati distressz, jellemző.

**Orgazmus és ejakuláció** elkülönülő fiziológiai jelenségek, de általában szimultán zajlanak.

**Az ejakulációs küszöb** genetikailag predeterminált, melynek eloszlási görbéje hasonlít az egyéb humán jellemzőkére, ugyanakkor számos pszichoszociális és kulturális faktor befolyásolja. Nem trigger-pont, inkább felhőszerű eloszlás. Mentális és fizikai tényezők dinamikus egyensúlya. Korral csökkenő pénisz szenzitivitás és annak variabilitása, ejakulációs reflex egyéni variabilitása!

- **Pszichológiai modell:** kapcsolódó tényezők: gyakoribb maszturbáció, **különleges maszturbációs stílus** (sebesség, intenzitás, tartam, trigger pont), **eltérés a preferált szexuális fantáziák és a reális partner** nyújtotta ingerek között. Jelentős részük maszturbációval könnyebben jut orgazmushoz, mint közösüléssel.

# Időelőtti (korai) ejakuláció

- Az ejakuláció **minimális stimulációra** bekövetkezik a személy akarata ellenére, a penetráció előtt, közben vagy rögtön utána
- DSM-5: A partnerrel való szexuális tevékenység során a vaginális behatolást követően mintegy **egy percen belül** és az egyén által **kívántnál hamarabb** bekövetkező ejakuláció tartós vagy visszatérő mintázata.
- Jelölni: lifelong vagy szerzett , szituatív vagy generalizált, súlyosság
- Az **esetek 2/3-a élethosszig tartó** (lifelong) típusba tartozik! **Fontos a különbségtétel**, mert ebben a csoportban kisebb a pszichológiai intervenciók hatékonysága!
- Az átlag populációban ez az idő: 1-10 perc Intravaginális Ejakulációs Látencia Idő (IELT) medián: 5,4 perc
- Ha az IELT 1 perc alatt van, akkor definitív Időelőtti ejakuláció, ha 1-1,5 perc között, akkor valószínűsíthető
- **Ez a leggyakoribb ffi szexuális zavar** (20-30 %-os éves prevalencia értékek. Az életkor nem befolyásolja a gyakoriságot! Csak kb. tizedrészük kér segítséget!
- Genetikai predispozíció szerepe
- Evolúciós hipotézis, glansz pénisz hiperszenzitivitás
- **Ejakulációs disztribúció teória** - az ejakulációs idő egy biológiai kontinuum, balra tolódott görbe (gyakoribb feketék, spanyolok, iszlám háttérűek, alacsonyabban iskolázottak között)
- Egészségügyi faktorok ( túlsúly, prosztatata gyulladás, pajzsmirigy stb.)

# Idő előtti (korai) ejakuláció

## Pszichológiai elméletek:

1927- Karl Abraham: tudattalan ellenséges érzések a nők iránt, passzív öröm a kontroll feladásával (ejakuláció, mint bevizelés)

Pszichodinamikus teóriák: pl. a szorongás a fő komponens, a sötét, láthatatlan vaginától való félelem vált ki fóbiás választ

1970 - Masters és Johnson: tanuláselméleti megközelítés: korai tapasztalatok rögzülése, első szexuális élményekhez köthető idegesség (autó hátsó ülés)

Kaplan: a szenzoros tudatosság hiánya, a saját szexuális izgalmi szintre vonatkozó feed-back nem működik megfelelő mértékben

Teljesítményszorongás: inkább tünetfenntartó szerep, elvonja a figyelmet az izgalmi szintre való fókuszálástól

**Kognitív tényezők:** szenzoros tudatosság jellegzetességei - saját izgalmi szintjük beazonosításában hiányzik a „köztes” tartomány felismerése, már csak az elkerülhetetlen ejakulációt észlelik. Kognitív disztorziók: pl. katasztrófizálás, kategorikus imperatívusz stb., szkriptek szerepe

**Pszichoszexuális készség deficit:** nem tanulták meg ütemezni a szexuális izgalmi szintjüket

**Hatása:** egyéni és kapcsolati életminőség csökkenés, depresszió, szexuális önbizalom csökkenés, zavar, elkerülő viselkedés, szorongás, kapcsolati distressz, szexuális elégedetlenség, intimitáscsökkenés,

**Felmérés:** klinikai interjú, IELT idő stopper órával, észlelt kontroll mértéke a páciens beszámolója szerint ,

# Vaginizmus DSM IV.-TR.

- A vagina külső egyharmadának akarattól független izom-spazmusa, melyhez más medencei izomcsoportok, hasizmok, comb adduktorok, farizmok is csatlakozhatnak

Kritika: az izomspazmus nem specifikus, és a definíció nem tartalmazza a fájdalom kritériumát.

Akarattól független medencei izomösszehúzódás, fájdalom élmény, vagy attól való félelem, elkerülés.

- Megnövekedett medencei izomtónus, ugyanakkor gyengült izomerő!
- Már a szexuális aktivitás anticipációja is kiválthatja
- Gyakorisága az átlag pop.-ban max. 1 %
- Más szexuális problémákhoz, jellemzően izgalmi zavarhoz társulhat.
- Kondicionálási elmélet ( első behatolási kísérlethez köthető tanulási folyamat)
- Szexuális trauma (inkonzisztens adatok), partner diszfunkciója, vallási meggyőződés, tirannikus apa, terhességtől való félelem.



# Dyspareunia DSM IV.-TR

- A szexuálisan aktív nők **12-15 %-a** érintett, menopauza után: 45 %
- Ismételt, vagy tartós fájdalom közösülés során (mindkét nem), mely nem vezethető vissza kizárólag vaginizmusra, vagy a vaginális lubrikáció elmaradására.

Kritika: átfedés lehetséges a vaginizmussal

- Lokalizáció: felszíni ( hüvelybemenet, vesztibulum, perineum) és mély
- Lehet azonosidejű, és tartósabb (percek, órák, napok)
- Generalizált forma: minden fajta érintés (biciklizés, ülés, szoros fehérnemű) kiváltja
- Komorbid szorongásos zavarok, magasabb vonás-kkszorongás szint
- VVS: erotofóbia, és negatív szexuális attitűd magasabb aránya
- Hosztilitás, depresszív tünetek
- Félelem a fájdalomtól, köv. elkerülés?
- Szorongás, mint fenntartó tényező is
- Katasztrofizáló attitűd a közösülési fájdalomra vonatkozóan

# Genitális-medencei fájdalom/behatólási zavar DSM-5

- A. Az alábbiak közül egy vagy több tartósan fennálló vagy visszatérő **nehézséget** jelent:
1. Hüvelyi **behatólás** az együttlét során
  2. Kifejezett vulvovaginális vagy medencei **fájdalom** a hüvelyi együttlét vagy a behatólási kísérletek során.
  3. Kifejezett fájdalom vagy **szorongás** a vulvovaginális vagy kismedencei fájdalommal kapcsolatban a hüvelyi behatólás gondolatára, annak során, vagy annak következtében.
  4. A **medencei izomzat kifejezett feszülése** a hüvelyi behatólási kísérletek során.
- B. Legalább 6 hónapja
- C. Jelentős szenvedést okoz
- D. Nem magyarázható jobban más...

Jelölni: **egészéletem át tartó vagy szerzett**, generalizált, vagy helyzeti, súlyosság?

**Lifelong vaginizmus:** gyakoriság: 0,4-6% (Christensen, 2011)

Tünetei: félelem a vaginális penetrációtól, akaratlan medenceizom kontrakció, fájdalom és félelem anticipáció, elkerülő viselkedés

# Genitális medencei fájdalom/behatólási zavar

**Súlyossági fokozatai** nőgyógyászati vizsgálat helyzetében: (Pacik, 2010) 1-5

1.: körülírt izomkontrakciók, de még megnyugtatható

5.: egész medencére kiterjedő izomkontrakció, test elhúzása, vegetatív reakciók (hiperventilláció, hányinger), vizsgálóágyról való leugrás, orvos megtámadása iránti vágy

## Pszichológiai elméletek

- szexuálisan konzervatív kultúrákban szignifikánsan gyakoribb!
- vallásos, konzervatív attitűd szerepe, szexuális edukáció hiányosságai, szexuális abúzus, kapcsolati tényezők szerepe felmerül, de nem bizonyított (Lankveld, 2010)
- Szexuális ingerekre nagyobb arányban negatív kognitív-affektív válasz, negatív genitális önkép, (undorodnak saját nemi szervüktől,) negatív testkép, irreális aggodalmak a nemi szervek inkompatibilitásáról
- „Behatólás fóbia”- félelem-elkerülés modell (Vlaeyen, Linton, 2000)  
Behatólási kísérlet—katasztrofizáló gondolatok---félelem a fájdalomtól/penetrációtól----hipervigilancia---medencei izom feszülés---elkerülés

**Felmérés:** klinikai interjú, FSFI, nőgyógyászati vizsgálati reakciók felmérése – Pacik skála (5 fokozat)

# Női szexuális funkció index - FSFI

## A Női Szexuális Funkció Index (Rosen és mtsai, 2000)

JELÖLJE A MEGFELELŐ NÉGYZETBEN AZT A VÁLASZT, AMI AZ ELMÚLT 4 HETET TEKINTVE A LEGJOBBAN ILLIK ÖNRE!

- 1. Az elmúlt 4 hétben milyen gyakran érzett szexuális vágyat vagy érdeklődést?**
  - 5. Majdnem mindig vagy mindig
  - 4. Legtöbbször (több mint az esetek felében)
  - 3. Néha (kb. az esetek felében)
  - 2. Alkalmanként (kevesebbszer, mint az esetek felében)
  - 1. Szinte sohasem vagy soha
- 2. Az utóbbi 4 hétben hogyan értékelné szexuális vágyának vagy érdeklődésének szintjét (fokát)?**
  - 5. Nagyon magas
  - 4. Magas
  - 3. Közepes
  - 2. Alacsony
  - 1. Nagyon alacsony vagy egyáltalán nem volt
- 3. Az elmúlt 4 hétben milyen gyakran érzett szexuális izgalmat közösülés vagy szexuális tevékenység közben?**
  - 0. Nem volt szexuálisan aktív
  - 5. Majdnem mindig vagy mindig
  - 4. Legtöbbször (több mint az esetek felében)
  - 3. Néha (kb. az esetek felében)
  - 2. Alkalmanként (kevesebbszer, mint az esetek felében)
  - 1. Szinte sohasem vagy soha
- 4. Az elmúlt 4 hétben hogyan értékelné szexuális izgalmi szintjét közösülés vagy szexuális tevékenység közben?**
  - 0. Nem volt szexuálisan aktív
  - 5. Nagyon magas
  - 4. Magas
  - 3. Közepes
  - 2. Alacsony
  - 1. Nagyon alacsony vagy egyáltalán nem volt
- 5. Az elmúlt 4 hétben mennyire volt magabiztos a szexuális izgalmi állapot elérésében közösülés vagy szexuális tevékenység során?**
  - 0. Nem volt szexuálisan aktív
  - 5. Rendkívül magabiztos
  - 4. Nagyon magabiztos
  - 3. Mérsékelten magabiztos
  - 2. Kissé magabiztos
  - 1. Nagyon kicsit vagy egyáltalán nem magabiztos
- 6. Az elmúlt 4 hetet tekintve milyen gyakran volt megelégedve szexuális izgalmi szintjével közösülés vagy szexuális tevékenység közben?**
  - 0. Nem volt szexuálisan aktív
  - 5. Majdnem mindig vagy mindig
  - 4. Legtöbbször (több mint az esetek felében)
  - 3. Néha (kb. az esetek felében)
  - 2. Alkalmanként (kevesebbszer, mint az esetek felében)
  - 1. Szinte sohasem vagy soha
- 7. Az elmúlt 4 hétben milyen gyakran vált síkossá (nedvessé) közösülés vagy szexuális tevékenység közben?**
  - 0. Nem volt szexuálisan aktív

# FSFI folyt.

- 5. Majdnem mindig vagy mindig
  - 4. Legtöbbször (több mint az esetek felében)
  - 3. Néha (kb. az esetek felében)
  - 2. Alkalmanként (kevesebbszer, mint az esetek felében)
  - 1. Szinte sohasem vagy soha
- 8. Az elmúlt 4 hétben mennyire volt nehéz a síkosság (nedvesség) elérése közösülés vagy szexuális tevékenység közben?**
- 0. Nem volt szexuálisan aktív
  - 1. Szélsőségesen nehéz vagy lehetetlen
  - 2. Nagyon nehéz
  - 3. Nehéz
  - 4. Kissé nehéz
  - 5. Nem nehéz
- 9. Az elmúlt 4 hetet tekintve milyen gyakran őrizte meg síkosságát (nedvességét) a közösülés vagy szexuális tevékenység befejezéséig?**
- 0. Nem volt szexuálisan aktív
  - 5. Majdnem mindig vagy mindig
  - 4. Legtöbbször (több mint az esetek felében)
  - 3. Néha (kb. az esetek felében)
  - 2. Alkalmanként (kevesebbszer, mint az esetek felében)
  - 1. Szinte sohasem vagy soha
- 10. Az elmúlt 4 hétben mennyire volt nehéz megőrizni síkosságát (nedvességét) a közösülés vagy szexuális tevékenység befejezéséig?**
- 0. Nem volt szexuálisan aktív
  - 1. Szélsőségesen nehéz vagy lehetetlen
  - 2. Nagyon nehéz
  - 3. Nehéz
  - 4. Kissé nehéz
  - 5. Nem nehéz
- 11. Az elmúlt 4 hétben szexuális izgatás vagy közösülés alkalmával milyen gyakran érte el az orgazmust?**
- 0. Nem volt szexuálisan aktív
  - 5. Majdnem mindig vagy mindig
  - 4. Legtöbbször (több mint az esetek felében)
  - 3. Néha (kb. az esetek felében)
  - 2. Alkalmanként (kevesebbszer, mint az esetek felében)
  - 1. Szinte sohasem vagy soha
- 12. Az utóbbi 4 hétben szexuális izgatás vagy közösülés alkalmával mennyire volt nehéz az orgazmus elérése?**
- 0. Nem volt szexuálisan aktív
  - 1. Szélsőségesen nehéz vagy lehetetlen
  - 2. Nagyon nehéz
  - 3. Nehéz
  - 4. Kissé nehéz
  - 5. Nem nehéz
- 13. Az elmúlt négy hétben mennyire volt elégedett az orgazmus elérésének képességével közösülés, illetve szexuális tevékenység közben?**
- 0. Nem volt szexuálisan aktív
  - 5. Nagyon elégedett
  - 4. Mérsékeltlen elégedett
  - 3. Egyenlő mértékben elégedett és elégedetlen
  - 2. Mérsékeltlen elégedetlen
  - 1. Nagyon elégedetlen



- 14. Az elmúlt 4 hét során mennyire volt elégedett a szexuális tevékenység alatt elért érzelmi közelség mértékével Ön, és a partnere között?**
- 0. Nem volt szexuálisan aktív
  - 5. Nagyon elégedett
  - 4. Mérsékelten elégedett
  - 3. Egyenlő mértékben elégedett és elégedetlen
  - 2. Mérsékelten elégedetlen
  - 1. Nagyon elégedetlen
- 15. Az elmúlt 4 hetet tekintve mennyire volt elégedett a partnerével való szexuális kapcsolattal?**
- 5. Nagyon elégedett
  - 4. Mérsékelten elégedett
  - 3. Egyenlő mértékben elégedett és elégedetlen
  - 2. Mérsékelten elégedetlen
  - 1. Nagyon elégedetlen
- 16. Az elmúlt 4 hét során általánosságban mennyire volt elégedett a szexuális életével?**
- 5. Nagyon elégedett
  - 4. Mérsékelten elégedett
  - 3. Egyenlő mértékben elégedett és elégedetlen
  - 2. Mérsékelten elégedetlen
  - 1. Nagyon elégedetlen
- 17. Az elmúlt 4 hétben milyen gyakran tapasztalt kellemetlenséget vagy fájdalmat hüvelyi behatolás során?**
- 0. Nem próbált meg közöszülni
  - 1. Majdnem mindig vagy mindig
  - 2. Legtöbbször (több mint az esetek felében)
  - 3. Néha (kb. az esetek felében)
  - 4. Alkalmanként (kevesebbszer, mint az esetek felében)
  - 5. Szinte sohasem vagy soha
- 18. Az elmúlt négy hét alkalmával milyen gyakran tapasztalt kellemetlenséget vagy fájdalmat a hüvelyi behatolást követően?**
- 0. Nem próbált meg közöszülni
  - 1. Majdnem mindig vagy mindig
  - 2. Legtöbbször (több mint az esetek felében)
  - 3. Néha (kb. az esetek felében)
  - 4. Alkalmanként (kevesebbszer, mint az esetek felében)
  - 5. Szinte sohasem vagy soha
- 19. Az elmúlt 4 hetet tekintve hogyan értékelné a hüvelyi behatoláskor, illetve azt követően fellépő kellemetlenség, vagy fájdalom szintjét (fokát)?**
- 0. Nem próbált meg közöszülni
  - 1. Nagyon magas
  - 2. Magas
  - 3. Közepes
  - 4. Alacsony
  - 5. Nagyon alacsony vagy egyáltalán nem volt
- 20. Az elmúlt 4 hétben milyen gyakran fordult elő, hogy vaginája külső harmadának akaratlan összehúzódása megakadályozta a hüvelyi behatolást?**
- 0. Nem próbált meg közöszülni
  - 1. Majdnem mindig vagy mindig
  - 2. Legtöbbször (több mint az esetek felében)
  - 3. Néha (kb. az esetek felében)
  - 4. Alkalmanként (kevesebbszer, mint az esetek felében)
  - 5. Szinte sohasem vagy soha

# IIEF - Nemzetközi férfi erektilis funkció index

## Nemzetközi Férfi Erektilis Funkció Index (Rosen és mtsai, 1997)

JELÖLJE A MEGFELELŐ NÉGYZETBEN AZT A VÁLASZT, AMI AZ ELMÚLT  
4 HETET TEKINTVE A LEGJOBBAN ILLIK ÖNRE!

- 1. Az elmúlt 4 hét folyamán, milyen gyakran ért el merevedést a szexuális tevékenység során?**
  - 0. Nem volt szexuális aktivitás
  - 1. Szinte soha/soha
  - 2. Néhány alkalommal (kevesebb, mint az esetek felében)
  - 3. Gyakran (körülbelül az esetek felében)
  - 4. Legtöbbször (több mint az esetek felében)
  - 5. Majdnem mindig/mindig
  
- 2. Az elmúlt 4 hét folyamán, amikor szexuális ingerlés hatására merevedése volt, ez hány esetben volt elég kemény a behatoláshoz?**
  - 0. Nem volt szexuális ingerlés
  - 1. Szinte soha/soha
  - 2. Néhány alkalommal (kevesebb, mint az esetek felében)
  - 3. Gyakran (körülbelül az esetek felében)
  - 4. Legtöbbször (több mint az esetek felében)
  - 5. Majdnem mindig/mindig
  
- 3. Az elmúlt 4 hét folyamán szexuális együttlét során hány esetben volt képes a behatolásra partnerével?**
  - 0. Nem volt szexuális együttlét
  - 1. Szinte soha/soha
  - 2. Néhány alkalommal (kevesebb, mint az esetek felében)
  - 3. Gyakran (körülbelül az esetek felében)
  - 4. Legtöbbször (több mint az esetek felében)
  - 5. Majdnem mindig/mindig
  
- 4. Az elmúlt 4 hét folyamán szexuális együttlét során hány esetben volt képes fenntartani merevedését a behatolást követően?**
  - 0. Nem volt szexuális együttlét
  - 1. Szinte soha/soha
  - 2. Néhány alkalommal (kevesebb, mint az esetek felében)
  - 3. Gyakran (körülbelül az esetek felében)
  - 4. Legtöbbször (többször, mint az esetek felében)
  - 5. Majdnem mindig/mindig
  
- 5. Az elmúlt 4 hét folyamán szexuális együttlét során mennyire volt nehéz fenntartania a merevedését a behatolást követően?**
  - 0. Nem volt szexuális együttlét
  - 1. Rendkívül nehéz
  - 2. Nagyon nehéz
  - 3. Nehéz
  - 4. Kissé nehéz
  - 5. Egyáltalán nem nehéz
  
- 6. Az elmúlt 4 hét folyamán hány alkalommal tett kísérletet szexuális együttlételre?**
  - 0. Nem volt kísérlet
  - 1. Egy vagy két alkalommal
  - 2. Három vagy négy alkalommal
  - 3. Öt vagy hat alkalommal
  - 4. Hét vagy tíz alkalommal
  - 5. Tizenegy vagy több alkalommal

# IIEF folyt.

7. **Az elmúlt 4 hét folyamán, amikor szexuális együttlétet kísérelt meg, milyen gyakran volt ez kielégítő az Ön számára?**
- 0. Nem volt szexuális együttlét
  - 1. Szinte soha/soha
  - 2. Néhány alkalommal (kevesebb, mint az esetek felében)
  - 3. Gyakran (körülbelül az esetek felében)
  - 4. Legtöbbször (több mint az esetek felében)
  - 5. Majdnem mindig/mindig
8. **Az elmúlt 4 hét folyamán mennyire élvezte a szexuális együttléteket?**
- 0. Nem volt szexuális együttlét
  - 1. Nem volt élvezetes
  - 2. Nem igazán élvezetes
  - 3. Elég élvezetes
  - 4. Nagyon élvezetes
  - 5. Rendkívül élvezetes
9. **Az elmúlt 4 hét folyamán szexuális ingerlés vagy együttlét során milyen gyakran ejakulált (volt magömlése)?**
- 0. Nem volt szexuális ingerlés
  - 1. Szinte soha/soha
  - 2. Néhány alkalommal (kevesebb, mint az esetek felében)
  - 3. Gyakran (körülbelül az esetek felében)
  - 4. Legtöbbször (több mint az esetek felében)
  - 5. Majdnem mindig/mindig
10. **Az elmúlt 4 hét folyamán szexuális ingerlés vagy együttlét során milyen gyakran élt át orgazmust vagy tetőpontot?**
- 0. Nem volt szexuális ingerlés
  - 1. Szinte soha/soha
  - 2. Néhány alkalommal (kevesebb, mint az esetek felében)
  - 3. Gyakran (körülbelül az esetek felében)
  - 4. Legtöbbször (több mint az esetek felében)
  - 5. Majdnem mindig/mindig
11. **Az elmúlt 4 hét folyamán milyen gyakran érzett szexuális vágyat?**
- 1. Szinte soha/soha
  - 2. Néhány alkalommal (kevesebbszer, mint az esetek felében)
  - 3. Gyakran (körülbelül az esetek felében)
  - 4. Legtöbbször (több mint az esetek felében)
  - 5. Majdnem mindig/mindig
12. **Az elmúlt 4 hét alapján hogyan értékelné szexuális vágya mértékét?**
- 1. Nagyon alacsony/egyáltalán nem érzett vágyat
  - 2. Alacsony
  - 3. Átlagos
  - 4. Magas
  - 5. Nagyon magas
13. **Az elmúlt 4 hét folyamán összességében mennyire volt elégedett a szexuális életével?**
- 1. Nagyon elégedetlen
  - 2. Inkább elégedetlen
  - 3. Azonos mértékben elégedett és elégedetlen
  - 4. Inkább elégedett
  - 5. Nagyon elégedett



**14. Az elmúlt 4 hét folyamán mennyire volt elégedett a partnerével való szexuális kapcsolatával?**

- 1. Nagyon elégedetlen
- 2. Inkább elégedetlen
- 3. Egyenlően elégedett és elégedetlen
- 4. Inkább elégedett
- 5. Nagyon elégedett

**15. Az elmúlt 4 hétben folyamán hogyan értékelné, mennyire volt biztos abban, hogy képes a merevedésre és ezt fenn is tudja tartani?**

- 1. Nagyon alacsony
- 2. Alacsony
- 3. Átlagos
- 4. Magas
- 5. Nagyon magas

**16. Az elmúlt 4 hét folyamán, amikor szexuális ingerlés során merevedése volt, mennyire volt nehéz orgazmust elérnie?**

- 0. Nem volt szexuális ingerlés/ nem volt merevedés
- 1. Rendkívül nehéz
- 2. Különösen nehéz
- 3. Nehéz
- 4. Kissé nehéz
- 5. Egyáltalán nem nehéz

**17. Az elmúlt 4 hét folyamán mennyire volt elégedett a szexuális tevékenység vagy együttlét közben tapasztalt orgazmus képességével?**

- 1. Nagyon elégedetlen
- 2. Inkább elégedetlen
- 3. Azonos mértékben elégedett és elégedetlen
- 4. Meglehetősen elégedett
- 5. Nagyon elégedett

**18. Az elmúlt 4 hét folyamán milyen gyakran ejakulált (volt magömlése) akaratlanul, illetve szexuális együttlétre való kísérlet előtt vagy röviddel utána?**

- 0. Nem volt szexuális tevékenység
- 1. Szinte soha/soha
- 2. Néhány alkalommal (kevesebb, mint az esetek felében)
- 3. Gyakran (körülbelül az esetek felében)
- 4. Legtöbbször (több mint az esetek felében)
- 5. Majdnem mindig/mindig

**19. Az elmúlt 4 hét folyamán a szexuális tevékenységek során mennyire volt nehéz kontrollálnia az ejakulációját (magömlését)?**

- 0. Nem volt szexuális ingerlés/ nem volt merevedés
- 1. Rendkívül nehéz
- 2. Nagyon nehéz
- 3. Nehéz
- 4. Kissé nehéz
- 5. Egyáltalán nem nehéz

**20. Az elmúlt 4 hét folyamán mennyire volt elégedett ejakulációja (magömlése) kontrollálásával szexuális tevékenység vagy együttlét során?**

- 1. Nagyon elégedetlen
- 2. Meglehetősen elégedetlen
- 3. Azonos mértékben elégedett és elégedetlen
- 4. Inkább elégedett
- 5. Nagyon elégedett