



SEMMELWEIS EGYETEM

Kollégiumok Igazgatósága

Igazgató

DR. GODÓ FERENC



SE11230056

22186/KOLLIG/2026.

Körl. 03/2026-KOLLIG

Tárgy: szőnyegbogár fertőzés


K Ö R L E V É L

Tisztelt Kollégisták!

A közelmúltban több jelzés érkezett egy új rovarfaj megjelenéséről és ismeretlen eredtű bőrtünetekről. A vizsgálatok azt mutatják, hogy az ágyi poloska mellett egyre gyakrabban jelenik meg a **szőnyegbogár**, amelynek jelenléte más típusú védekezést igényel.

Szőnyegbogár:

A szőnyegbogarak a természetben gyakori, virággal táplálkozó bogarak. A problémát a lárváik okozzák, amelyek a kollégiumba bejutva sötét helyeken rejtőzködnek, és állati és emberi eredetű anyagokkal (gyapjú, szőr, toll, elhullott rovarok, hajszálok) táplálkoznak.



Észlelés, a fertőzés jelei:


a) A "Gyapjas medve" lárvák

Ellentétben az ágyi poloskával, nem a kifejlett bogár a fő ellenség. A lárvák 4-5 mm hosszúak, barnás színűek, sűrű szőrrel borítottak, hernyószerűek. A fényt kerülik, így az ágyneműtartókban, szekrények alján, ágyak alatt találhatók meg.



b) Levedlett bőrök

A lárvák növekedésük során többször vedlenek. A hátrahagyott, áttetsző, szőrös, barnás lárvabőrök a fertőzés legbiztosabb jelei. Ezek gyakran a szegélylécek mentén vagy a szőnyegek alatt gyűlnek össze.



c) Tünetek (Szőnyegbogár-dermatitisz)

FONTOS: A szőnyegbogár **NEM CSÍP** és nem szív vért! A lárvák testét borító apró szőrök azonban érintkezéskor, vagy belégzéskor (pl. ha a lárvák az ágyba másznak, vagy a szőrök és az ürüléke a levegőbe kerülnek) allergiás reakciót válthatnak ki.

- **Különbőség az ágyi poloskától:** A kiütések apró, vörös göbök, amelyek elszórtan jelentkeznek, nem vonalas elrendezésben. A legfontosabb különbség: szőnyegbogár esetén **NINCS vérfolt** a lepedőn!

d) Kártétel

Szabálytalan rágásnyomok, lyukak a gyapjúpulóvereken, szőnyegeken vagy a szöveteken lévő kopott foltok jelzik a táplálkozásukat.

Teendők és Megelőzés:

A védekezés alapja a **TISZTASÁG** és a **PORSZÍVÓZÁS**. Mivel a lárvák a porban lévő hajszállakon és hámsejteken is megélnek, a vegyszeres irtás önmagában hatástalan, ha a higiénia nem megfelelő.

1. **Takarítás:** Porszívózzák ki alaposan a szobát hetente legalább egyszer, különös tekintettel a nehezen hozzáférhető helyekre (ágyak alatt, szekrények mögött).
2. **Hulladékkezelés:** A porszívózás után a porzsákot/tartályt azonnal ürítsék ki a külső szemetesbe!
3. **Tárolás:** A szezonális ruhákat tisztítás után zárt zsákokban tárolják.
4. **Szellőztetés:** Használjanak szűnyoghálót, ha lehetséges, hogy megakadályozzák a kifejlett bogarak berepülését. Tömeges rajzás májustól-júliusig jellemző.

Jelentési kötelezettség:

Kérünk Mindenkit, aki szőrös lárvákat, levedlett bőröket talál, vagy ismeretlen eredetű, nem vérző bőrkkiütéseket tapasztal, haladéktalanul jelezze a kollégiumi ügyintézőnél vagy a gondnokságon.

MINÉL GYORSABBAN JELZI AZ ÉRINTETT KOLLÉGISTA A SZŐNYEGBOGÁR MEGJELENÉSÉT, ANNÁL KÖNNYEBB MEGELŐZNI AZ ELTERJEDÉSÉT!

Kérem, legyenek partnerek a rend és a tisztaság fenntartásában, mert ez Mindannyiunk közös érdeke.

Budapest, 2026. február 05.



Dr. Godó Ferenc
s.k.
igazgató

