Lipide, Lipoproteine und Hyperlipoproteinämien

Prof. Dr. István **Karádi**

Semmelweis Universität

III. Medizinische Klinik

Molekülaufbau des Cholesterin

Sterangerüst

Cholesterinmolekül

Grundgerüst:

Cyclopentano-
perhydrophenantren

Cholesterin, ein ubiquitär Molekül

Vorläufer von Steroidhormonen
und Gallensäuren

Die Struktur der Gallensäuren

Ursodeoxycholsäure (UDCA)

24-Norursodeoxycholsäure (norUDCA)

Chenodeoxycholsäure (CDCA)

6-Ethylchenodeoxycholsäure (OCA, 6-ECDCA, INT-747)

Cholsäure (CA)

6-Ethyl-23(S)-methylcholsäure (S-EMCA, INT-777)

Cholesterin, ein ubiquitär Molekül

Bestandteil von Membranen und
subzellulären Kompartimenten
z.B. Mitochondrien

■ Mitochondrien: Die Kraftwerke der Zellen

Mitochondrien enthalten mehrere hundert verschiedene Proteine, von denen sie nur wenige selbst produzieren können. Alle anderen Proteine müssen auf komplizierten Wegen über Innen- und Außenmembran importiert werden.

Kanalprotein

Extrazellularraum

Kohlenhydratrest

eingelagertes Protein

hydrophile Anteile

Glykoprotein

Cholesterin

Transmembranprotein

angelagertes Protein

Phospholipid-Doppelschicht

Glykolipid

Phospholipid-Molekül

eingelagertes Protein

Zytoskelett-Filamente

Proteinhelix

hydrophobe Anteile

Cytoplasma

Triglyzeride

Neutralfette – die wichtigen
Energieträger

Glycerin

Palmitinsäure (16:0)

Ölsäure (18:1n-9)

Linolsäure (18:2n-6)

Triglycerid

Die Struktur der Phospholipide

Phospholipide

Phosphatidyl-cholin (Lecithin)
Alkoholkomponente: **Cholin**

Phosphatidyl-serin
Alkoholkomponente: **Serin**

Phosphatidyl-ethanolamin
Alkoholkomponente: **Ethanolamin**

Phosphatidyl-inositol
Alkoholkomponente: **Inositol**

Wasser
(extrazellulär)

hydrophil

hydrophob

hydrophil

Wasser
(intrazellulär)

Lipoprotein

Phospholipid

Triglycerid

unverestertes
Cholesterin

Cholesterin

Apolipoprotein

Lipoproteins and the arterial wall

Plasma Lipoproteine

Die Gesamt-Cholesterin Bestimmung I.

- Die gesamte Cholesterin-Bestimmung im Serum ist für die klinische Diagnostik von größter Bedeutung, gehört doch die Hypercholesterinämie zu den wesentlichen Risikofaktoren der Atherosklerose und deren Folgeerscheinungen.

Die Gesamt-Cholesterin Bestimmung II.

- Cholesterin kommt im Blut in relativ hoher Konzentration vor.
- Es ist normalerweise zu etwa 75 % mit Fettsäuren verestert und aufgrund seiner schlechten Wasserlöslichkeit an Lipoproteine gebunden.
- Diagnostisch von Bedeutung ist vor allem die Bestimmung des Gesamt-Cholesterins, d. h., der Summe des freien und veresterten Cholesterins.

Die Gesamt-Cholesterin Bestimmung III.

- Die bisher gebräuchlichen Verfahren zur Bestimmung des Cholesterins sind chemische Methoden basierend auf den Arbeiten von **Salkowski, Liebermann und Burchard**.
- Alle diese Methoden sind nicht spezifisch, besitzen eine große Fehlerbreite und werden bereits durch geringe Feuchtigkeitsmengen empfindlich gestört.
- So täuschen z. B. 0,17 mmol/l Bilirubin eine Erhöhung der gesamte Cholesterin-Konzentration um etwa 0,78 mmol/l Serum vor.
- Der Hauptnachteil dürfte jedoch in der Verwendung von stark ätzenden Reagenzien, wie konzentrierter Schwefelsäure, Essigsäureanhydrid und Essigsäure, liegen.

Die Gesamt-Cholesterin Bestimmung III.

Meerrettich-peroxydase

Die Gesamt-Triglyzeride Bestimmung I.

Vollenzymatische Triglyzeride Bestimmung durch die Verwendung einer Enzymkombination

Messung mit bichromatischer Technik (510, 700 nanometer)

HDL-Cholesterin Bestimmung

Grundlagen des Verfahrens (automatische HDL-C Bestimmung)

Erste Reaktion: Chylomikrone, VLDL, LDL bilden in Gegenwart von Magnesiumsulphat

wasserlösliche Komplexe mit Dextransulphate (resistent gegenüber PEG)

Weitere Schritte: PEG-modifizierte Cholesterinesterase und Cholesterinoxidase Wirkung ergibt 4-Cholestanon und

H_2O_2 $\longrightarrow$ Farbwentwicklung + H_2O

lipoprotein metabolism

Ref 10,
 pp 2733C,
 2734D

Klinisch wichtigste sekundäre Hyperlipoproteinämien

- Hypothyreosis
- Diabetes mellitus
- Nephrosis
- Alkoholismus

Klinische Formen der Hyperlipoproteinämien (Fredrickson Typen)

- Familiäre Hyperchylomicronämie (Typ I.)
- Familiäre Hypercholesterinämie (Typ IIa)
- Gemischter Typ Hyperlipoproteinämie (Typ IIb)
- Dysbetalipoproteinämie (Typ III)
- Familiäre Hypertriglyceridämie (Typ IV)
- Familiäre Hypertriglyceridämie mit Chylomicronämie (Typ V)

Donald S. Fredrickson

Familiäre Hyperchylomicronämie (Typ I.)

- Mangel der Lipoprotein Lipase (oder des Aktivators Apo C II)
- Autosomal rezessive Vererbung
- Prevalenz 1 : 1 Million in der kaukasischer Population

Klinische Symptomen: Extreme hohe Konzentration der Triglyzeride verursacht Kreislaufstörungen in dem Dünndarm und im Pancreas

Familiäre Hyperchylomicronämie (Typ I.)

- Rezidive Pancreatitis, abdominale Krämpfe wegen Kreislaufstörungen im Dünndarm, sehr selten neurologische Symptomen.
- Lipaemia retinalis, eruptive Xanthomatosis
- Laboratorische Ergebnisse:
 - Cholesterin < 6 mmol/l
 - Triglyzeride extrem erhöht (10-150 mmol/l)
- bei Pancreatitis: abhängig von der Entzündung hohe Amylase und Pancreas-Lipase werte im Blut und im Urin

24 Stunden im Kühlschrank auf 4°C

Figure 3. Lipemic serum (right)

Courtesy of Courtesy of R. A. Bowen DVM PhD

Department of Biomedical Sciences

Colorado State University

24 Stunden im Kühlschrank auf 4°C

Eruptive
Xanthomas

Typ II/a Hyperlipoproteinämie

- Hypercholesterinämie - Cholesterin > 6,5 mmol/l, Triglyzeride < 2,0 mmol/l, HDL-Cholesterin veränderlich
- Familiäre Hypercholesterinämie (FCH)
- Polygenische Hypercholesterinämie

lipämisch

normal

Familiäre Hypercholesterinämie (FCH)

Cholesterin > 8 mmol/l, Triglyzeride $< 2,0$ mmol/l

Schwere, früh manifestierende atherosklerotische Erkrankungen der Koronarien, Xanthelasmen, Xanthomen

Xanthelasmen

A

B

C

Familial hypercholesterolemia can be caused by mutations in 4 known genes

Autosomal Dominant Hypercholesterolemia Familial Hypercholesterolemia

	<u>FH1</u>	<u>FH2</u>	<u>FH3...</u>
chromosome	19p13	2p23-24	1p32
defect	LDL ↑	LDL ↑	LDL ↑
gene	<i>LDLR</i>	<i>APOB</i>	<i>PCSK9</i>

Uptake of LDL by peripheral cells

Familiäre kombinierte (gemischte) Hyperlipidämie

- Chol > 6,5 TG > 3,0 mmol/L
- Autosomal dominant vererbte Erkrankung (Häufigkeit ca. 1 : 100), molekulargenetisch noch unvollständig (genetische Veränderungen von USF-1-upstream stimulatory factor-1 in einzelnen Familien)
- Erhöhte Synthese von Apolipoprotein B 100
- Vorzeitige Atherosklerose – Akute Myokardial Infarktion
- Zusammenhang mit dem metabolischen Syndrom

24 Stunden im Kühlschrank auf 4°C

lipämisch

normal

Familiäre Dysbetalipoproteinämie (Typ III-Hyperlipoproteinämie)

- Obwohl die genetische Variante (Apolipoprotein Phänotyp E 2/2 = Apo E 2-Homozygotie) mit 1 : 100 relativ häufig ist, manifestiert sich die Stoffwechselstörung nur selten (1 : 5.000 bis 1 : 10.000).
- Die Cholesterinwerte liegen zwischen 8 und 20 mmol/l, die Triglyceride zwischen 5 bis über 15 mmol/l. Hohe Konzentration der Remnant(Rest)-Molekülen sind für erhöhte Plasma Lipide verantwortlich.
- Bei hohen Werten sind gelbe Handlinienxanthome charakteristisch (xanthoma striatum palmare).
- Die Patienten leiden unter vorzeitiger Atherosklerose – typisch an peripherischen Veränderungen.

Xanthoma striatum palmare

24 Stunden im Kühlschrank auf 4°C

Familiäre Hypertriglyzeridämie Typ IV

- Familiäre Hypertriglyzeridämie
- Familiäre kombinierte (gemischte) Hyperlipidämie
- Sporadische Hypertriglyzeridämie
- Wenn die HDL-Cholesterin Konzentration gering ist – wir sprechen von einer atherogene Dyslipidämie
- Gelegentlich tritt sie im Rahmen eines metabolischen Syndroms auf.

Májsejt

Makrophag

Familiäre hypertriglyzeridemie mit Chylomikronemie Typ V

- Erhöhte Synthese der VLDL Molekülen und Lipoprotein Lipase Defizienz (oder Apo C II Mangel)
- Die klinischen Symptomen sind gemischt, ähnlich zum Typ I. und Typ IV.
- Häufige, rezidive Bauchspeicheldrüsenentzündungen
- Eruptive Xanthomen
- Atherosklerose der peripherischen Arterien

Eruptive Xanthomatose

GLGC meta-analysis of genetic loci associated with concentrations of both plasma TG and HDL-C

Locus	Lead trait ^a	Role in lipoprotein metabolism	TG <i>P</i>	HDL <i>P</i>	SNP ^b
<i>APOA5</i>	TG	Activator of lipoprotein lipase	7×10^{-240}	5×10^{-47}	rs964184
<i>LPL</i>	TG	Hydrolysis of TG-rich lipoproteins	2×10^{-115}	9×10^{-98}	rs12678919
<i>MLXIPL/ChREBP</i>	TG	Activation of glycolytic and lipogenic enzymes	9×10^{-59}	1×10^{-9}	TG rs7811265HDL rs17145738
<i>TRIB1</i>	TG	Unknown	3×10^{-55}	6×10^{-19}	TG rs2954029HDL rs10808546
<i>APOB</i>	TG	Backbone of atherogenic lipoproteins	1×10^{-45}	1×10^{-30}	rs1042037
<i>APOE</i>	TG	TG-rich lipoprotein receptor ligand for the LDLR and LDLR-related protein (LRP1)	1×10^{-30}	4×10^{-21}	TG rs439401HDL rs4420638
<i>FADS</i>	TG	Fatty acid desaturation	5×10^{-24}	2×10^{-22}	TG rs174546HDL rs174601
<i>PLTP</i>	HDL-C	Transfer phospholipid between TG-rich lipoprotein and HDL	5×10^{-18}	2×10^{-22}	HDL rs6065906TG rs4810479
<i>GALNT2</i>	HDL-C	O-linked glycosylation of proteins	2×10^{-14}	4×10^{-21}	HDL rs4846914TG rs1321257
<i>LIPC</i>	HDL-C	TG lipase	2×10^{-13}	3×10^{-96}	HDL rs1532085TG rs261342
<i>CETP</i>	HDL-C	Exchanges cholesteryl ester for TG between HDL and TG-rich lipoproteins	1×10^{-12}	7×10^{-380}	HDL rs3764261TG rs7205804
<i>COBLL1</i>	TG	Unknown	2×10^{-10}	3×10^{-10}	TG rs10195252HDL rs12382675
<i>LRP1</i>	TG	TG-rich lipoprotein receptor via apoE	4×10^{-10}	2×10^{-8}	TG rs11613352HDL rs3741414
<i>IRS1</i>	HDL-C	Involved in insulin signaling	2×10^{-8}	2×10^{-9}	HDL rs2972146TG rs2943645
<i>ZNF664</i>	HDL-C	Unknown	1×10^{-8}	3×10^{-10}	HDL rs4765127TG rs12310367

OPEN
STARS

STINKIN' FAT GENE.

SCIENTISTS
DISCOVER FAT
GENE

MONSIEUR
BURGER