

| Betegség | Kórokozó | Fertőzés forrása | Terjedési mód | Lappangási idő | Fontosabb tünetek | Fertőzőképesség tartama | Jelentés | Elkülönítés | Járványügyi laboratóriumi vizsgálat | Fertőtlenítés | Teendők a beteg környezetében | Megelőzés |
|----------------------------------|--|--|--|----------------|---|--|---------------------------|---|--|---|---|--|
| Shigellosis | Shigella dysenteriae, flexneri, boydii, sonnei | beteg és a tünetmentes baktérium-hordozó | közvetlen érintkezés, élelmiszer, víz, használati tárgyak útján | 2-4 nap | Tünetei láz, görcsös hasi fájdalom, véres hasmenés, tenezmus | amíg a kórokozó a széklettel ürül | bejelentendő | betegot otthon vagy fertőző osztályon kell elkülöníteni | kötelező - székletminta antibiotikus kezelés előtt | Folyamatos és zárófertőtlenítés szükséges | szoros kontaktok 7 napos járványügyi megfigyelés | aspecifikus |
| Typhus abdominalis | Salmonella typhi | beteg és kórokozó-hordozó személy | feco-oralis, kontakt, szennyezett víz közvetítésével | 7-21 nap | láz, hasi fájdalom, máj-lépmegnagyobbodás, roseola, fejfájás | kórokozó ürítés tartama (2%-ban tartósan) | sürgősséggel bejelentendő | betegot fertőző osztályon kell elkülöníteni | laboratóriumi vizsgálat kötelező - széklet, vizelet, vérminta BSL3 laborba | Folyamatos és zárófertőtlenítés szükséges | 21 napos járványügyi megfigyelés, kontaktok oltása | specifikus - védőoltás |
| Yersiniosis | Yersinia enterocolitica pseudotuberculosis | beteg és kórokozó-hordozó ember és állat (sertés) | feco-oralis terjedés / szennyezett víz, élelmiszer | 4-7 nap | vizes vagy véres-nyálkás hasmenés, hasi fájdalom, magas láz | székletben a betegség után még 6 hétig ürülhet | bejelentendő | nem szükséges | laboratóriumi vizsgálat kötelező | Folyamatos fertőtlenítés szükséges | nem szükséges | aspecifikus |
| Campylobacteriosis | Campylobacter jejuni, Campylobacter coli | beteg vagy tünetmentes állat (szárnyasok), ritkábban ember | Fertőzött élelmiszer (csirkehús) | 2-5 nap | véres hasmenés, láz, gyengeség, hasi fájdalom | kórokozó ürítés 2-3 hét alatt megszűnik | Bejelentendő | betegot otthonában el kell különíteni | széklet diagnosztikus laboratóriumi vizsgálata kötelező | Folyamatos fertőtlenítés szükséges | közvetlen kontaktok 5 napos járványügyi megfigyelés | A konyhatechnikai szabályok, a személyi higiéné betartása |
| Cholera | Vibrio cholerae | beteg és a kórokozó-hordozó ember | szennyezett ivóvíz, fürdővíz, élelmiszer | 2-3 nap | intenzív hasmenés, a nagy mennyiségű, rizslészerű széklet | amíg a kórokozó a széklettel ürül | sürgősséggel bejelentendő | betegot fertőző osztályon el kell különíteni | kötelező - székletminta OEK referencia laborba | Szigorított folyamatos és szigorított zárófertőtlenítés | közvetlen kontaktok 5 napos járványügyi megfigyelése, AB profilaxis | orális vakcina |
| Hepatitis A | Hepatitis A-vírus | beteg és a tünetmentes fertőzött személy | széklettel szennyeződött élelmiszer, víz, tárgyak; kontakt | 28-30 nap | icterus, máj- és lépmegnagyobbodás | amíg a kórokozó a széklettel ürül | bejelentendő | fertőző osztályon elkülönítendő | laboratóriumi vizsgálat kötelező | Folyamatos és zárófertőtlenítés szükséges | szoros kontaktok 30 napos járványügyi megfigyelés + vakcináció | specifikus: HAV vakcina |
| Salmonellosis | Salmonella Enterica különböző szerotípusai | beteg és a tünetmentes kórokozó-ürítő személy és állat (szárnyas, sertés, szmarha) | élelmiszerek (szárnyas, tojás) nyers tej szennyezett zöldség útján | 6-48 óra | Hányás, hasmenés, hasi görcs, magas láz (40°C), hidegrázás | amíg a kórokozó a széklettel ürül (1-2 hét, ritkán hosszabb) | bejelentendő | betegot otthon vagy fertőző osztályon kell elkülöníteni | laboratóriumi vizsgálat kötelező | Folyamatos és zárófertőtlenítés szükséges | kontaktok kórokozó-hordozás időtartamára járványügyi ellenőrzés | élelmiszer-higiénés rendszabályok betartása |
| Rotavírus okozta gastroenteritis | Rotavírus | beteg és a kórokozó-hordozó ember | faeco-orális terjedés - szennyezett tárgyak, élelmiszer, víz | 48 óra | hányás, hasmenés, hasi fájdalom | kórokozó ürítés a tünetek előtt elkezdődik és 5-7 napig tart | bejelentendő | a beteg elkülönítendő | laboratóriumi vizsgálat kötelező | Folyamatos fertőtlenítés szükséges | 0-6 éves kontaktok - 3 napos járványügyi megfigyelés | specifikus - vakcina (6 hónapos korig) |
| Amoebiasis | Entamoeba histolytica | tünetmentes cisztaürítő és ritkábban a beteg | direkt kontaktus, fertőzött víz, zöldségfélék és gyümölcsök közvetítésével | 2-4 hét | Véres-nyálkás hasmenés, hasi görcsök, tenezmus, láz, dehidráció | Amíg a protozoon ürül a széklettel | bejelentendő | a beteg elkülönítendő | kötelező - széklet parazitológiai laborba | folyamatos fertőtlenítés szükséges | beteg szoros környezetében élők - 7 napos járványügyi megfigyelés | aspecifikus |
| Giardiasis | Giardia lamblia | beteg és tünetmentes cisztaürítő | direkt kontaktus, szennyezett víz, zöldségfélék és gyümölcsök közvetítésével | 1-2 hét | hasmenés, bélgázosság, súlycsökkenés, felszívódási zavar | Amíg a cysta ürül a széklettel | bejelentendő | a beteg elkülönítendő | Laboratóriumi vizsgálat kötelező: székletvizsgálat | folyamatos fertőtlenítés szükséges | beteg környezetében célszerű szűrővizsgálatot végezni | Az ivóvíz megfelelő kezelése/klórozás nem elegendő/ |
| Botulizmus | Clostridium botulinum | állatok (setrés, szmarha) bélsatornájából - spórák talajszennyezés | toxikoinfekció (kolbász, konzerv, füstölt hal) | 12-72 óra | tág, merev pupilla, kettős látás, beszéd- és nyelés zavar | botulizmus emberről emberre nem terjed | sürgősséggel jelentendő | nem szükséges | laboratóriumi vizsgálat kötelező | nem szükséges | gyanúsított élelmiszert fogyasztók felkutatása kötelező | megelőzés az élelmezés-egészségügyi előírások betartásával |