

**A MÉHNYAK MAGASFREKVENCIÁJÚ ESZKÖZZEL VÉGZETT KIMETSZÉSE  
(LOOP-KONIZÁCIÓ)****A SZÓBELI FELVILÁGOSÍTÁST KIEGÉSZÍTŐ BETEG TÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYZŐ  
NYILATKOZAT****Beteg neve:** \_\_\_\_\_**Orvos neve:** \_\_\_\_\_**Születési dátum:** \_\_\_\_\_**TAJ:** \_\_\_\_\_**A beavatkozás célja:**

A méhnyak daganatmegelőző, valamint nem daganatos betegségeinek műtétes gyógyítása, ami a méhnyak szöveteinek részleges eltávolításával jár. A műtét diagnosztikus és/vagy terápiás célú lehet.

**A beavatkozás technikája:**

A műtét elvégezhető a beteg igényének megfelelően helyi érzéstelenítésben, vagy rövid ideig tartó vénás altatásban. A beteget a hüvelyi műtéteknél szokásos előkészítés – esetenként nyugtató tablettá, a hólyag kiürítése - után a műtőasztalra fektetjük. A választott érzéstelenítési eljárás alkalmazását követően fertőtlenítő oldattal a hüvelyt csírántlanítjuk, majd feltárjuk. Az így előkészített érzéstelen műtéti területen felületes szövetrészt vagy kúp alakú szövetmintát távolítunk el a méhnyakból, dróthurokhoz (kacshoz) hasonló alakú magasfrekvenciájú rádióhullámot kibocsátó eszköz alkalmazásával. A magasfrekvenciájú eszközzel történt vágás során egyidejűleg azonnali vérzéscsillapítás is történik, ami öltések behelyezését általában feleslegessé tesz, így a seb felszín nyitott marad s így hámosodik, az élettanihoz hasonló eredménnyel. Az elváltozás jellegétől függően a műtétet ki kell egészíteni anyagminta vételével a méhnyakból (cervix abrázio). Az eltávolított kúp alakú, vagy lapos szövetmintát, valamint a méhnyakkaparékot kórszövetteni vizsgálatra küldjük. Az eljárás hátránya az, hogy a sejtek hőkárosodása miatt némely esetben nem ítéhető meg a metszett szél szövettani épsége. Emiatt újbóli műtét válhat szükségessé a betegség biztos eltávolítása érdekében. Ennek a műtéti megoldásnak az előnye az, hogy a hagyományos hidegkéscsillapítással szemben jóval rövidebb kórházi ellátást igényel, illetve a későbbiekben esetleges terhesség során a koraszülés és vetélés kockázatát kisebbnek valószínűsítik.

**A beavatkozás veszélyei, lehetséges gyakoribb műtéti szövődmények:**

A fertőtlenítéshez, vagy az érzéstelenítéshez használt anyagokkal szemben túlérzékenységi reakció jelentkezhet, ami szakszerű ellátással kezelhető.

A műtétet követően utóvérzés léphet fel, mely esetén ismételt vérzéscsillapításra van szükség, esetlegesen öltés(ek) behelyezésével. A műtétet követő késői időszakban gyulladás alakulhat ki, ami megfelelő eljárások (antibiotikumok és azt tartalmazó hüvelykúpok) alkalmazásával gyógyítható. A beavatkozás a fogamzóképeség csökkenését, a méhszáj szűkületét okozhatja. Ha a méhszájszűkület miatt a méhürben a menstruációs váladék pangása alakul ki, a méhszáj tágítása válik szükségessé.

**A beavatkozás elmaradásával kapcsolatos veszélyek:**

Az eljárás elmaradása esetén a daganatmegelőző állapotból esetlegesen rosszindulatú sejtburjánzás alakulhat ki.

**A fentiekkel kapcsolatos kérdéseim és az erre kapott válaszok:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**A fentiekről számomra részletes és érthető tájékoztatást adott:**

Dr. \_\_\_\_\_

## **KÉRELEM ÉS BELEEGYZŐ NYILATKOZAT**

A LOOP-KONIZÁCIÓ műtétjéről a tájékoztatót elolvastam, az orvos szóbeli tájékoztatását megértettem, az általam feltett kérdésekre kielégítő választ kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem és kérem annak elvégzését.

Budapest, \_\_\_\_\_ év, \_\_\_\_\_ hó, \_\_\_\_\_ nap, \_\_\_\_\_ óra, \_\_\_\_\_ perc

\_\_\_\_\_  
felvilágosítást végző orvos aláírása

\_\_\_\_\_  
beteg/törvényes képviselő aláírása

Továbbá **beleegyezem,**

\* hogy a beavatkozással (műtéttel) összefüggésben bármely diagnosztikus céllal eltávolított sejtemet, sejtalkotórészemet, szövetemet, szervemet a vizsgálat után a Semmelweis Egyetem megőrizze, és azok felhasználásával olyan tudományos igényű feldolgozást, orvostudományi kutatást végezzen, amely a kórisme és a gyógykezelés hatékonyságát segíti, továbbá összhangban áll a hatályos jogi szabályozással.

igen                      nem                      \_\_\_\_\_

\* hogy a műtét során video és/vagy fénykép felvétel készüljön, azt a műtét után a Semmelweis Egyetem megőrizze, és a hatályos jogi szabályozással összhangban az egyetemi oktatás (orvos- és szakorvosképzés) keretében, valamint tudományos igényű feldolgozás során (közlemény, szakkönyv, tankönyv) képi dokumentáció céljából azokat felhasználja.

igen                      nem                      \_\_\_\_\_

## **ELUTASÍTÓ NYILATKOZAT\***

A kezelőorvos részletes felvilágosítása ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom. Az ellátás visszautasítása miatt bekövetkező káros következményekért orvosaimat felelősség nem terheli, és kötelezhető vagyok az ennek következtében felmerült költségek megtérítésére.

(Ha a beteg olyan beavatkozást utasít el, aminek elmaradása a saját, vagy a magzata életét veszélyezteti, vagy aránytalanul súlyos terhet, ill. maradandó károsodást okozhat, az elutasító nyilatkozatot két tanúnak az aláírásával is hitelesíteni kell).

Budapest, \_\_\_\_\_ év, \_\_\_\_\_ hó, \_\_\_\_\_ nap, \_\_\_\_\_ óra, \_\_\_\_\_ perc

\_\_\_\_\_  
felvilágosítást végző orvos aláírása

\_\_\_\_\_  
beteg/törvényes képviselő aláírása

\_\_\_\_\_  
1. sz. tanú aláírása

\_\_\_\_\_  
2. sz. tanú aláírása

**\* Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 17. § (2):**

**„A beteg beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások - ideértve a 24. hetet betöltött magzatot is - egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti.”**

Ezen betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat egy példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!