

Májsebészet a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinikáján

Dr. Hahn Oszkár, Dr. Kupcsulik Péter, Dr. Pekli Damján, Dr. Fülöp András, Dr. Bárdos

Dávid, Dr. Kokas Bálint, Dr. Szijártó Attila

Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika

Bevezetés

A magyar orvosképzés 1769 a nagyszombati egyetem megnyitásával kezdődött. Az önálló orvosi fakultás hivatalosan 1770-ben alakult meg. A sebészetet és a szülészetet együtt oktatták. Nem voltak önálló klinikák. Budán 1777-ben kezdődött a sebészet oktatása, a gyakorlatok a „Szegények házában” (mai János kórház területén) történtek. 1791-től a hatvani utcában a 36 egyetemi betegágyból már 9 sebészeti volt. 1858-tól a Múzeum körúti „Kunewalder” házban 27, majd 1869-től már 36 sebészeti ágy van. 1875-ben nyílik meg az Üllői út-Mária utca sarkán az új sebészeti Klinika 72 ágygal. Ez ugrásszerű fejlődést jelent, különös tekintettel arra, hogy a szülészet levált a sebészetről.

A szakma fejlődését és jelentőségét az bizonyítja igazán, hogy alig néhány évtizeddel később, 1909-ben az Üllői út 78 sz alatt megnyitják a kor –nemzetközi összehasonlításban is - legmodernebb sebészeti klinikáját. Az idén 111 éves épület 120 ágygal indult (1).

A májsebészet áttekintését megelőzően nem hagyható említést nélkül az a nem feltétlenül közismert tény, hogy a Klinika első tanszékvezetője, Dollinger Gyula hozta létre világ első rákregiszterét. A modern, új épület falait a kezdetektől korszerű szellemiség lengte át. A máj sebészete felhúzta a maga korában divatos gyerekcipőjét és járni próbált.

Ahhoz, hogy megérthessük, miért volt a XX. elején szinte „lehetetlen küldetés” a májon végzett műtét, áttekinteni szükséges néhány alapfeltételt.

Májműtét rizikófaktorai

- a) kórismézés
- b) kombinált intratrachealis narkózis
- c) vérzés-transzfúzió
- d) sebészi eszközök
- e) maradék máj, regeneráció

- a.) A kórismézésről nem is érdemes szót ejteni. A klinikai adatokra és a fizikális vizsgálatokra kellett hagyatkozniuk. UH, CT, MRI még a vágyálmokban sem létezett, röntgen viszont már igen. Az első magyarországi röntgenfelvétel 1896-ban Eötvös Lóránd kezéről a Természettudományi Közlöny januári számában jelent meg. Különösen érdekes, hogy az első klinikai alkalmazás éppen Dollinger nevéhez fűződik: ugyanez év februárban röntgenfelvétel segítségével revolvergolyót talált meg egy férfi kezében, és azt így már „egy kis preparálással könnyen el lehetett távolítani”. Nem tudjuk biztosan használtak-e röntgen készüléket a máj vizsgálatára, de az biztos, hogy a Klinika élen járt a röntgensugarak alkalmazásában. Szomorú bizonyítéka ennek, hogy az itt dolgozó első magyar klinikai radiológus, sebész egyetemi tanár dr. Holzwarth Jenő (1874-1922) neve is szerepel a Hamburgban 1936-ban felállított emlékművön, amely a röntgensugárzás következtében elhunyt orvosok, kutatók mementója.
- b.) Döntően helyi érzéstelenítésben operáltak. Éternarkózis volt, intubáció, relaxáns, antibiotikum nem. Az aneszteziológia szakma még nem létezett.
- c.) Transzfúzió. A vércsoportok felfedezése Landsteiner nevéhez fűződik (1901-1902). Csoportazonos vér adására a Klinika korai éveiben biztosan sor került. 1918-21 között a Klinika munkatársa volt Kubányi Endre, aki amerikai tanulmányútját követően 1935-ben (a Madarász utcai Gyermekkorházban) létrehozta az első hazai véradóállomást.
- d.) A sebészi eszközök alapszintűek voltak. Májreszekcióra alig alkalmasak. Hogy milyen gondot jelentett “vágást ejteni a májon” példázza az alábbi idézet (Lumniczer József, A Magyar Sebésztársaság Munkálatai 3. nagygyűlés (1910. május 27-28): “A máj ballebenyéből, mely jelentékenyen megnagyobbodott kb. felerészét távolítottam el, a mi vastagsága helyenkint 4'8 cm, sőt a legmagasabb részletben 10 cm vastag volt. Műtétnél kevés vérveszteség. A midőn azonban a máj resecált felületeit összehozni akartuk a májseb felső zugában berepedt s óriási vérzés keletkezett. Miután tamponokkal, ujjlenyomással, csiptetővel megszüntetni a profus vérzést nem sikerült, a máj egész vastagságát átöltő varratokkal a májból ismét két ujjnyi részletet vettünk le. Erre a vérzés megszűnt.”
- e.) A kezdeteknél ezek a fogalmak ismeretlenek voltak.

A kezdetek

Korai májműtétek a Sebészeti Klinikán: 1897-1907 között 42 echynoccus cysta fenestratio (exit =8) 1907-08 Abscessus :1, Echynococcus1, Syphilises gumma :1, tumor:1

A Klinikán az 1960-as évekig csak kevés májműtét történt. Innentől kezdődően Szécsény Andor munkásságának köszönhetően egyre nagyobb számban végeztünk a különféle reszekciókat. A fejlődést - nem alábecsülve a sebészi képességeket - mindenekelőtt az aneszteziológia átalakulása tette lehetővé. Hedri Endre amerikai útja után 1948-ban kezdeményezte az önálló aneszteziológiai szakma megalakulását. Intratracheális intubációt az 50-es évek végétől alkalmaztak. 1963-tól a Rubányi Pál vezette Klinikán aneszteziológusi csoport működött Szenohradzky Vilmos, majd Megyaszai Sándor vezetésével. A májreszekciók akkori javallatait elsősorban kolorektális májattétek, esetenként benignus daganatok (FNH, haemangioma, adenoma) képezték. Sor került kiterjesztett reszekciókra, ideértve lobektomiát, trisegmentektomiát is. A Klinikán a májreszekciók alatti vérzés csökkentésére portális leszorítást alkalmaztak. Ennek standard eljárása a 70-es évek elejére alakult ki: 2x30 perc, közte 2-3 perces szünet „flush” perfúzióval. Évente 20-30 jelentősebb májreszekció történt.

A hatvanas évek elejétől -elsősorban Szécsény Andor munkásságának köszönhetően- a Klinika úttörő szerepet vállalt a portális hipertenzió kezelésében. Bár a májsebészethez csak korlátozottan köthető a tevékenység, mégis fontos megemlíteni a nyelőcsőviszér vérző betegeken elvégzett portális nyomás csökkentő, már akkor alig elfogadható mértékű mortalitással (50%) bíró porto-szisztemas shunt műtéteket, illetve a halálozást jelentősen csökkentő endoszkópos varix kezelést (2, 3). Az akut vérzők halálozása 10% alá esett, a választott kezelésekre 0.2 % körül volt. Sebészek, belgyógyászok, fül orr gégészek, aneszteziológusok olyan csapata alakult így ki, amely bármikor hajlandó volt az életmentő kezelések elvégzésére. Ez a csapatszemplélet a klinikán a kezdetektől a mai napig tetten érhető. Az ascites peritoneo-venosus shunt beültetéssel történő kezelése 1983-ban indult, a legnagyobb hazai beteganyag (265 beteg) gyűlt össze az évek során (4).

A Klinika kísérleti műtőjében 1965 óta folytak olyan állatkísérletek, amelynek célja a máj konzerválása, illetve bizonyos a beültetés gyakorlása volt (5, 6, 7).

A Klinika több munkatársa tett látogatást külföldi transzplantációs munkacsoportoknál (Roy Calne, Cardiff, Rudolf Pichlmayr, Hannover, Thomas E. Starzl, Pittsburgh). Az első magyarországi májátültetés 1983. február 1-én történt (8). A 12 éves recipiens krónikus aktív HBsAg pozitív hepatitisben szenvedett, ismétlődő hepatargiás koma, ascites miatt feküdt a Bethesda kórházban. A rohamos progresszió a transzplantáció sürgős javallatát képezte. A

donor egy balesetet szenvedett 38 éves férfi volt. A májátültetés 1983 február 1-én 21.50-kor indult, időtartama 7óra 15 perc volt. A teamet Szécsény Andor vezette. A gyermek 24 órás gépi lélegeztetés után extubálható volt. Az epeelválasztás a Kehr csövön keresztül azonnal megindult. Az immunosuppressziót Solu-Medrollal és Imurannal kezdtük. Az első májtranszplantáció különlegessége volt, hogy Magyarországon először került sor Cyclosporin alkalmazására. A gyógyszer adását a műtét utáni 3. napon kezdtük el. Ekkor szubakut rejekció jelei voltak észlelhetők, melyek fokozatosan rendeződtek. Jóllehet a máj működése stabil volt, sebészi szövődmény sem lépett fel, de disszeminált Cytomeglovirus fertőzés alakult ki és a tüdőszövődmények a posztoperatív 64. napon a beteg halálát okozták. Acyclovir és származékai ebben az időben ismeretlenek voltak. Még két további májtranszplantációra került sor, az egyik esetben bal oldali májszegment beültetés történt. Ezt követően a májtranszplantáció az újonnan alakuló Transzplantációs és Sebészeti Klinikára került.

A modern kor

A májsebészet fejlődésének második szakasza a 2000-es évek elejére tehető. Ekkor léptük át a „maradék májtömeg” értelmezési „Rubicon” –ját. Olyan májreszekciók váltak tervezhetővé, ahol a kiindulási helyzetben a reszekciót követő maradék máj (FLR) a szükségesnél (30-40%) kisebb volt. A tumoros oldali portatörzs elzárása (PVL) ellenoldali májregenerációt eredményez. A maradék májtömeg növekedésével így válik lehetővé a kiterjesztett reszekció. A máj irányított regenerációjának vizsgálatának és klinikai alkalmazásának elindítása Kupcsulik Péter nevéhez köthető. Az első ilyen műtetre 2001 januárban került sor –hazánkban először. A „portaligatúra” műtétek száma fokozatosan növekedett.

A következő lépést a 2007-ben megnyitott angiográfiás laborban lehetővé vált perkután ultrahang vezérelt punkciót követő transzhepatikus vena portae embolizáció (PVE) jelentette. Az eljárás előnye a viszonylagosan alacsony invazivitás, a ligatura műtét elkerülése. 245 PVL-PVE beavatkozás történt. Manapság már a mindkét májlebenyt érintő tumorok esetén is lehetséges kuratív műtéti eljárás, ha legalább 1 segment tumormentessé tehető, vérellátása, epeelfolyása és a beteg májműködéséhez szüksége funkcionális térfogata biztosítható. A májreszekciót ilyenkor gyakran két lépcsőben végezzük, mely során az egyik oldali tumor(ok) eltávolítása, majd a megfelelő méret elérését követően a másik oldal reszekciója, vagy a tumor(ok) excíziója következik (9).

A májtérfogat növekedése nem minden esetben az elvárt mértékben jön létre, még akkor sem, ha a portalis okklúzió technikailag korrekt. Ennek oka a májlebenyek közötti

intraparenchimális portális (és arterias) kollaterális kapcsolat. Ha az okklúzióval egyidejűleg „in situ splitet” alkalmazunk, a regeneráció mértéke és sebessége növekszik. (ALPPS: Associated Liver Partition and Portal vein ligation for Staged hepatectomy). Az első ilyen műtét 2012-ben történt a klinikán-és először hazánkban (10). A rendkívül magas reszekciós arány ellenére a szövődmények lehetősége miatt az eljárás csak szoros feltételek mellett történő betegszelekció után végezhető. Az eljárás kidolgozásában, szövődmény arányának csökkentésében, a műtéti technika módosításában klinikánk világviszonylatban is vezető szerepet játszik (11, 12, 13), csakúgy, mint az egyéb vena portae okklúziós technikák klinikai alkalmazásában, kutatásában és állatkísérletes sebészi modellezésében (14, 15, 16).

Mindmáig rutin eljárásként alkalmazzuk a maradékmáj volumen manipulációs technikákat, bár gyakoriságuk némileg csökken. Ennek oka az, hogy a májreszekciók leggyakoribb javallatának számító kolorektális májástétek esetén a májreszekció kiterjesztésének lehető elkerülése az ún. „parenhima spóroló” technikák váltak klinikai gyakorlattá, így az intraoperatív ultrahang vezérelt ún. eOSH (enhanced One stage hepatectomy) műtéti eljárást alkalmazzuk gyakrabban többgócú kolorektális májástétek esetén (9).

A sebészi eszközpark fejlődése, ideértve az intraoperatív, illetve laparoskopos ultrahang vizsgálatot és a speciális CT, illetve MRI vizsgálati lehetőséget új távlatokat nyitott. A 21. század elejétől jelentős változások következtek be a májsebészetben. A korábban jóindulatú daganatok miatt nagy számban végzett májresectiók aránya drasztikusan csökkent, világszerte, így klinikánkon is. A benignómák (májciszta, adenoma, FNH, hemangioma, echinococcus cysta) műtéti javallati köre szűkült, manapság a panaszt nem okozó, akár nagyméretű jóindulatú májtumorok többségét nem operáljuk. A máj adenoma kivételével sem malignizálódási potenciáljuk nincs, és szövődményük (ruptura, bevérzés, epeút, vagy ér kompresszió) is csak rendkívül ritkán fordul elő. A sokat javuló képalkotó diagnosztika és a szükség esetén elvégzett perkután szövettani mintavétel miatt a diagnosztikus tévedés aránya kicsi, a pontos preoperatív tervezés és nem elhanyagolható mértékben a különböző disszekciós eszközök eredményeként a korábbi „standard” portális leszorítás és annak módosított változatai (17, 18) csak elvétve fordulnak elő. A kezdetekkor kivételesen fontos transzfúzió adta biztonság –bár ma is szükséges- inkább csak háttér: a resectiók többsége vérátömlesztés nélkül történik meg.

A korábban Magyarországon is gyakori echinococcus cysta előfordulása jelentősen csökkent, gyógyszeres kezelés mellett ma már csak a kompressziót és/vagy epeút és/vagy ér „inváziót” mutató cisztákat, illetve az antimikrobiális kezelésre nem reagálókat operáljuk. A cisztás elváltozások kezelésében (simplex, policisztás máj, echinococcus) előtérbe kerültek a

percutan UH, vagy CT vezérelt módszerek, melyekben klinikánk szintén úttörő szerepet játszott (19).

A 2000-es évektől a májreszekciók száma klinikánkon elérte az évi 100-130 műtétet. A világviszonylatban is nagyszámú műtétet világviszonylatban is kiemelkedően alacsony mortalitással végezzük. 2018-ban a kórházi halálozás májreszekciók után 0,87% volt az I. sz. Sebészeti Klinikán.

A kiemelkedő eredmény mögött sok tényező sorolható fel, de a legfontosabb a nagy tapasztalattal bíró csapat munkája. Hangsúlyosnak érezzük, hogy nem „one man show”-ról van szó, hanem egy olyan jól bejáratott tevékenységről, amelyben a májműtétek rutin beavatkozásnak számítanak, de az olyan, világviszonylatban sem gyakori, bonyolult, kétlépcsős, „in situ split”-tel kombinált májreszekció észlelése, pre-, és posztoperatív kezelése sem, mint a „monosegment ALPPS”. Ma már egyértelmű, hogy azokban az intézményekben alacsony a szövődmény arány, ahol a briliánsan megoperált betegek szövődményeit időben észlelni és azt ellátni képes csapat áll rendelkezésre. A kiváló mortalitási mutatóink eléréséhez természetesen szükséges a magas esetszám, az évtizedes (évszázados?) tapasztalat a preoperatív diagnosztikában, a műtéti tervezésben, a májreszekciók kidolgozott, rutinszerű, lehető legkisebb megterhelést jelentő (pl. laparoszkópia) technikával (20, 21) történő elvégzésében, a szükséges speciális eszközök megléte (elektrodisszekciós és laparoszkópos eszközök, intraoperatív ultrahang, stb.), a posztoperatív szövődmények korai észlelése és lehetőség szerint minimal invazív technikákkal (percutan UH vezérelt intervenciók, epeúti intervenciók-ERCP/PTD) történő ellátása.

A máj primer és áttéti daganatainak műtéti ellátása mellett kifejezett kihívást jelentenek a hilaris epúti daganatok ellátása is, melyből évente közel 25-40 műtétet végzünk. Klatskin tumorok ellátása kapcsán kiemelendő az évtizedes tapasztalatokra alapuló terápiás algoritmus felállítása. Nagy előny Klinikánkon napi gyakorlatban alkalmazott, sebészek kezében lévő epeúti intervenciók elérhetősége is. A pre-, és posztoperatív kezelési terv felállításának, a szövődmények időben való felismerésének, kezelési sémáinak bevezetése eredményezte azt, hogy az I. sz. Sebészeti Klinika epeúti daganatos betegeinek túlélése, szövődményaránya a nemzetközi átlagban is kiemelkedő.

Utoljára hagytuk, de annál hangsúlyosabbnak érezzük az aneszteziológiai és intenzív terápiás munkatársaink felkészültségét. A korábban említett 60-as évek hőskorához képest ma már a kevés szövődménnyel és vérzéssel, rutinszerűen végzett májreszekciók aneszteziológiai szempontból klinikánkon általában „unalmasak”, azonban, ha ritkán különleges, nem várt helyzet adódik, akkor az altató orvosnak a beteg sorsát döntően befolyásoló szerepe van. A

sebész és az aneszteziológus együttműködése a műtét előtti tervezéstől, a műtét transzsekción fázisában összehangolt balanszírozott normál és alacsony CVP változtatásán át a posztoperatív időszakban szükséges megfelelő formájú fájdalomcsillapítás mellett fenntartott kellő májperfúzió eléréséig elengedhetetlenül szorosnak és sokrétűnek kell lennie, mely klinikánk saját anesztéziájával sok évtizedes hagyományokon alapul.

Az I. sz. Sebészeti Klinikán ma már minden „profil” (így a máj profil is) csapatban dolgozik, heti 1 alkalommal „team-megbeszélés” keretében beszéljük meg a szakambulanciákon látott betegeket, konzultálva a májműtéteket nagy számban diagnosztizáló és kezelő radiológussal, onkológussal, intervenciós szakemberrel, illetve aneszteziológussal. 2020. szeptemberétől klinikánk az országban egyedülálló sebészi és gastroenterológiai centrummá alakul, így hepatológus-belgyógyász kollégáink is csapatunk tagjai lesznek, tovább erősítve az ország legnagyobb májsebészeti centrumát.

Klinikánk elkötelezett a májsebészet hazai fejlődésének elősegítésében is, így májsebészeti munkacsoportunk nevéhez fűződik a Magyarországon 2019-ben először megtartott Colorectalis májmetastasisok komplex kezelése - Konszenzus konferencia (9), és az idén megtartandó HCC komplex kezelése - Konszenzus konferencia megszervezése is.

Irodalomjegyzék

1. Kupcsulik P. (szerk.) Az Üllői úti Sebészeti Klinika, 1909-2009: Jubileumi kiadvány. - Budapest: Semmelweis Kiadó., 2009. -174 p
2. Kupcsulik P., Darvas K., Máthé Z., Bodnár A. Esophagoscopic sclerosing therapy for bleeding esophageal varices *Endoscopy* 1980 12 231 p
3. Kupcsulik P., Bodnár A., Darvas K., Kokas P., Szécsény A. A portalis hypertensio kezelésére alkalmazott mesentericocavalis H- shunttel elért első eredmények *Orv Hetil* 1984 125 79-81 p
4. Kupcsulik P., Harsányi L., Kokas P. LeVeen shunt beültetésével szerzett tapasztalataink *Orv Hetil* 1985 126 (33) 2027-31 p
5. Kupcsulik P., Stekker K., Németh M. Effect of ischemia on the enzyme activity of the hepatic tissue *Research in Experimental Medicine* 1977 170 (3) 259-70 p.
6. Kupcsulik P., Faller J., Karácsonyi S. Histochemische Untersuchung der nichtspezifischen sauren und alkalischen Phosphatase, Adenosin-tiphosphatase und Laktat-dehydrogenase der in vitro perfundierten Hundeleber *Gegenbaurs Morphologisches Jahrbuch* 1974 120 (5) 638-57 p

7. Kupcsulik P., Stekker K., Németh M.: Effect of ischemia on the enzyme activity of the hepatic tissue *Research in Experimental Medicine* 1977 170 (3) 259-70 p
8. Szécsény A., Darvas K., Faller J., Kupcsulik P. Az első hazai májátültetés klinikai esetismertetése. *Korányi S.Társ.Tud.Közleményei .p.229-234 (1986)*
9. Magyar Hepato-Pancreatico-Biliaris (HPB) Kutatócsoport, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest, Üllői út 78., 1082 Hungary, András C, Bartek P, Battyáni I, Bezsilla J, Bodoky G, Bogner B, Bursics A, Csöszi T, Damjanovich L, Dank M, Dankovics Z, Deák PÁ, Dede K, Doros A, Dudás I, Györke T, Hahn O, Hartmann E, Hitre E, Horváth Z, Imre M, Kalmár Nagy K, Káposztás Z, Kóbori L, Kupcsulik P, Landherr L, Lóderer Z, Mangel L, Máthé Z, Mersich T, Mezei K, Mohos E, Oláh A, Pajor P, Palkó A, Pápai Z, Papp A, Patyánik M, Petri A, Révész J, Ruzsa Á, Schlachter K, Sikorszki L, Sipőcz I, Székely E, Szijártó A, Torday L, Tóth LB, Dósa E, Harsányi L, István G, Landherr L, Lázár G, Lövey J, Schaff Z, Szűcs Á, Vereczkei A Colorectalis májmetastasisok komplex kezelése. Konszenzuskonferencia, Budapest, 2019. április 5.*Orv Hetil. 2019 Sep;160(Suppl 2):2-20.*
10. Hahn O, Dudás I, Pajor P, Györke T, Korom C, Zsirka-Klein A, Kupcsulik P, Harsányi L. [ALPPS (Associated Liver Partition and Portal vein ligation for Staged hepatectomy) -- faster and greater growth of liver]. *Magy Seb. 2013 Feb;66(1):21-6.*
11. Hahn O, Bárdos D, Kupcsulik P, Szijártó A, Fülöp A, Kokas B, Pekli D, Zsirka-Klein A, Dudás I, Pajor P, Harsányi L Speciális májműtét (Associating Liver Partition and Portal vein ligation for Staged hepatectomy, ALPPS) morbiditásának csökkentése átértékelt beteg kiválasztási elvek és műtéttechnikai módosítás révén *Orv Hetil 2019 Aug;160(32):1260-1269*
12. Li J, Moustafa M, Linecker M, Lurje G, Capobianco I, Baumgart J, Ratti F, Rauchfuss F, Balci D, Fernandes E, Montalti R, Robles-Campos R, Bjornsson B, Topp SA, Fronek J, Liu C, Wahba R, Bruns C, Brunner SM, Schlitt HJ, Heumann A, Stüben BO, Izbicki JR, Bednarsch J, Gringeri E, Fasolo E, Rolinger J, Kristek J, Hernandez-Alejandro R, Schnitzbauer A, Nuessler N, Schön MR, Voskanyan S, Petrou AS, Hahn O, Soejima Y, Vicente E, Castro-Benitez C, Adam R, Tomassini F, Troisi RI, Kantas A, Oldhafer KJ, Ardiles V, de Santibanes E, Malago M, Clavien PA, Vivarelli M, Settmacher U, Aldrighetti L, Neumann U, Petrowsky H, Cillo U, Lang H, Nadalin S ALPPS for Locally Advanced Intrahepatic Cholangiocarcinoma: Did Aggressive Surgery Lead to the Oncological Benefit? An International Multi-center Study. *Ann Surg Oncol. 2020 May;27(5):1372-1384.*

13. Wanis KN, Linecker M, Madenci AL, Müller PC, Nüssler N, Brusadin R, Robles-Campos R, Hahn O, Serenari M, Jovine E, Lehwald N, Knoefel WT, Reese T, Oldhafer K, de Santibañes M, Ardiles V, Lurje G, Capelli R, Enne M, Ratti F, Aldrighetti L, Zhurbin AS, Voskanyan S, Machado M, Kitano Y, Adam R, Chardarov N, Skipenko O, Ferri V, Vicente E, Tomiyama K, Hernandez-Alejandro R Variation in complications and mortality following ALPPS at early-adopting centers. *HPB (Oxford)*. 2020 May 23;S1365-182X(20)30133-7.
14. Szijártó A, Hargitai B, Fischer S, Darvas K, Kupcsulik P. Two-staged procedure of portal ligation and hepatectomy monitored by ICG clearance. *J Invest Surg*. 2009;22(1):63-68.
15. Fülöp A, Szijártó A, Harsányi L, et al. Demonstration of metabolic and cellular effects of portal vein ligation using multi-modal PET/MRI measurements in healthy rat liver. *PLoS One*. 2014;9(3):e90760.
16. Budai A, Fulop A, Hahn O, et al. Animal Models for Associating Liver Partition and Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy (ALPPS): Achievements and Future Perspectives. *Eur Surg Res*. 2017;58(3-4):140-157
17. Szijártó A., Hahn O., Lotz G., Schaff Z., Madarász E., Kupcsulik P.: Effect of ischemic preconditioning on rat liver microcirculation monitored with laser doppler flowmetry *J Surg Res* 2006 131 (1) 150-57 p.
18. Hahn O, Blázovics A, Váli L, Kupcsulik PK. The effect of ischemic preconditioning on redox status during liver resections--randomized controlled trial. *J Surg Oncol*. 2011;104(6):647-653
19. Zalaba Z, Tihanyi TF, Winternitz T, Nehéz L, Flautner L. The laparoscopic treatment of non-parasitic liver cysts. Five years experience. *Acta Chir Hung*. 1999;38(2):221-223.
20. Kupcsulik P, Ónody P. Nagyméretű hepatocelluláris karcinóma laparoskopos reszekciója és a barcelonai kritériumok [Laparoscopic resection of giant hepatocellular carcinoma and the Barcelona staging]. *Magy Onkol*. 2017;61(4):339-342.
21. Kupcsulik P, Hahn O, Szijártó A, Zsirka A, Winternitz T, Lukovich P, Fekete K. [Laparoscopic surgery of benign liver tumours]. *Magy Seb*. 2015 Feb;68(1):3-7.