

Sipolyozó Crohn-betegség

A Crohn-betegségnek alapvetően három megjelenési formája van (gyulladásos, sipolyozó és szűkületet okozó), ezeket a betegség leírásánál ismerttettem.

A sipolyozó típus leggyakrabban a végbél környéki régióban okoz panaszt. A sipolyt másként fisztulának is nevezzük. Egyes esetekben fájdalmas csomó keletkezhet a végbélnyílás környékén, vagy a gát-tájon, melyek tulajdonképpen tályogok. Ezek fakadnak ki a külvilág felé sipolyok formájában. Máskor ilyen tályogok észlelhető jele nélkül keletkeznek sipolyok a végbélnyílás vagy a gát környékén. A sipolyok belső vége gyakran a végbélben van, de ezeket a szájadékokat gyakran nem tudjuk kimutatni.

A tályogok és sipolyok anatómiai tulajdonságainak ismerete nagyon fontos ahhoz, hogy a megfelelő kezelést megtervezzük. Ehhez leggyakrabban mágneses rezonancia vizsgálatot (MR) vagy végbélen át végzett UH vizsgálatot kérünk. Nagyon értékes információt ad a sebész által végzett manuális végbél vizsgálat, ennek előnye, hogy adott esetben a sebész a gyógyító beavatkozást is el tudja végezni. Ez leggyakrabban a feszítő tályogok megnyitását jelenti – sokkal jobb ugyanis, ha a sipoly kijáratát sebész metszéssel megfelelően meg tudjuk határozni, és nem magától talál utat esetlegesen létfontosságú szerveket érintve.

A sipolyozó Crohn-betegség egy speciális típusa az, amikor a végbél és a vagina között képződik.

ÁBRA

A kezelés szempontjából fontos megkülönböztetnünk az úgynevezett egyszerű, és a komplex sipolyokat. Egyszerű sipolyoknak nevezzük azokat a fisztulákat, melyeknek csak egy nyílásuk van, nem tályogból erednek, nem érintik a hüvelyt, nem járnak a végbél gyulladásával, és a felületes szöveteket érint (az ábrán láthatóak közül szaggatott vonallal jelölik). Azokat a sipolyokat, amelyek a fenti tényezők közül egyet is teljesítenek - komplex sipolyoknak nevezzük. E két kategória kezelési stratégiája gyökeresen különbözik. Az egyszerű sipolyokat sebészileg vagy antibiotikummal kezeljük, a komplex sipolyok viszont sebészi ellátást és erélyes gyógyszeres kezelést, immunszuppressziót tesznek szükségessé.

