**Misslungene
zahnmedizinische
Implantationen, Prävention,
Behandlung**

Dr. Szabolcs Gyulai-Gaál

Universitätsadjunkt

**Klinik für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie und
Stomatologie**

Fehler

- **Der Arzt als „Fehlerquelle“**
- **Der Patient als „Fehlerquelle“**

Arzt

- Auswahl des falschen Patienten
- Mangelhafte Diagnostik
- Erfüllung unrealistischer Anforderungen des Patienten ohne begründete Indikation
- Kein entsprechender (chirurgischer, prothetischer) Behandlungsplan
- Fehler bei den Eingriffen des Chirurgen
- Prothetische Fehler
- Mängel im zahnmedizinischen Hintergrund
- Nicht ausreichende Auskunft, Instruktion, Motivation
- Versäumung der Kontrolluntersuchungen

Patient

- Nicht ausreichende Mundhygiene
- Nichteinhaltung der ärztlichen Anweisungen
- Versäumung der Kontrolluntersuchungen

Intraoperative Komplikationen

- Nervenverletzung
- Öffnung der Kiefer- und Nasenhöhle
- Nicht entsprechende Vorbereitung der Stelle des Implantates
- Bruch des zur Vorbereitung eingesetzten Bohrers

Postoperative Komplikationen

- Bruch des Implantates
- Freiwerden des mit Schleimhaut bedeckten Implantates
- Entzündung, Osteoklasie

Fehler aus der Vorbereitung der Implantation

Planungs- fehler

- chirurgisch
- prothetisch

Ausführung- sfehler

- chirurgisch
- prothetisch

Defizite der Beziehung Arzt/Patient

I. Planung (Prävention)

II. Ausführung

III. Pflege

Überholtes System!!!

- **Implantat mit einer Bicortikal-
(Kompressions-) Schraube**
- **Subperiosteales Implantat**
- **Klinge-Implantat**

Ungenügende mechanische Stabilität

BRUCH

Die Kraftübertragung ist ein
kompliziertes biomechanisches
Problem

Entsprechende Implantatoberfläche

Wie viele Wurzeln, so
viele Implantate

($\frac{6}{6}$ | $\frac{6}{6}$ zwei Implantate

Zwei Wurzeln ein
Implantat

($\frac{6}{65}$ | $\frac{6}{65}$ zwei Implantate

Nicht ausreichende Oberfläche

Überbelastung

Falsche Mundhygiene

Periimplantitis

Grund der Periimplantitis

- Nicht ausreichende Oberfläche
    —————▶ Überbelastung
- Falsche Mundhygiene
    —————▶ Entzündung

Periimplantitis

Typen des Ersatzes mit Implantation

Typ des Zahnersatzes

Rein implantatgestützt
ist das Richtige!!!

Es kann falsch sein, wenn es mit dem natürlichen Zahn verbunden wird

- Bruch des Zahnersatzes
- Verletzung Facette
- Bruch der Schraube
- Bruch des Implantates (selten)

II. Ausführung

- a. Bohrer
- b. Kühlung
- c. Richtung
- d. Anatomische Formeln (sinus, nervus alveolaris inferior, nervus mentalis, ...)
- e. Suprastruktur
- f. Mundhygiene

kv 120
ma 130

1.0 mm sep/0.5ap
Tilt: -0.5
03:46:36 PM

03 3 13

Ex: 15005
Set: 931 05ac
Jw: 5
UNIT
DYN: 0.0oz
DHELT

Fluor: Densitax
F 56 2005/12/14
15, 10 2002
512
Mag = 1.0
FL:
FOI:

Ex: 15005
Set: 931
Jw: 5
UNIT
DYN
DHELT

15005

15005

15005

03 3 02

1V 120

1V 120

Pflege

1. Prüfung der gingivalen Schließung des Implantates
2. Röntgenuntersuchung
3. Kontrolle der Occlusio, Prüfung der Belastung des Implantates
4. Kontrolle der Mundhygiene

III. Pflege

Fehlende Kontrolle

Gingivale Schließung

Prävention der Plackbildung (orale Mundhygiene)

Aufrechterhaltung der Knochenintegration

optimale Kraftübertragung, Vermeidung der Überbelastung

**Die Implantologie beschränkt
sich nicht nur auf die
Einpflanzung, sondern auch
auf die Vorbereitung des
Aufbaus**

**Danke für Ihre
Aufmerksamkeit!**