

Akut teendők lagophthalmus kialakulásakor



lagophthalmus jobb oldali
n. facialis bénulásban

Definíció: szemrészarási elégtelenség. Következmenyeként a könny nem oszlik el egyenletesen a szemfelszínen, a szabadon maradó részek kiszáradnak, a szaruhártya gyulladása alakul ki, amely felülfertőződve fekély kialakulásához vezethet.

Mit kell vizsgálni: mekkora rész marad fedetlen, laza szemhéjzáráskor (lefelé tekintés mellett) / pislogáskor? Pislogás gyakorisága? Bell-jelenség van-e? Cornea állapota? Fluoreszcein festés, van erosio a corneán?

Teendő: Cél: a cornea kiszáradását megakadályozni

- nappal **műkönyv cseppek** (minél kevésbé záródik a szemrés pislogásnál, annál gyakrabban, súlyos esetben akár félóránként), éjszakára **műkönyv zselé**
- súlyosabb esetben **óraüveg kötés** (párakamra)
- eszméletlen/altatott betegnél a **szemhéj leragasztása** is megoldás.

Komplikáció lehet: a kiszáradt területen a cornea fertőződik, itt szaruhártya gyulladás, fekély alakulhat ki. Ilyenkor a kórokozóra specifikus **antibiotikum** terápia is szükséges.



óraüvegkötés