



DR. BÁNVÖLGYI ANDRÁS PHD
EGYETEMI DOCENS

BŐRGYÓGYÁSZAT - NEMIGYÓGYÁSZAT

PROFIL

Krónikus kismedencei
fájdalmak fertőzések (STI,
sexually transmitted infections)
eredetű hátterének kivizsgálása
és kezelésével foglalkozom

KAPCSOLAT

Semmelweis Egyetem Bőr-,
Nemikórtani és Bőronkológiai
Klinika 1085 Budapest, Mária
utca 41.

IDŐPONTKÉRÉS: kizárólag
társszakmák (urológia,
nőgyógyászat, neurológia)
beutalójával lehetséges,
telefonszám: Országos STI
Centrum, +36-1-459-1447 –
hétfőtől péntekig 7:00-8:00 és
hétfő-csütörtök 12:00-14:30
között hívható.

A KRÓNIKUS KISMEDENCEI FÁJDALMAK FERTŐZÉSES EREDETÉRŐL

A krónikus kismedencei fájdalom hátterében előfordulhat, hogy valamilyen elhúzódó vagy visszatérő fertőzés állhat, például húgyúti, nemi úton terjedő vagy kismedencei gyulladásos betegségek. A fertőzések tartós gyulladást okozhatnak a kismedence szövetekben, ami hosszú távon is fennmaradó fájdalomhoz vezethet. Nőknél gyakori ok lehet a PID (kismedencei gyulladásos betegség), férfiaknál pedig a krónikus prosztatagyulladás. A kórokozók sokszor lappanghatnak, így a tünetek nem mindig egyértelműek. Pontosabban azonosítani csak orvosi vizsgálattal — labor, tenyésztés, PCR mikrobiológiai vizsgálat — lehet a fertőzést. A megfelelő kezeléshez fontos a kiváltó ok célzott felismerése és kezelése.

AZ STI (SEXUAL TRANSMITTED INFECTIONS, AZAZ SZEXUÁLIS ÚTON TERJEDŐ FERTŐZÉS) VIZSGÁLATRÓL

Az STI-vizsgálat célja a szexuális úton terjedő fertőzések korai felismerése és kezelése. A tesztek vér-, vizelet- vagy kenetmintából mutatják ki a leggyakoribb kórokozókat (pl. chlamydia, gonorrhoea, HIV, szifilisz). A pozitív eredmény időben elkezdett kezeléssel jól menedzselhető és megakadályozható a további fertőzés.

MIKOR KÉRJEN IDŐPONTOT?

Amennyiben fájdalmai hátterében STI fertőzés lehetősége nem zárható ki, vagy STI fertőzés gyanúja a panaszok jellege, gyakori partnerváltás, egyéb ok miatt felmerül.

HOGY ÉRKEZZEN A VIZSGÁLATRA?

A vizsgálat előtt 24 órával kerülje a nemi együttlétet, irrigálást és a hüvelyi készítményeket, hogy a mintavétel pontos legyen. Húgycső- vagy vizeletminta esetén fontos, hogy a páciens legalább 2-3 órával a vizsgálat előtt ne vizeljen.

Hozza magával korábbi leleteit és az esetleges tünetekről szóló információkat. Kényelmes, könnyen levehető ruházatban érkezzen.

A vizsgálat előtti 1-2 hétben antibiotikum, antimikotikum tartalmú lokális vagy szisztémás készítményt ne használjon.